





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2434/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2434/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2434/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2434/A



2434/A  
A. XXIX. Fol.

The Earl of Westmoreland  
1856



vol. A

~~63 A 12~~

29458


1 B. 15

autograph of

W. B. Allen on title

payee  
12/1/10







LEONHARTI FVCHSII DE  
MEDENDI METHODO  
LIBRI QVATVOR.

29458

HIPPOCRATIS COI DE MEDI-  
CAMENTIS PVRGANTIBVS LI-  
BELLVS IAM RECENS IN  
LVCEM EDITVS.

W.



Bullen

-157

PARISIIS  
PER CONRADVM NEOBARIVM.  
M. D. XXXIX.

Cum priuilegio in biennium.



Jo: mab gonbon



ILLVSTRISSIMO PRINCIPI

AC DOMINO ALBERTO MAR-

CHIONI BRANDENBUR-

gensis, stetinæ, pomeraniæ, cassu-

borû, & sclauorû Duci, burg-

grauius Norimbergen.

si, ac rugiæ prin-

cipi, domino suo clemen-

tiss. Leonhartus

Fuchsius,

S. P. D.

NNO ABHINC VNO scribēdi

Illustrissime princeps, id ip- metho-

sum à me studiosis quibus dum hāc

dam efflagitantibus, meden- occasio.

di quandam rationem per-

breuem admodum conscripsi: non in hoc sa-  
nè, vt Galeni quos ea de re posteritati reli-  
quit optimos ac absolutissimos, aliorūque  
Græcorum commentarios medicinę initiatis  
de manibus excuterem: siquidem hoc insti-  
tuto quid absurdius ineptiusque aut dici aut  
excogitari posset? sed vt iis qui prolixitate ac  
difficultate operū Galeni reliquorūq; Græ-  
corum deterrētur, & hoc nomine ad Arabes  
atque ineptissimam barbarorū medicorum  
turbam deficiunt, consulerem, ac quasi viam  
ad Galeni, qui ceteros omnes superauit, scri-  
pta facilius assequenda struerem. nihil enim



æque optamus, atque ut iis nostris commen-  
tariolis adiuti melioris medicinæ studiosi,  
gradū faciant ad ea cognoscēda, quæ plenius  
de curandi ratione Galenus tradidit. Perspe-  
ctum nāque habemus, quā pauci admodū  
sint hodie medicinam exercentes, qui ex Ga-  
leni, optimi sanè authoris, præscripto curādi  
indicationes scrutentur, quū vnusquisque fe-  
rè sibi peculiarem quē in medendo sequatur  
autorem, cūque nō raro pessimum, propo-  
nat: hūcque sic mordicus teneat, ut ne latum  
quidem vnguē ab illius decretis discedat.  
Qua quidem ratione fit, ut quāplurima quo-  
tidie errata inter medendum admittant, qui  
syncero iudicio destituti temere quosuis se-  
ctantur: quæ facile declinarēt, si ex Galeni ma-  
gis quā eius farinae indoctorum hominū  
sententia & consilio ægrotis mederi vellent.  
Proinde ut tandē ab errore suo ac temerario  
instituto deducerentur, atque ad eō ad frugē  
bonam redirent, neque haberēt quod subin-  
de desidia suæ & ignorantia prætenderent,  
hanc medendi rationē ex Galeni, & hūc ma-  
gna ex parte sequentiū Aëtii & Pauli monu-  
mentis cōflatam, edere voluimus. Speramus  
enim illam his qui ad veterū medendi ratio-  
nem propius accessuri sunt, adiumento, & ut  
Græci dicūt πρὸ ὁ δὲ, futuram esse. Nam ut  
hanc penitus attingant, utcunque etiā anni-  
ratur, hoc præsertim tēpore, fieri minimè po-



test. Quum enim veterum curandi ratio duabus potissimum rebus constet, nempe Preceptis, quæ vnde curandi indicationes petendæ sint, monstrant: ac morbos pellētibus medicamentis, eam quidem quæ indicationes docet, hac etiam tempestate perfectissimè consequi licebit: alteram verò, quæ medicamentum inquirat, nequaquam. Multa enim cū simplicia tū composita, quibus illi in profligandis morbis vti, esse constat, quæ omnium quotquot hodie viuūt, cognitionem subterfugiunt, atque adeò in vsum reuocari haud possunt: ita ut necessitate quadam compellamur, loco illorum nostratib⁹ & vſitatis, iis maximè quorum & formæ & facultates nobis cognitæ sunt, vti. Quod sanè mecū ipse reputans, veterū medendi rationi semper eā etiā quæ hodie vſitata est, quoad eius fieri cōmodè potuit, in iis meis de curādi ratione cōmētariis cōiunxi. Qui enim has temerè separāt, haud dubiè omnia perturbāt, ac cælū terrę miscunt. Quod itaq; ad curandi indicationes attinet, veteres & Græcos planè imitatus sum, quòd illi eas p̄ ceteris omnib⁹ rectissimè tradiderin. Quare uero miretur, q̄ ab Arabū ac recentiorū practitorū, ut vocant, placitis multis in locis discefferimus. iudicio enim idipsum, nō errore factū. Nā cū hoc planè nostrū sit cōsiliū, ut rerū medicarū studiosos à barbaris & ineptis autoribus ad optimos, atq; adeò eos qui pri-

Veterū  
medendi  
rationem  
hoc tem-  
pore exer-  
ceri pror-  
sus non  
posse.



stinā medēdi rationem syncerissimē docēt,  
 reuocem<sup>9</sup>, studio ac data opera eas quas illi  
 præscribunt curandi indicationes, vtpote er-  
 roneas, & à veritate prorsus abhorrentes con-  
 tempnimus. Pleraq; etiā ex Galeni & reliquo-  
 rum Græcorum sententia, quæ nemo ferē no-  
 strorum medicorū vsurpare audet, etsi cum  
 magna laude & ægrotantiū salute illis vete-  
 res vsi sint, inferere studuimus, vt hac ratione  
 nostros etiam, quo iisdem confidentius vte-  
 rentur, inuitarē. Nam cū tantoperē ab iis  
 quibus veteres feliciter vsi sunt, abhorrēt, sit  
 vt itereā paucos, imò propē nullos, magnos  
 morbos curent. parum certe memores illius  
 Hippocratici, summis morbis summa exqui-  
 sitē remedia optima esse. Neq; interim etiā  
 animaduertunt, quā malē passim ob illas  
 suas blanditias ac assentationes audiāt: quòd  
 scilicet mācipiorum ritu, vt Galenus inquit,  
 contra planē quā veteres illi medici ab Ae-  
 sculapio oriundi, qui tanquam duces militi-  
 bus, & reges subditis imperare ægris volue-  
 runt, egrotis pareant & obsequantur. Verū  
 metum hunc haud dubiē inscitia, qua prædi-  
 ti sunt, incutit. neq; enim illis ex postulantibus  
 actorum suorum rationē reddere valēt:  
 tam sunt profus omniū eorum quæ tradunt  
 Galen<sup>9</sup> & veteres medici Græci, ignari: adeo-  
 que malunt cum multis temerē errare, quā  
 veterū probē excogitatis remediis vti. Cæ

2. Aph. 6

Medico-  
 tū nostri  
 seculi blā-  
 ditia no-  
 tantur.



terum quod ad alteram partem, quæ medica-  
menta docet, spectare videtur, ea tantum in iis  
de medendi ratione libris produximus, quo-  
rum hodie est in officinis frequens usus, &  
quibus nos sæpe, idque non sine magno egro-  
rum comodo, uti sumus. Quapropter usitata  
& cognita officinis vocabula, parum tamen  
latina interdum admiscere coacti sumus, ne  
si latinis perpetuo uteremur, ab iis non intel-  
ligeremur. vnicè tamè cauimus exotica, pre-  
ciosa, & paratu difficilia medicamenta: quod  
plurima illorum, eò quod neque illis qui ven-  
dunt, neque etiam iis qui emunt, satis cognita sint,  
adulterina esse verèdum sit. Mercatores etiam  
in iis extrudendis (tanta est illorum insatia-  
bilis avaritia) maximè student, ut primùm de-  
teriora vendant. quod dum faciunt, interea  
etiam quæ bona sunt, diutius retenta, carie ac  
vermibus exesa, deteriora euadunt. Pharma- Pharma-  
copolæ autem penè omnes, non minus quam copolæ  
illi, quæstui inhiantes, ac pecuniam parcè & notantur  
restrictè erogantes, non nisi pessima emunt.  
Et quum etiam in hoc genere reperiantur vi-  
ri aliquot boni, tamen quia magna ex parte  
indocti sunt, & meliora ignorat, usitata dun-  
taxat, quæ ut plurimum adulterina sunt, ad  
conficienda medicamenta sua comparant.  
Quapropter stolidorum & indoctorum me- Medico-  
dicorum cõsiliu probare non possum, qui rum quo-  
in exercenda medendi ratione nullis ferè me- rundam



huius etatis stoliditas. dicamentis, nisi ea quæ illorum compositio-  
 ne constituunt à quatuor orbis partibus pe-  
 tita sint, vtitur. Neq; enim intelligunt, quàm  
 periculosum sit ea vsurpare medicamēta, quæ  
 nec ipsi, nec qui eadē vendunt ac præparant  
 Sepiasarii satis perspecta habeant. Quòd ve-  
 rò illis vtantur, non fit alia ratione, nisi quòd  
 eos autores à quibus in medendo toti pēdēt  
 vsos esse vident: non magnoperè laborantes  
 qualia sint, aut vnde allata. Qui igitur sapiūt,  
 nostratibus, & paratu facilibus, cognitisque  
 potius quàm peregrinis, paratu difficilibus,  
 & incognitis vtentur: quod eorundem, quem  
 in abigēdis morbis obtinent, effectus, vt ple-  
 runque est exoticorum, dubius esse non pos-  
 sit. Quod nō eò dico, quasi peregrina & aliū-  
 de ad nos delata medicamenta in vniuersum  
 omnia ex officinis extermināda putē: in quo  
 sanè errore malefanos quosdam nostri seculi  
 medicellos versari compertū habeo: cū mul-  
 ta sint eiusmodi, quibus etiam si nostratia sin-  
 gula perspecta haberem⁹, carere sine magno  
 ægorū incommodo non liceret. qualia sunt  
 aloë, cassia fistularis, myrobalani, scāmonia,  
 & id genus non pauca. Sed eorum duntaxat  
 damnamus studium, qui cōtemptis nostrati-  
 bus propè omnibus, ea tantum vsurpant, quæ  
 planè exotica sunt, & neq; ipsis, neq; aliis co-  
 gnita. Memini enim me aliquot nostri tēpo-  
 ris medicorū, qui in magno habebant precio



vidisse cōpositiones ex eiusmodi medicamē-  
tis cōcinnatas, quorū nuda solummodo ex-  
tarent nomina, atq; adeò quę nec ipsi, nec Se-  
plasiarii nouissent, aut vnquā vidissent. Nec  
cur id facerent potui satis diuinare: nisi fortē  
ambitione ducti, cæteris quòd peregrina &  
nemini nota proferrent, doctiores videri vo-  
luerint: aut hac ratione cauere, ne suis alii  
quoq; in medendis ægris vterētur. Quid mul-  
ta? exoticis ac preciosis parcè admodū vten-  
dum esse, neque tamen omnibus, sed iis dun-  
taxat quæ nobis iā multo vsu & experientia  
cōprobata sunt, iudicamus. Atqui cōstat ple-  
rosque esse, qui vtcunque etiā sæpiusq; moni-  
ti, in viam redire nolint: quos certè non ma-  
gnoperè curamus. Neque enim illis hāc me-  
thodum exarauimus, sed iis potius qui cādi-  
do animo ad veterē medēdi rationē aspirāt.  
Dignū siquidem est, vt qui veritatis lucē in-  
tueri dedignantur, in perpetua errorum cali-  
gine detineātur. Tibi vero colēdissime prin Dedicā-  
ceps, duas potissimū ob causas hos meos de tiōis cau-  
medēdi ratione libros dedicare cōstitui. Pri. sē.  
mū, quòd illis ex nominis tui auspicio & cla-  
ritate nonnihil autoritatis & gratiæ accedere  
posse sperē. Quis enim est qui nesciat, quā Marchio  
celebris, quāq; nobilis sit Marchionū Brā- nū Bran-  
denburgensium apud omnes nationes fami denburg-  
lia? neq; id sanè alio nomine, quā ob mul- nobilis fa-  
tas, casq; egregias virtutes, & res domi mi- milia.



litiaque prudenter & feliciter gestas. Nam  
 ut reliquis præteritis à proavo tuo, à quo tibi  
 Albertus nomen inditum est, exordiar, quis vnquam  
 Marchio Principum illo prudentior, & ad res bene ge-  
 Elector. rendas aptior ac foelicior? quis denique fa-  
 cundior? quis constantior? quis bellicosior?  
 Hincque adeò factum est, ut a Pio secundo  
 Pontifice Romano, viro eximio ac doctissi-  
 mo, mirificè laudatus sit, atque Teutonicus  
 Achilles dici meruerit. Sed missas facio alias  
 multas & insignes illius optimi Principis  
 virtutes: quas si singulas commemorare vel-  
 lem, vereor ut epistola capere possit. Ad au-  
 Frideri- itaque tuum olim clemētissimum Principem  
 chus Mar- venio, quem etiam ob singularem belli peri-  
 chio. tiam, aliàsque multas cum corporis tum ani-  
 mi dotes Maximiliano, prudentissimo ac o-  
 ptimo cæsari, constat fuisse charissimum, ad-  
 eò ut il'ius ductu bella quàm plurima non so-  
 lum in Germania, verum etiam Italia foelici-  
 ter gesserit. Nec à suis maioribus degenera-  
 Marchio uit parēs tuus charissimus, Cassimirus, Prin-  
 Cassimi- ceptus propter singularem prudentiam, animi  
 rus. moderationem, rerum denique bellicarum  
 mirificam peritiam, diutinumque vsum lon-  
 giori vita dignus. Hoc enim superstitē, vix  
 vnquam Turca immanissimus Christiani no-  
 minis hostis Vngariam sic totam inuasisset  
 atque occupasset. Neque enim dubitasset se  
 (tanta erat illius magnanimitas, & rebus etiā



penè desperatis constantia) viribus eius quā-  
tum vis magnis ac potentissimis Cæsarum  
adiutus auxiliis, opponere. verum è medio  
fustulit deus Opt. Max. tantum Heroa, quo  
Turcæ ministerio nostra delicta grauius pu-  
niret. Quid hic de patruo c. r. duce Borus-  
siæ referā: verum de hoc præstat nihil quàm  
pauca dicere. Tantæ enim illius Principis  
sunt virtutes, vt absolutum aliquod optimi  
principis exemplar, quod tu in primis, ali-  
que omnes principes sequi deberent, dici  
queat. Quū itaque is sit vestræ familia splen-  
dor, quī fieret vt patrociniū tuo freti ii no-  
stri labores, non aliquam apud studiosos ini-  
rent gratiam? Dein has meas vigilias c. r. nū-  
cupare volui, vt aliqua saltem ratione ani-  
mum, studium & voluntatem erga te meam  
declararē. Nam etsi, vt olim tibi assistere quo-  
tidie, exclusus locorum interuallis, haud pos-  
sim, tamen non minor est quàm cum præsens  
essem amor erga te meus. Neque enim non  
possum te summè diligere, si virtutes quas in  
te fitas esse perspectum habeo, mecum expē-  
do. Siquidem vt ameris ab omnibus, facit im-  
primis immensa illa humanitas, quæ in te  
puero adhuc elucebat, & quam quisque ipso  
etiam statim conspectu, nedum congressu  
animaduertebat. Nulla enim res est quæ si-  
bi non solum subditorum, imò aliorum  
etiam omnium animos ac benenolētiam sic

Albertus  
Marchio  
dux Bo-  
russiae.

Humanitas.



Christo-  
phorus  
Pistorius

conciliat, ac ipsa humanitas, lenitas, & mansuetudo. Quapropter in principe vnice detestanda est inhumanitas, vt quæ efficiat, vt à cyclope illo Homérico non multum absit, & confestim inuidiam comitem habeat. Humanitatis nanque opinione amissa, pro monstro planè ac portento habetur: vteunque aurio, gemmis, & serico ornatus incedat. Sed præstat nunc alias tuas virtutes prosequi, quãdo omnibus constet, Marchiones Brandenburgenses comitate reliquos omnes Germaniæ principes superare. Inter plurimas verò alias primum occurrit nobis immensa tua & in Deum & in homines pietas, quam olim dum viueret Christophorus Pistorius, vir ob præcipuam eruditionem perpetua memoria dignus, animo tuo magno studio instillauit. Quæ vta sanè certissima testis est, animum tuum à crudelitate & tyrannide alienissimū esse, ad ignoscendum vero promptissimum. Huic accedit, quòd æquitatis sis amantissimus, neque vt multi hodie solent principes, minus in delicta potèrum ac diuitum quàm infimorum ac pauperum esse animadaertendum putes. Neque omittendum hoc quòd animum tuum, non contentus generis maxima nobilitate, humanioribus etiam literis excolere volueris: in quibus consueque prouectus es, vt subinde ad historias, quæ te indices magis atque magis oblectabunt, atq; simul



instruent, per otium respicere queas. neq; dubito quin in studiis maiores progressus facere voluisses, nisi breui admodum tempore binos tibi præceptores fata ipsa surripuissent, utcumq; vero impeditur studiorum tuorum cursum prout institueras absolueri haud potueris, nihilominus tamen doctos maximo favore prosequeris, eosq; vnice colis: ductus haud dubie quorundam sapientissimorum principum exemplo, quos vides doctrinæ amore & conseruatione illustrius nomen quam finium ditionisque imperii propagatione sibi peperisse. Verum ut tandem laudandi finem faciam, mitto multas alias tuas excellentes virtutes, ne illas adulandi, magis, quam reliquos ad easdem excitandi studio commemorasse videar: atque hoc vnum monco, ut pergas subinde constanter amare doctos, tueriq; aduersus sycophantas studia ipsa: nec vnquam ab hoc laudatissimo instituto pestes illas aulicas, immenso in omnes doctos odio flagrant, te auocare sinas: nec committas vnquam, ut sirenibus istis, utcumq; suauiter canentibus, aures accomodes: sed doctorum & prudentium potius usus consilio, imperii tui habenas gubernas. sic enim non solum stabilietur tuum imperium, verum etiam apud posterum omni prorsus inuidia carebis, ac celebri fama vere illustris euades. Accipe igitur, illustris princeps, solitam clementiam nostras has vi-



LEONHARTI FUCHSII


gilia, atque ex iis salubria praecepta ad pro-  
fligandos morbos excerpe, quo salubriter vi-  
uere queas. Dignissimus etenim es non modò  
prospera, sed constanti & etiam perpetua  
bona valetudine, ut amplissimæ tuæ  
ditioni diutissimè præesse, ac  
Christianæ reipublicæ  
prodesse queas.

Vale.


Tubingæ, x i i. Calend. Iulii. Anno

M. D. XXXIX.











I

LEONHARTI FVCHSII DE  
MEDENDIS SINGVLARVM  
corporis partium à summo ca-  
pite ad imos vsque pedes  
passionibus, Lib. I.

DE ALOPECIA ET OPHIASI. CAP. I.

**A**ΛΩΠΕΚΙΑ passio est, quæ  
Latinis Alopecia dicitur. Fit  
vbi in capite areas deciduus  
capillus efficit. Sic appellatam  
hanc passionem ferunt, quod  
vulpibus frequenter accidat. Siquidē αλωπηξ  
Græcis vulpes est. οφίσις nomen latinum  
non obtinuit: passio est, quæ capitis partem  
læsam serpentis modo, quæ Græcis οφίς est,  
glabram ostendit. Arabes & Barbari medici  
primum passionis genus voce parum depra-  
uata Alopiciam, alteram vero Tyriam vo-  
cant: qua voce omnes serpentes, potissimum  
autem viperas, intelligunt. Vtrunque genus Causa.  
propter vitiatos humores contingit. Quem-  
admodum enim plantæ aliquæ ob humoris  
alieni ab ipsarum natura attractionem: sic  
etiam capilli propter humorum, ex quibus  
nutriri consueverunt, prauitatem corrumpun- Digno-  
tur. Quales autem sint vitiatii humores, scendorū  
ex colore cutis capitis dignosces. Aliquibus succorū  
enim mutata albidior apparet, aliquibus ni- nota.

a



grior, aut pallidior. Candida pituitam, atra melancholiam, pallida bilem flauam significat. At vitiosi humoris speciem certius agnoscendam, non leue etiam adiuumentum præcedens victus ratio cõferet: præsertim intelligenti, quoniam ciborum pituitæ, quoniam atræ bilis, & flauæ succum colligant. In primis itaque totius corporis purgationem adhibere oportet, aut pharmaco pituitam ducente exhibitto, aut quod bilem flauam aut nigram trahit, coniectura redundantis humoris, vt diximus,

**Curatio.** ex colore cutis facta. Nam si is albidior, quam pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem exhibebis: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus atque si nigrior conspicitur, quæ nigram detrahent bilem, offeres. Pituitosos humores Hiera ex colocynthide purgare consuevit, quam describit Paulus lib. 7. cap. 8. sub nomine Hieræ Archigenis. Hiera etiam simplex, quæ lib. 7. Ther. meth. & lib. 2. de Compo. medi. secundum locos cap. 1. à Galeno describitur, mirifice confert: aliquando elleboro nigro adiecto, vbi atræ bilis humorem expurgare volueris: aliquando scammonia, si flaua bilis purganda erit. Quin & ex aloë catapotia commodè sic patientes purgare solent. Habent autem hæc, colocynthidis partem vnam, aloes & scammonia vtriusque partes duas, cum succi absinthii parte vna: cõficiantur ex drachma vna cata-

**Purgatio**

**Catapota ex aloë.**



potia vndecim, & deuorāda præbeātur. Vſus hodiernis dieb<sup>9</sup> Hierę picræ triplex eſt. primus, ſub ſpecie pulueris in vino aut iure galinaceo, aut alio conuenienti liquore aſſumpti. datur ex pharmaco hoc drachma vna. Alter ſub forma catapotiorū, qui tritiſſimus eſſe ſolet. Tertius ſub eclegmatis ſpecie, quod etiā in officiis præparatū habetur. Cæterū poſt totius corporis purgationem apophlegmatifinis, maſticatoria hodie vocāt, pituitam ē capite detrahre præſtat. Hæc autē ex ſinapi, hyſſopo, ſtaphyſagria, pipere, origano, pyrethri radice, cubebis, & ſimilibus cōficiuntur, in hūc vel ſimilē modū. R<sup>x</sup> Piperis longi, nucis myriſticę, muſcatā appellant, añ 3 ſ. ſc. ſtaphyſagrię, pyrethri añ 3 ii. ſinapi, origani, añ 3 i. trita in puluerem cum melle aut cum cera quantū ſatis eſt, in formam lupinorū redigantur: quarum vna ad horę ferē vnius medietatem commanducetur. Poſſunt etiā prædicta contuſa in ſaccukū ex ſubtili pāno confectum reponi, & deinceps cōmanducari. Poſt hæc ad localia medicamenta accedendū erit, quæ diſcutiendi, attenuandiq; vires habeāt, inter quæ calidiſſimū eſt euphorbiū. Eo autē minus calidū thapſia, poſt thapſiā verò ſinapi & naſturtiū. Poſt hæc ſuccedunt ſulphur, nitrum, vterque elleborus, crucę ſemē, oleūq; laurinū. Quin & pix liquida muriū ſtercus, auſerinus adeps, ſed magis vr-

a ii

Apophlegmatismi.

Localia.



se, amygdalæ amaræ totæ vstæ, herinacei ter-  
restris cutis, & thus aceto acerrimo subactū.

Ante iam commemoratorū medicamento-  
rū vsum capillos nouacula tollere oportet:  
deinde patientem cutē per linteolum neque  
asperum neq; molle nimis, confricare, ac vi-  
dere ad quantū ruborem per huiusmodi fri-  
ctionē peruenit. Si enim per modicā frictio-  
nem statim rubescat, morbum sanatu facile  
iudicabis. Si vero vix post longam atq; mul-  
tam frictionē rubescat, difficile tū passionē,  
tum curationem ominaberis. Porro ad hūc

qui sequitur modum medicamenta compo-  
nes. R<sup>x</sup> Seminis erucæ, nasturtii, nitri, añ 3 i.  
s. thuris in aceto acri & forti macerati, 3 i.  
sulphuris viui 3 i. adipis anserini vrsini añ 3 i.

olei laurini § iii. misce, fiat linimentū, quod  
illinatur assidue. Aliud paulo validius. R<sup>x</sup>  
Euphorbii, thapsiæ, añ 3 i. ellebori vtriusque  
añ 3 s. nasturtii, erucæ, amygdalarum ama-  
rarum cum corticibus vstarum añ 3 i. sinapi  
3 s. olei nardini & laurini añ § ii. cere quantū  
satis est. formetur vnguentum, quo caput as-  
siduē illinatur. Sunt autem hæc præsidia sub  
calido aëre flatu carēte, & in sole adhibēda.

Quo in Si vero hyems fuerit, necesse erit vt in hypo-  
lo ap- causto, aut balneo adhibeātur. Præ omnibus  
plicanda verò animaduertere oportet, ne in fortium  
medicamentorū admotione cutis vltra quā  
conuenit cōcaleseat: id quod tum ex colore



ipsius, tum digitorum tactu deprehēdes. Color nanque rufus magis apparebit, & digitorum contactu satis calidam cognosces. Horū itaque animaduersionē habere oportet. periculum enim, iterum atque iterū repetito eorum usu, cutē exuri. Quare ad molliora trāseundum est. Plura autem paratu facilia medicamenta habet Galenus lib. i. de Compo. medica. secundum locos cap. i. Caterum cum morbus ex vitiatīs humoribus procreatus sit, necesse erit vt tota vict<sup>a</sup> ratio sit ex cibis & potu boni succi. De quibus Galenus in peculiari de his libello conscripto consulendus erit. De aliis passionibus capillorum & cutis capitis abunde scribit Galenus lib. i. de Compo. med. secundum locos: quas nos hic cōsultō prātermisimus, quādo rarō admodū in his eurādīs medicorum opera requiratur.

## DE DOLORE CAPITIS. CAP. II.

Cephalalgia Latine dolorem capitis sonat, & cum potissimum, qui non inueteratus est, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma sit. Barbari medici Sodom nominant. Huius autem duæ potissimum causæ sunt. Nunc enim ex sola intemperie simplici citra humorū cōplexum: nunc verò ex humorum copia accidit. Vementissimi autē capitis dolores fiunt, ob caliditatem & frigiditatem: moderati, ob siccitatem. Humiditas suiipsius respectu nullum

Κεφα-  
λαλγία.

Causæ.

Notæ.



planè dolorem inducit, nisi calori, aut frigori, aut humorum copiae adiuncta sit. Simili modo humoribus vel in toto capite, vel in aliqua tantum parte redundantibus calidis quidem ac frigidis vehementior, ficcis verò moderatior dolor inuadit, si tamen ficitas absque manifesta caliditate fuerit. Humidi autè, quantū in ipsorum ratione est, nullum prorsus dolorem afferunt, multitudine tantum grauantes, si citra obstructionem sint. Cum obstructione enim moderata, moderatè dolorifici cum forti, vehementer dolorosi sunt. Vt autè ordine omnia tractentur, & rectius assequatur, propria iuxta singulos affectus capitis dolores procreantes auxilia describemus, initium à calida intemperie sumetes.

DE DOLORE CAPITIS EX  
CALORE. CAP. III.

**Causæ.** Per calorem hic intelligimus, intemperiem calidam nudæ qualitatis. Hæc autè potissimum generatur ex solis ardore. omnes enim homines in sole æstiuo diutius versantes, capite incalescunt. Ex motu immodico, balneis, flammæ vicinitate, ira, furore, calidis affectibus, odoramentis, cibo calido & acri, cepis videlicet, alliis & porris. **Signa.** Qui ex ardore caput dolèt, eorum cutis tactu calida est, & primo statim manus iniecta aridior apparet, oculi rubent, frigidis tum perfusionibus tum inunctionibus gaudèt & iuuantur.



Euitādus aër calidus, nullum per flatū re- **Viētus.**  
 cipiēns, & calidis vaporibus refertus. Deligē **Acr.**  
 dus contrā is, qui natura frigidus, aut qui no-  
 stra arte sic præparatus sit ex floribus ac ger-  
 minibus frigida facultate præditis, per arcā  
 proiectis, & humi fufis, rosis nimirū, violis,  
 nymphaea, quā Nenuphar hodie nominant,  
 vitiū capreolis, ruborū ramis, & similibus. A-  
 qua etiā frigida de vasis in vasa trās fusa, aëre  
 refrigerare valet. Cibi sint natura frigidi, la- **Cibus.**  
 ctuca, portulaca, ptisana hordei, aut alica e-  
 iusdem, oua sorbilia, panis ex aqua, pulli co-  
 lumbarū cū omphacio (agrestā vocāt) cocti.  
 Pisces petrosi, & lac amygdalarū cum fursu-  
 rib. decoctū. Potu verò aqua vtendū est, nisi **Potus.**  
 quibusdā vētriculus propter aquæ potū sub-  
 uertatur: tū enim præstat vti vino aquoso, &  
 bene diluto, aut aqua in qua cinnamonū de-  
 coctū est, cui itybi domestici (endiuiā appel-  
 lant) sirupus, & acetosus simplex, aut oxyfac-  
 chara admixta sit. Cæterū somni ac quietis  
 cura in primis habenda est. coitū euitet: alui **Somnus.**  
 excremēta ac lotiū nō retineat, sed ab iis sese **Excremē**  
 suo tēpore exoneret. Exercitationes, frictio. **torū ex-**  
 nes, balneāq; fugiat. Irā, furorē, aliāsq; ani- **purgatio**  
 mi perturbationes corp<sup>9</sup> excalfaciētes, pror- **Exerci-**  
 sus nō admittat. Vitādus igitur clamor, cōtē **tia.**  
 tio, omnisq; mētis perturbatio & perculsio. **Animi**  
 In bona autē animi habitatione & firmitate affectus.  
 degēdū. Dolorē autē capitis ē caliditate cu- **Curatio.**



rant, ea quæ refrigerandi facultatem citra manifestam adstrictionem obtinet. Optima verò censenda, quæ tenuium partium substantiâ prædita sunt. Quapropter in principio quidē nihil præstantius, quàm oleo rosaceo probè apparato caput perfundere. Proximum à rosaceo chamæmelinū locū habet, in iis corporibus, quibus vehementem frigiditatem inducere veremur: qualia sunt foeminarum & eunuchorum ac puerorum, & quicumque carne molli præditi, albumque habentes colorem. Sed si vehementer infrigidari oporteat, semperuiui succum, aut lactucæ, aut psyllii, aut polygoni (corrigiolam appellant) adiacere conuenit. Quin & solani aliquando succum, & pampinorum, & vuarum immaturarum adiacere licebit. Vfus autem hodie sicut olim etiā obtinuit, ut prædictis medicamentis parum aceti, ut nimirum maiorem & penitus penetrantem vim induat medicamentum, admisceatur in hunc modū. R. olei rosacei § ii. aquæ rosacæ § i s. aceti § s. misce. Aliud. Aquarū semperuiui, lactucæ, solani añ § ii. aque chamæmeli § i s. aceti § i. misce. In Adhibi. tio medi us medicamētis lintheolū tingito, iuxtaque camento frontē, vbi pilosa eius pars desinit, & iuxta tēpora imponito. Occiput hoc medicamēto tãgi haud debet. neque enim citra molestiā refrigeratia sustinet, propterea quod isthic principū medullæ spinalis existat. At si niciput ob



laxitatē coarticulationis iuxta coronalē suturā, & ob ossiū tenuitatē & raritatē, facilē tū caliditatē tum frigiditatē omnium quæ adhibentur medicamentorum intrò distribuit. Refrigerāda autē quæcūque adhibētur medicamenta, in aqua vehementer frigida collocata: quæ si non adsit, niuem aut glaciem vasculo circūpones. Eodem sanē modo oleis aliis vti licebit, vt est cotoneorū, violaceum, & nymphaeæ, nenupharinū hodie nomināt. Interdū adiciere mucilagines, vt vocāt, seminis psyllii, & cotoneorum, ac linimētum conficere in hunc modum. R<sup>x</sup> Mucilaginis sc. co  
 toneorum, mucilaginis sc. psyllii añ 3 iiii. suc-  
 ci portulacæ 3 ii. olei rosacei ꝑ i. misce, fiat li-  
 nimentum. Cum adiectione ceræ, & aliorū  
 medicamentorum vnguenta efficies in eum  
 modum. R<sup>x</sup> vnguenti populeon 3 i. oleorum  
 violarum, & rosacei añ 3 iiii. florū nymphaeæ  
 aridorū, rosarum rub. añ 3 i. ceræ quantum  
 satis est: fac vnguentum, quod illinatur fron-  
 ti & temporibus. Proderūt etiā embrochæ ex  
 rosis, violis, florib<sup>9</sup> nymphaeæ, foliis salicis,  
 hordeo excorticato, portulacæ, vitis, ac simi-  
 libus. Si somnū conciliare volueris, adde pa-  
 paueris lactucæq; folia. Hæc quidem, vt di-  
 ximus, inter initia morbi remedia cōgruent.  
 Postea verò mitigantia ac maturātia medi-  
 camenta reprimentibus miscere oportet, in  
 hūc modum. R<sup>x</sup> Florum rosarū, violarum, añ

Linimen-  
tum.

Embro-  
cha.



# LEONHARTI FUCHSII

Ms. foliorū salicis, herbarū camæmeli, meli-  
loti, añ m i. se. maluæ 3 iiii. hordei excortica-  
ti § i. Coquantur omnia in aquæ fß ii. vsque  
ad tercię partis cōsumptionē, fiat embrocha.  
Tandem ex discussoriis medicamētis quip-  
piam addendū, paulatim detractis iis quę re-  
pellunt. Haftenus de iis quę extrinsecus cor-  
pori adhibētur. Intra corpus assumi possunt  
vsitata hodie medicamēta, Iuleb violarū, ro-  
sarum, conseruæ eorundem, confectio quam  
manum CHRISTI appellant, & alia eius-  
modi, quibus alterandi inest facultas.

## DE DOLORE CAPITIS EX FRI- GORE. CAP. IIII.

**Causæ.**

**Signa.**

**Vicæus.**

Per frigus intellige intemperiem frigi-  
dam nudæ qualitatis, citra alicuius humoris  
frigidi confluxum. Hæc contrahitur ab am-  
biēte nos aëre frigido, potissimū si quis aper-  
to capite in hoc versetur. Cibis & potu frigi-  
dis, præcipuē autē frigida aquæ potione, &  
in ea naratione: frigidorū medicamētorum  
improvida admotione. Signa dolentium ca-  
put ob frigiditatē, cōtraria sunt eis quę ex ca-  
lore oriuntur. Tangentibus enim caput nul-  
lus sentitur calor, incōtracta minimēq; ari-  
da & decolor ipsorum facies existit. Oculi  
neq; rubēt, sed cōtrā sub tumido pallore de-  
formātur. Frigidis neque gaudent, neq; iuuā-  
tur. Caueat aërē frigidū, versetur in calido.  
Lactis vsum in cibo caueat, ac piscium, alio.



rumque, quæ comesta refrigerare possunt. Ovis sorbilibus, carnibus perdicum & phasiaporū similiūmq; vescatur. Dandū vinū tenuium partiū, quod tantū abest vt noceat, vt etiam plurimū cōducatur, quod nimirū calefaciendi extenuādīq; facultate præditū sit. Motu corporis vtatur, gestationeq; in equo. Sōnus illi cōfert mediocris. ideōq; plus vigilandum erit illi quā dormiendū. Lauacra calida profunt. Animi perturbationes, tristitiā, Curatio. grauēsq; cogitationes euitet. In admouendis autē medicamētis cerebri natiūū temperamētū cōsiderandū erit. quod tale est, vt neq; vehementer calida, neq; etiā vehementer frigida ferat medicamēta. Cōuenit autem in hoc omnibus, quod oleū rutaceū calidū, sincipiti (vt suprā dictū est) adhibitū, perfectē hominē liberare possit. Si verò vehementiori calefactione sit opus, piper aut euphorbium ad oleum cōiiciatur, aut aliquid olei de piperibus, vel euphorbii rutaceo oleo immisceatur. Conueniunt etiam haud secus atque rutaceū, laurinū, itēq; irinū oleum. quibus non solum frons, verū etiam facies & nares inungendæ erūt. Prædictis oleis alia quædā medicamēta calida adicere licebit, atq; vnguentum hunc in modū conficere. R<sup>x</sup> oleorū irini, rutacei añ ꝑ s. maioranę, betonicę, piperis añ ꝑ i. euphorbii gr. v. cerę quod satis est, fiat vnguentum. Neq; parum proderunt embro-

vnguentum.



**Sacculus** cha ex floribus meliloti & camomille, maiorana, origano, betonica, sambuco, salvia, foliis laurinis, stœchade, & similibus in aqua decoctis. In eundem usum sacculi adhiberi possunt, sic confecti. R̄ Foliorum lauri, serpilli, maioranæ añ m s. florum rosmarini m i. rutę p i. garyophyllorum, stœchados arabicę añ 3 i. pulegii, calamenti añ 3 i s. teratur singula, & fiat sacculus capiti adhibendus. Imponatur autem capiti calefactus in latere, acetôq; prius irrigatus. Nec alienum ab instituto erit, si quis pomum aliquod odoriferum in hunc modum composuerit. R̄ styracis calamitis 3 ii. gariophyllorū, maceris, ligni aloës añ 3 s. lauendulæ 3 i. galliæ moschatæ 3 i s. moschi, ambræ. g. iii. Teratur omnia subtilis simè, & cum aqua maioranæ & stacte, (stœracē liquidam vocant) quod satis est, fiat pomum. Intra corpus adhiberi possunt, eclegma diacori, confectio diambæ, diamoschi dulcis, diantos, syrupus de stœchade, & alia calida medicamenta, quorum singulati fa cere mentionem superuacaneum fuerit.

DE DOLORE CAPITIS EX  
SICCITATE. V.

**Causa.** Per siccitatem accipe intemperiem siccam nudæ qualitatis, quæ potissimum ex immodica corporis vacuatione, siue ea per medicamenta, siue aërem ambientem, famem, coitum, exercitia, animique perturbationes



acciderit, euenire solet. Deprehéditur si pau- **Signa.**  
 ca aut nulla penitus ex naribus excrementa  
 effluxerint, oculi concaui fue rint, plurimūq;  
 vigilauerint. Versetur in aëre humido, vesca **Victus.**  
 tūrque cibis humectātibus, & boni succi, vi-  
 tellis nimirum ouorum, testibus gallorū co-  
 rundémq; iure, phasianis, perdicibus, & aliis  
 quæ plurimum nutrire possunt. Vinū bibat  
 tenue & aquosum, somno vtatur largiori. Ca-  
 ueat motū corporis, ac quiete potius otioq;  
 vtatur. Coitum, famem, sitim, & omnia quæ  
 exicare possunt, fugiat. Lauacra quæ hume-  
 ctare valent (vt sunt, Galeno lib. 3, de Tuéd.  
 valetu. autore, dulcium calefactarum aqua-  
 rum, si tepidiores fuerint) non parum prode- **Curatio.**  
 runt. Lætetur, atque omnem animi perturba-  
 tionem & percussione vitet. In hoc morbo  
 capiti adhibendum erit oleum violaceum,  
 amygdalinum, quod scilicet ex dulcibus cō-  
 fectum est amygdalis. Inungendum verò iis  
 nō solum sinciput, imò etiam naribus instil-  
 landa erūt. Non temerè iam dictis oleis pin- **Linimen-**  
 guedines ammiscentur, ad eum modū. R<sup>x</sup> o- **tum.**  
 leorum violacei, nymphæ (nenupharum  
 nominant) añ 3 iii. pinguedinis vitulinæ, gal-  
 linæ, butyri recentis salis experti, añ 3 ii. mi-  
 sce, fiat linimentū. Neque à ratione alienum  
 erit, si aliis, nempe farina hordei, violis, aut  
 nymphæ adiectis vnguēta & emplastra cō-  
 feceris. Proderit etiam, embrochas ex violis,



similibusq; herbis compositas adhibere. Intra corpus ea adhibenda erunt, quæ tabidis conueniunt, de quibus suo dicemus loco.

DE DOLORE CAPITIS ET PLENITUDINE. CAP. VI.

Plenitudo.

Causæ.

Signa.

Haftenus de curatione doloris capitis quæ ex nuda qualitatū intemperie prouenit, egimus: iā de eo qui ex plenitudine oritur, verba faciemus. Plenitudinē autē vocamus, id quod Græci *πληθωσι* ἢ, *πληθώραν*, quæ nihil aliud est, nisi quum quatuor humores ex æquo aucti sunt, aut cū sanguis solus abundat. Idem enim est, quando syncerus sanguis in venis contineri nō possit, quin aliquid bilis, vel pituitæ, aut serosi humoris illi cōmixtum sit. Hoc itaque aucto, ut reliqui etiam omnes humores increscant, necesse est. Atque hinc est, quod recentiores hūc capitis dolorem ex sanguine nominauerint. Fit ab iis quæ plenitudinē in corpore procreare possunt, hoc est, quæ omnes ex æquo humores abundare efficiūt, ut sunt cibi & potus copiosi & boni succi, neglectio exercitiorū, balnei, sudoris, & aliarum vacuationum naturalium & artificialium. Facies & oculi rubent, venæ tenduntur, adeo ut nō maiores duntaxat, sed etiā parue, quæ prius sensum effugiebāt, nūc visu cōprehendātur. Pulsus magnus & vehemens. Urina subrufa ac crassa. Venæ temporū pulsant. Dolor capitis grauatiuus.



Versetur in aëre frigido & sicco. Vitet car- Victus.  
 nes, oua forbilia, & alia quę copiosę nutrire  
 possunt. Utatur ptisana hordeacea, aut alica  
 hordei. Oleribus frigidis, intybo (scariolam  
 & endiuia vocant) portulaca, & similibus  
 vescatur. Fugiat vinū, bibat aquā decoctiōis  
 cinnamomi, aut hordei. Exercitetur medio-  
 criter, fricetur, frequenti utatur balneo, ita ta-  
 men ut corpus prius vacuetur, & æger mini-  
 me febricitet. Sōnus sit mediocris. Gaudeat  
 & lætetur, animiq; omnis perturbatio absit.

Primū omnium curādi ratio à sanguinis Curatio.  
 missione auspicetur, ac vena in cubito exte- venæ se-  
 riore, quam humeralē & cephalicā hodie vo ctio.  
 cāt, eius partis in qua dolor potissimū est, in-  
 cidatur: quod nimirū hæc vena capiti sit cōti-  
 nuata: atque adeo non solum in contrarium  
 auellere, verumetiam euacuare partem affe-  
 ctam possit. Id quod non solum Galenus, ve-  
 rum etiam Razes lib. 9. ad Almāsorem Cap.  
 1. faciendum suadet. Quod si ætas, aut virtus  
 imbecilla venæ secandæ consiliū interturba-  
 rint, cucurbitæ affigendæ erunt: nō quidem  
 capiti, sed membrīs ei cōtinuatis, & cū eo so-  
 cietatē habentibus. Sic enim Galen. lib. 13.  
 The. meth. ca. 13. docet, ita scribēs, Generādis  
 adhuc passionib. minime iis partib. quæ la-  
 borare incipiunt, sed quæ iis sunt cōtinuatæ,  
 cucurbita imponi debet, auellendi in con-  
 trariū causā. Post hæc refrigerātia & adstrin- Localia.



gentia medicamenta capiti adhibeantur, de quibus abundè suprà in cap. 3. dictum est. Al uis etià, vt aperta sit, medicus diligenter curet: ideoque si sponte sua excrementa corporis non deiecerit, hoc vel simili decocto purgetur, quod R<sup>x</sup> Florum boraginis, buglossæ, violarum, rosarum añ m s. se. quatuor cōmuniū frigidorum maiorum excorticatorum añ 3 ii. myxorū (sebestē appellāt) prunorum damascenorū añ numero xii. passularum, tamarindorum añ § i. corticum myrobalanorum luteorū, (citrinos hodie nominant) cæruleorum (indos appellant) cepulorum (chebulos vocant) empeliticorum (emblicos nuncupāt) beletzicorum (belliricos corrupta voce dicūt) añ 3 iii. glycirrhizæ rasæ, liquiritiæ appellant, § i. fumi terræ, adianti, capillū verneris nominant, añ m i. tamaricis (tamariscū vocant) hemionitidis, scolopendriā dicunt, añ 3 iii. foliorū senæ, polypodii añ § s. agarici 3 ii s. zingiberis 3 s. decoquantur singula in aqua fontana sufficienti, donec medietas eius consumatur. Dein coletur, & saccharo sufficienti dulcescat, clarificeturq; cum albuminib. oui, & fiat potio depurata. de qua æger in aurora § iiii bibat. Quod si validius requirat medicamentum, tum præstiterit in § iiii. iniicere rhabbari in puluerem redacti 3 i. spicæ 3 s. aut in iis dissoluere casū fistularis § i s. aut mellis aërii, mannam vocant,

Decoctū  
purgans.



§ 1. Aut eclegmatis diaphenicôn 3 iii. In eundem vsum exhibebis syrupū violaceum, & oxyfacharam nominatā. Posthæc adhibēda capiti sunt medicamenta quæ reliquias morbi discutere valent, vt est althææ semē, fœnū græcum, chamæmeli melilotiq; flores. Olea denique, chamæmelinum, anethinum, & similia. Ex quibus linimēta, vnguenta, emplastraque cōponi possunt, ad modum in præcedentibus capitibus monstratum.

DE DOLORE CAPITIS EX BILIOSIS HUMORIBVS. CAP. VII.

Fit ab omnibus iis, quæ corpus præter naturā calefaciunt & exiccāt, adeoq; bilem flammam procreāt, vt sunt vehementia exercitia, ira, victus ratio ex biliosis cibis constās, vita curiosa, & similia. Signa in hoc similia sunt ei q̄ ex calore oritur, maior tamē in hoc morbo, & faciei pallor. Interim etiā oris amaritudo, oculorū siccitas, linguæ & nariū est. Acti etiā vigēti, & temperaturis calidioribus, vitæq; sollicitæ, & his qui flauā coaceruāt bilē, hæc passio præcipuē accidere solet. Moretur in aëre frigido & humido, qui arte etiam, vt suprà ostensum est, confici potest, si pauimentum ædiū assiduē humore aspergatur: aut flores ac germina, quæ frigida humidæq; facultatis sint, per areā proiciantur. Cibi in vniuersum humidi & boni succi sint. Vescatur laetucis, portulaca, piscibus paruis & saxatili.

Causæ.

Signa.

Vitæ.



bus. Potus sit dilutus, aqua decoctionis cin-  
namomi. Vino prorsus abstineat. Quiescat,  
& somno utatur largiore. Balneū quoque illi  
temperatum, & vnctiones cōferūt. Gaudeat,  
Curatio. & omnes animi perturbationes fugiat. Curā-  
di ratio à biliosi humoris euacuatione, nō vt  
loquuntur barbari, digestionē auspicanda.  
Biliosi Neque enim tenues humores, qualis est bilis  
humores flaua quādoquidē mobiles sunt, vacuationi  
nō egent inepti esse possunt: atque adeo vt præparētur  
præpara- nō indigent, veluti in cap. 11, libri secūdi Pa-  
tione. radoxorū monstrauius. Vacuatur autē bi-  
liosus humor per absinthii cremorē, aut per  
aloē, & per hieram picram per se datā, aut  
catapotia ex aloē confecta. Neq; absurdum  
erit, si quis decoctum purgans, cap. 6. descri-  
ptum exhibeat, atque in eo dissoluat 3 iiii. cc.  
legmatis de succo rosaceo, aut de psilio vo-  
cati. Proderit etiam rhabarbari dilutū (infu-  
sionem hodie nominant) in hūc modū cōpo-  
sitū. R. rhabarbari selecti 3 ii. spicæ 3 i. con-  
cidantur minutatim, & macerentur in succis  
Dilutum intybi domestici, cassutæ (cascutā appellant)  
rhabar- buglossi (borraginem nominant) añ 3 i. vini  
bari. optimi 3 s. Durent horis duodecim in infu-  
sione: dein valide exprimantur & colentur,  
adiectis eclegmatum de succo rosaceo, de  
psilio añ 3 i s. misce, fiat potio. Vti etiam li-  
cebit catapotis aureis, alephanginis, de rha-  
barbaro, de hiera simplici nominatis, & simi



libus. In delicatis non temere quis hoc bolo  
 utetur. R<sup>x</sup> scāmonia præparata ð i. maceris,  
 cinnamomi, mastichis añ gr. iiii. cōserua vio- Bolus.  
 larū, nymphæa añ 3 i. sacchari quod satis est  
 fiat bolus. Proderit etiam clysteribus uti, in  
 hunc modum confectis. R<sup>x</sup> Maluē, althæa,  
 intybi vtriusq; domestici, hoc est, endiuia & Clyster.  
 scariolæ, violarum añ m i. hordei integri § i.  
 sc. quatuor cōmunium frigidorum minorū  
 añ 3 iiii. Coquantur singula in aqua fontana  
 ad tertiæ partis cōsumptionem, & colentur.  
 R<sup>x</sup> colaturæ lb. i. medullæ casia fistularis § i.  
 hieræ picræ § s. olei violacei § iiii. vitellos o-  
 uorū numero ii. salis 3 i s. misce, fiat clyster.  
 Post biliosi humoris vacuationem, ea medi-  
 camenta quæ caput refrigerare ac roborare Localia.  
 possunt, adhibeantur, qualia multa cap. 3. hu-  
 ius libri commemorata sunt. Quod si vero vi-  
 gil supra modum æger fuerit, sinciput oleo  
 nymphæa, & de papauere inungedum erit.  
 Adiciere etiā interdum necesse est prædictis  
 parum opii, ut scilicet somnus hac ratione  
 concilietur. Galenus in eum vsum trigoni pa-  
 stillum, quem describit Paulus lib. 7. cap. 12.  
 commendat, ut eo frons inungatur.

DE DOLORE CAPITIS EX PITUITOSIS HUMORIBVS. CAP. VIII.

Generatur ab omnibus quæ pituita in ca- Causæ.  
 pite procreant, ut est aer frigidus & humi-  
 dus, cibi iisdē qualitatib. præditi, pisces, lac,  
 b ii



- Signa.** olera, fructusque. item ocium, somnus à plenitudine, & similia. Dignoscitur, si caput grauat, facies alba ac tumida fuerit. Si denique aeger somno facile tentatur, piger est, sensib<sup>us</sup> minime viget, & excrementis capitis redundat.
- Aer.** Aer aegrotum ambiens, calidus & ficcus, sit natura, aut arte per odora menta aliqua, cinnamomum nimirum, thus, gariophyllos, agallochon (lignum aloes nominant) praeparatus. Carnibus vescatur assis, & odoramentorum accessione conditis. Vinum tenuium partium confert. Motus mediocris, & alia quae supra Cap. 4. monstrata sunt. Ratio curandi à
- Curatio. praeparatio.** pituitosi humoris extenuatione & incisione auspicanda erit, in quem sanè usum mel rosaceum, oxymeli simplex, compositum, scylliticum, syrupus de stoechade cum succis hyssopi, betonicae, maioranae, & salviae conueniunt. Vel si usus syruporum & succorum displicuerit, hoc decocto uti licebit. R. Radicum foeniculi, petroselini, apii añ ʒ i. radicis peoniae ʒ ii. seminum anisi, foeniculi, fileris montani, fesei Galenus vocat, añ ʒ iii. stoechadis arabici, origani, serpilli, maioranae, calamenti, betonicae, salviae, añ ms. cinnamomi selecti, maceris, añ ʒ i s. Decoquantur iuxta artē in aqua sufficiens, usque ad medietatis consumptionem. colatur, & colatura saccharo quod satis est, dulcescat, atque subinde cum oui albumine depuretur. Adde syrupi de hyssopo,



oxymelitis simplicis añ § iiii. misce, fiat potio. Præparatis ac extenuatis iā humoribus pituitosis, reliquū est vt purgati medicamentis euacuentur. In quem vsum proderunt pilulæ de hiera composita, coctiæ, & sine quibus esse nolo. R<sup>x</sup> Massæ pilularū coctiarum 3 i s. pil. de hiera composita 3 i. elephanginarum 3 s. agarici trochiscati 3 ii. myrobalanorum cepulorū, chebulos hodie nominant, 3 i. turbit optimi 3 s. stœchados arabici, zingiberis, añ gr. v. mastichis gr. vii. granorū pæonia numero iii. castorei gr. iiii. cum succo lauendulæ. fiant pilulæ pro singulis drachmis numero xi. Conferunt etiam clysteres, non solum propter euacuationem eorum quæ in intestinis cōtinentur, sed etiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur. In quem vsum prædictū decoctum præparas componentia medicamenta conducent, si colaturæ § xii recipiantur, & in ea dissoluantur benedictæ laxatiuæ § s. eclegmatis Indi 3 iii. diaphenicōn 3 ii. mellis rosacei § i. oleorum laurini, rutacei, añ § i s. salis gemmæ vocatæ 3 i. misce, fiat clyster. Toto vacuato corpore, ea quæ caput expurgare possunt, adhibenda erūt ex quorum numero sunt apophlegmatismi, de quibus cap. i. abundè dictum est. Purgatur etiam caput per ea medicamenta, quæ hodie Caputpurgia voce barbara nominant. Conficiuntur ex succo maioranæ, bliti, bras-

Purgatio.  
Pilulæ.

Clyster.

Capitis  
purgatio

b iii



- Gargarismi.** siccæ, & huiusmodi. Gargarismi etiâ hoc nomine adhiberi possunt ex succis hyssopi, betonicæ, origani, hiera picra, & oxymelite cōfecti, vel in hunc modū. R. Radicis pyrethri, piperis longi, añ 3 i s. sc. staphysagrie 3 s. maioranæ, pulegii, hyssopi, origani, betonicæ, añ m s. Decoquantur singula in aqua idoneæ quâtitatis, donec tertia eius pars absumatur. Colaturæ adice mellis rosacei § i s. oxymelitis scyllitici § s. misce, fiat gargarism<sup>o</sup>. **Sternutamentum.** tametorū etiâ hoc loco vsus erit, sic cōfectorum. R. Maioranæ 3 i. nigellæ 3 s. gariophyllorū, piperis albi, cubebarū, añ 3 i. nucis myristicæ, struthii (cōditi vocât) castorii, ellebori albi, añ 3 s. misce, fiat puluis. Ditioreb<sup>us</sup> adiciendū aliquid moschi & ambræ, cuiusque scilicet gr. ii. Narib<sup>us</sup> etiâ adhibere odoramenta calida cōuenit, aut pomū aliquod odoriferum conficiendū erit, quale suprâ cap. 4. commemorauim<sup>us</sup>. **Errhina.** Errhina etiâ, Nasalia appellât narib<sup>us</sup>. indita cōmodant. vt R. Seminis staphysagrie, pyrethri, piperis albi, añ 3 s. nigellæ, struthii, añ 3 ii. ellebori albi 3 s. redigantur singula in puluerē, & cū resina terebinthina fiant Nasalia. Post capitis purgationē cōueniunt inunctiones, embroche, sacculi, & similia medicamēta suprâ cap. 4. producta, quibus discutiēdi inest facultas. Intra corp<sup>us</sup> exhibetur cubebe saccharo obductæ, cōfectiones diambæ, diamoschi, aromatici rosacei,



diacumini, theriaca, Mithridati antidotus, diacori, cōseruæ maioranæ, rosmarini, betonica, & eiusmodi. Potissimū verū hæc confectio. R. Specierū aromatici ros. diambre, diamoschi dulcis, añ ð ii. specierū eclegmatis de gemmis, dianthos, añ ð i. cubebarū, maceris añ 3 s. agallochi (lignum aloës vocāt gariophyllorū, sc. fœniculi, añ ð s. cinnamomi electi ð ii. stœchados arab. ð s. sacchari cādidi-  
fimi § vi. in aqua florū pæoniæ & lauendulæ dissoluti, fiat cōfectio ī rotulis aut morsulis.

Morsuli.

Hic practicarum, vt vocant scriptores inferunt caput de dolore capitis ex melancholicis humoribus, præter tamē necessitatē, cum omnia quæ hic ab iisdem dicūtur, rectius in cap. de melancholia sint transferenda.

## DE CEPHALAEA. CAP. IX.

Cephalæa, diuturnus & ægrè cedēs capitis dolor Græcis appellatur, qui ex parua occasione maximas exacerbationes habet, adeo vt neque strepitus neque vocem vehemētiorem, neq; splendidū lumē, neque vini potionem, neque caput repletia odoramēta, neque motum tolerare possint: sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere cupiant, vt quibus veluti à malleo feriri caput videatur. Quidam etiam velut contundantur aut distendantur ea, quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis verò vsque ad oculorū radices dolor progreditur. Habet autē

κεφα-  
λαία

b iiii



- hic affectus aliquando quidem cōtinuos dō-  
lores, aliquando verò exacerbationes, & in-  
terualla siue ordinata, siue inordinata. Qui-  
dam etiam ex eis cerebri membranas doli-  
tant: quidam verò membranam tantum cal-  
uariam ambientem. Fit ex vaporum aut  
humorū calidorum vel frigidorum multitu-  
dine, intra caluariam vel extra cōtenta. Do-  
lores cum grauitate, humorū multitudinem  
significāt: cum mordacitate verò, aut humo-  
rum aut vaporū acredinem: cum pulsu autē,  
inflammationē: cum tēsiōne verò, siquidem  
citra grauitatem & pulsum fiat, flatus tenuis  
& ventosi multitudinem demonstrant: cum  
pulsu verò, mēbranosi corporis inflamma-  
tionem: Si verò, cum grauitate distētiō fiat,  
humorū multitudinem intra mēbranas con-  
tentam. Et dolores quidem in superficie hæ-  
rentes, membranæ os caluæ ambientis affe-  
ctum significāt: Qui verò in profundo sunt,  
cerebri membranarum. Quibuscūque enim  
affectus intra caluariam est, his vsq; ad ocu-  
lorum radices dolores procedunt, propterea  
quòd oculorum tunicæ ex cerebri membra-  
nis habeant ortū. Si verò humor putrefactus  
calidior fiat, cum febri caput dolitant. febri-  
citant autē omnino & qui ex inflāmatione  
dolent. Victus. Victus ratio ex superioribus de ca-  
pitibus petenda erit. Curatio. Curatio,  
si humorum aut vaporū multitudo cau-



fa fuerit, à vacuatione totius corporis auspi-  
 cabitur. A sanguinis quidem missione, si to Venæ se-  
 tius corporis plenitudo fuerit. Incidenda & 10.  
 verò vena primùm cubiti externa, eiusdem  
 quidem lateris, humeralem nominant. Et si  
 amplius sanguis redundare videatur, etiā ex  
 naribus aperta vena, quantum satis esse vide-  
 bitur, detrahare conueniet. Si verò caput tan-  
 quam imbecillū, ad se sublato humores ac  
 vapores excipiet, materiam in totum corpus  
 reuelleret oportet, atque ita particulæ affectæ  
 mederi. Per purgatoria itaque medicamen-  
 ta & clysteres, quorū omnium in superiori-  
 bus capitibus copia habetur, ligaturis extre-  
 mitatum, & pluribus infernarū partium fri-  
 ctionibus reuulsio fiat: præcipue autem hie-  
 ra, cuius vim (vt cap. primo diximus) exa-  
 cues, exhibenda est. Cæterum post totius cor-  
 poris vacuationem, caput vacuātibus vtēris,  
 apophlegmatismis nimirum, si pituitæ est  
 abundantia, & aliis medicamentis quæ nari-  
 bus induntur, cap. 2. commemoratis. Deinde  
 ea quæ robur addere possunt, admouenda.  
 Repellit igitur oleū ex oliuis immaturis ex-  
 pressum, & rosaceum, per se & cū aceto, aliā-  
 que quorum in præcedentibus facta est men-  
 tio. Adhibenda verò remedia tepida quidem,  
 vbi frigidior & crudior fuerit humorū mul-  
 titudo: frigida autem, vbi calidior & bilio-  
 sior extiterit. Post hæc, discutientia medica-



menta adhibenda erūt: veluti est oleum chamæmelinum anethinū, & similia suprà producta. Si verò crassior sit humorum multitudo, serpillum, aut pulegii comam, aut calaminthen, aut mentam oleo incoquendo, multitudinem euacuabis. Eadem hæc etiā robur parti affectę addunt, quapropter vsq; ad perfectam curationem eis vti conuenit. Omnium porro lōgè maximè discutit, & perfectè corroborat, verbenaca recta (verbenam appellant) viridis. imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillo, oleo incocta. Reliqua quę accurationem cephalææ scitu necessaria sunt, ex iis quæ antea de dolore capitis dicta sunt, discēs.

DE HEMICRANIA. CAP. X.

Finitio.

Hemicrania est passio dolorifica, quę circa dimidiam capitis partem, aliquando dexteram, aliquando sinistram cōtingit, & iuxta futurā secundum longitudinē eius extensam terminatur. Hæc vt plurimum per circuitus exacerbatur: ac quibusdā extra caluariā, quibusdā in profundo capitis, aliis circa temporum musculos dolor sentitur. Fit ex vaporū aut humorum siue multorum, siue calidorū, siue frigidorū per venas, vel arterias, vel per vtrasque influxu, quum scilicet ea sola quæ intra caluam cōtinētur, hoc est, cerebrū eiusque membranæ, quod in ipsis redundat, foras protrudunt: aut cū interdum partes cor-

causæ.



poris infra caput positæ, vitiatos vapores aut Sgna.  
 humores sursum mittunt. Notæ quibus hu-  
 mores multi, calidi aut frigidi deprehendun-  
 tur, ex præcænentibus capitibus petendæ sunt.  
 Quo autem in loco capitis passio fuerit, ex  
 iis quæ in Cap. de cephalæa dicta sunt, co-  
 gnosces. Quibus hoc adiiciendū erit, si mem-  
 brana caluam ambiens patitur, tum adeo ve-  
 hementer dolere, vt neq; manuū contactum  
 facillè ferant, ita vt ne cutis quidē ipsa omni-  
 no à passione immunis sit. Viçtus ratio ex su Viçtus.  
 perioribus de capitis dolore Capitib. petenda  
 venit. Præcipue autem vitanda erūt, quæ va-  
 porum copiam sursum mittere possunt, velu-  
 ti cepe, allium, sinapi, raphanus, & similia.  
 Qui vero hemicraniā curare aggreditur, pri Curatio.  
 us nū venæ sectione, aut purgatione eger in-  
 digeat, consideret. Si enim ob plenitudinem  
 passio orta fuerit, humeralis (quam hodie ce-  
 phalicam vocant) vena, quæ è directo partis  
 patientis est, incidenda erit. Sin vero propter  
 vnius humoris redūdantiam hemicrania in-  
 uaserit, per conuenientia medicamēta is hu-  
 mor purgandus erit, vt superioribus Capitib.  
 monstratum est. Vniuerso corpore vacuato,  
 ad capitis ac localia præsidia progrediendū Localia.  
 erit, ac vel per digitos manus, vel linteam, di-  
 midia frontis pars. & ea maximè quæ circa tē-  
 porum musculos est, confricando calefaciē-  
 da; atq; in ante accessionis irritationis ve tē-



pus faciendū est. Post exacerbationem verò  
 medicamentis hemicranicis à veteribus me-  
 dicis appellatis vtendum: siquidem multa ca-  
 liditas in doloribus percipiatur, his quæ ali-  
 quid habet refrigeratorium: citra verò hæc,  
 his quæ multum calefaciunt. Vtrisque verò  
 aliquid ex iis, quæ robur addunt, misceatur,  
 quod adstrictoriam videlicet habeat faculta-  
 tem. Optimum autem in frigido affectu vn-  
 guētum erit, quod R<sup>x</sup> olei anethini, olei iri-  
 ni, añ s. piperis albi, serpilli, añ ð i s. castorii  
 ð i. euphorbii ð s. ceræ quod satis est, fiat vn-  
 guentum, quod dimidiæ frontis parti, & mu-  
 sculo temporis illinatur. Nec parum confert  
 oleum cui exiguum euphorbii cōmixtum sit,  
 tepidum in aurem infusum, vt R<sup>x</sup> olei com-  
 munis & i. euphorbii ð i. misce, & gutta vna  
 in aurē instilletur. Quadam etiā naturæ pro-  
 prietate euphorbium aceto dilutum, ac late-  
 ri dextro, dolente sinistro, applicatum, & cō-  
 trā sinistro dolente, dextro illitum, hemicra-  
 nicis maximè cōfert. Idem possunt lumbrici  
 terræ triti, & cochlearum carnes lateri af-  
 fecto illitæ. Sunt qui persicorum nucleos tri-  
 tos, ac illitos parti patiēti, mirificè prodesse  
 tradant. Si verò à calidis humoribus aut va-  
 poribus dimidiæ capitis partis dolor fit, ea  
 auxilia quæ suprā de capitis dolore ex calo-  
 re & bibiliosis humoribus orto, memorauimus,  
 conferent.

Vnguen-  
 tum.



## DE VERTIGINE. CAP. XI.

Quod scotoma Græcis est, hoc Latinis σκότωμα.  
 vertigo dicitur. Hinc vehementer errant, qui μα.  
 inter se differre tradunt. Barbari corrupta vo-  
 ce Scotomiā nominant. Est autē, vbi obtene- vertigo.  
 bratiōes hebetudinēsq; oculis obuersantur,  
 & omnia circumagi & rotari videtur. Oritur  
 verò interdū cerebro primogenia passiōe la- Causæ.  
 borante: interdū etiam, quū ori ventriculi cō-  
 sentit. Cerebrum autē patitur, cum crassus ac  
 lentus humor ipsum occupat, à quo vaporo-  
 sus spiritus ab imbecilli calore resolut⁹, in ce-  
 rebri partibus inordinatē mouetur. Ori autē  
 vētriculi cōsentit, quando propter extremē-  
 tā vitiosa in eo aceruata, ad ipsum cerebrum  
 exhalatio vaporosa fertur, spiritum animalē  
 in illo circumagens. Qui hac passione la- Sigda.  
 borant, iis à quacūque leui occasione, præ o-  
 culis tenebrę apparēt, adeò vt interdū cadāt,  
 maxime si aliquādo in circum rotentur. Si-  
 quidē ipsis ab vna rotatiōe euenit id, quod  
 aliis à pluribus accidere solet. Proinde hebe-  
 scūt siue alium quēpiam, siue rotā, aut id ge-  
 nus aliud quippiā, aut ipsos quoq; in aquis  
 vortices circūagi viderint. Visibilis enim spi-  
 ritus rotæ agitatē aliisq; iam dictis occurrēs,  
 eodē motu circumuehitur, atque ita turbulē-  
 tus, inæqualis, inordinat⁹q; humoris & spi-  
 ritus mot⁹ redditur. Vbi ex primaria cerebri  
 passione vertigo dependet, tum aurium sq;



nitus, vehemens dolor capitis, grauitasq; præcedunt: item olfactus, atque alterius cuiusq; sensus à capite prodeuntis oblæsis. Patiuntur autem tum potissimum, cum sub sole æstua-uerint, vel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi verò ab ore ventriculi oritur, stomachi morsione, cardiogmon Græci appellât, & nausæa præsentunt. Versetur in aëre puro ac lucido, fugiat crassum ac nebulosum. Cibis vescatur boni succi & concoctu facilib. flatuq; omnino carëtibus: carnibus perdicũ, caponũ, phasianorum, gallinarum, vitulinis: piscibus saxatilibus. euaporantia quæuis deuitet. Bibat vinum aquosum, album tenuissimum, & nõ valde antiquum, aut hydromeli. Exercitio vtatur mediocri. Somnum diurnũ fugiat: nocturno prolixiori vtatur. Caueat sibi ab animi perturbationibus. Non intueatur res in gyrum actas, & rotatas, aut celeriter motas, neq; in præcipitiis ambulet. hæc enim singula passionem exacerbare possunt. Vertiginosos in accessione quidẽ odoramētis, frictio-nibus, & id genus aliis excitare cõuenit. Veneriũ autem attestante robore, si nihil aliud obstiterit, vena humeralis secanda est, siue principiu morbi fuerit, siue etiã processerit. in sanguinis autem missione obseruandum, ne plurimum confertim vacuetur, propterea quod à quacunq; leui occasione æger facile

Victus.

Curatio.

venæ sc.  
ctio.



concidat. Plurib. itaque ablationib. per certa Purga-  
interualla vtentes, congruam mensuram ex-  
plebimus. Quod si verò sanguinis missione  
quidpiam prohibuerit, alius subducatur,  
semper redundanti humori medicamentum  
adaptando. Plurimum verò cōfert, primū  
vacuare per acrem clysterem, non solū pro-  
pter eorum quę in intestinis continentur va-  
cuationem, vt suprā quoque diximus, verum  
etiam ob reuulsionem eorum quę ad caput  
feruntur. cuius sanè compositionem pete ex  
**Cap. de Apoplexia.** Præmissis hisce vniuersi  
corporis euacuationib<sup>9</sup>, capiti localia reme-  
dia adhibenda sunt, nempe cucurbitulæ ad  
occipitiū cū scarificatione. Postea apophleg-  
matismis, gargarismis & sternutamentis vtē-  
dum est. In nares deinde anagallidis succus,  
aut cyclamini infundendus. Nitrū vero cum  
nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per  
nares egregie purgat. Deinceps æger ad bal-  
neum ducendus erit, ac capiti embrocha ex  
medicamentis discutiendi facultate prædi-  
tis composita adhibenda. Quod si vero ca-  
put in balneo supra modū incaluerit, rosa-  
ceo, & aceto sæpe fouendum est, ad refrige-  
randum. Si igitur ob hæc præsidia passio ces-  
sauerit, deinceps à validioribus abstinēdum:  
sin persistit, capitis arterias in temporibus  
circa aures incidere oportet, ventre tamen  
prius aut medicamēto aut clystere purgato.

Localia.



Cauterium,

Qualiter verò incidendæ sint arteriæ, docet Paulus Aegineta lib. 6. Cap. 4. Neque absurdum erit cauterium hoc occipiti post aures adhibere, quod R̄ cantharidum, abiectis capitibus, alis & pedibus, 3 i. fermenti acris 3 s. cum aceto & vino è sublimi ignis commercio distillato subigatur, & admoueat̃ur. Vertigo autem à ventriculi oris consensu, vomitu curari potest, qui hoc medicamento mouendus erit. R̄ Anethi m i. sc. raphani, sc. raparum añ 3 ii. radicis raphani § s. ebulliat in aqua sufficiens, donec tertia pars absumatur. Coletur, & § iii. colaturæ addantur oxymelitis scyllitici § i s. misce, dentur à comestione. Proderunt etiam pipulæ stomachicæ, & similes. Dentur à cibo ea quæ ventriculi os constringunt, atque adeò ne vapores sursum ad caput ferantur, prohibet: vt sunt diacotoniõ simplex, cotonia ipsa, pyra adstringentia, & eiusmodi, de quibus omni bº suo loco plura.

DE PHRENITIDE. CAP. XII.

Phrenitis.

prima eius species.

Phrenitis est cerebri, aut membranarum eius inflammatio, Galeno lib. 2. de Symp. causis authore. Sunt autem phrenitidis plurimæ differentiæ, tres tamen præcipuæ. Aut enim imaginatrix sola facultas læsa est, seruata illæsa ratione. id quod Theophilo medico cuius Galen. lib. de Sympto. diff. meminir, euenisse constat: qui quum alioqui prudenter se gereret, atque eos qui præsentēs erant, ex-



actē nosceret, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubiculi, in quo decūbebat, cōsq; tibia canere, atque pulsare, & se illos videre putabat: alios quidem stantes, alios autē illic sedentes, atq; ita cōtinenter canentes, vt neque noctu, neque interdū quicquam remitterent. proinde assiduē clamans, iussit eos à cubiculo expelli. Is verò vbi cōuauit, quicquid singuli eorū qui ipsum visitabant, vel dixissent vel egissent, narrabat. Hoc etiam pacto Galenus ipse laborauit, vbi per æstatē ardente febris correptus erat, vt licet videre lib. 4. de patiētibus loc. cap. 1. Imaginatio autē læditur priore cerebri parte patiēte. Aut ratio tātum patitur, salua imaginatione. *Secunda species.* Sic patiebatur phreniticus ille, cuius mētiōnem facit Galenus loco iam citato, & lib. 4. de Patientibus loc. Cap. 1. qui quum Romæ domi cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili venit ad fenestram, per quā & ipse videri, & prætereūtes videre potuit. Itaque ex vitreis vasis singula ostēdens interrogauit, iuberētne vt ea proiiceret? Illi verò ridentes plaudētēsq; vt ea proiiceret, rogabāt. Tum ipse deinceps omnia arripens, ciecit. at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea iuberēt ne puerū quoq; proiici, quū interrogasset, atque illi iussissent, ilico ipsum deiecit. Hic sanē singula vasa suis nomenclaturis probē nominauit. vnde itelligi potest,



- neque imaginationē fuisse læsam, neque nominum memoriam deletam. Media verò cerebri, parte patiēte, ratiocinādi vis evertitur. Aut imaginatio simul & ratio ledūtur. Causa morbi est, vel sanguis exuperans, vel biliosus humor cerebrum occupans. Nonnunquā etiam ex bile perusta nascitur, quæ certe gravissimam phrenitidem contrahit. Febris continua & amētia infestant, plurimāque parte somnus difficilis, & vigiliæ comitatur. Interdum quoque somnus turbulentus accedit, ut consurgant ægri, exilient, furibundè vociferentur, verba sine ordine & sensu effundāt, interrogantibusq; nihil certi respōdeant. Oculos habēt cruentos, & sæpe perfricāt: interim aridos, interim lachrymantes. Lingua eorū est aspera, & ex narib<sup>9</sup> sanguis destillat, floccos festucāsque colligunt. Pulsus ad hæc exiguos, languidos, & quadantenus duros habēt. Spiratio magna & rara. Quibus sanguineus humor morbum fecit, ii cum risu insanunt: Quibus flava bilis, ferociter & tā immaniter sæviunt, ut coërceri nequeant: omnium, quæ dicunt faciuntque obliuiscuntur. Decumbat æger in loco tū aëris, tum luminis tēperati, ac variis picturis libero, in quē amici quidem gratissimi ingrediantur, qui tamen non inopportunè interpellent, & nonnunquam blādè ac leniter alloquantur, nonnunquam acerbius increpent. Cibus primum
- Tertia species.
- Causæ.
- Signa.
3. Præ.  
27.
- Victus.



esto ptisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis medulla cum aqua mulsa, aut melle rosaceo sæpius lota. Oleribus vescatur, intybo, lactuca & malua elixis, & similibus, quæ refrigerare atque humectare possunt. In inclinatione morbi pisces quoque squamosi, & saxatiles dandi sunt. Mala etiam punica, cerasaque si multus intus cõficiat feruor, offerenda. Potus sit aqua decoctionis cinnamomi, aut hordei, cui admixtus sit syrupus violaceus, rosaceus, aut nymphææ, quem nenupharinum vocant. Hæc autem non confertim, hoc est, copiosè & celeriter ingurgitanda, sed identidem parcius exhibenda: neque enim sitibundi admodum sunt, ut potum vehementer affectet. Atque hinc est quod Hippocrates lib. 1. Prænotionum, & lib. 6. Epid. par. 2. aph. 6. Brachypotas appellat. Vbi verò decoctionis notæ apparent in lotio, & febris non vehemens, sed lenior fuerit, atque vires non satis robuste, vinum tenue & dilutum (quod oligophoron *ὀλιγοφόρον* nominant Græci) dandum. Quod tutius fit in his qui sani hoc bibere consueverunt, & venter natura imbecillum & frigidum sortiti sunt. In quiete denique ægri, quoad eius fieri licet, cõtineantur: si diuites fuerint, à famulis: si pauperes, vinculis. nam inordinata motio vires conuellit. Cæterum ubi morbus se remisit, gestatione corporis uti conuenit. Balneum quoque aquæ dulcis, si

*βραχυπό-  
τα.*

*ὀλιγοφό-  
ρον.  
Vinum.*



corpus squalidum aridumque fuerit, cōfert:  
modo tepida fuerint. Cum enim humectent  
& refrigerēt, non solū siccitatem, verū etiam  
immodicas vigilias mētisque alienationem  
vnā cū febre profligare possunt. Non sunt ta-  
men nisi corpore prius vacuato, vt iam sæpe  
monuimus, adhibenda. Officiūt phreniticis  
supra modum animi perturbationes: proin-  
de nihil quod mœstitiā inferat, aut bilem  
creet, committendum est. Si vires ægri per-  
uenæ se- mittūt, sanguis protinus mitti debet: quoniā  
ctio. non est salubrius aliud, neque præsentiū au-  
xilium. Secunda autem cubiti vena, humera-  
lis dicta, aut si ea delituerit, media: & quan-  
tum tulerint vires, euacuandum. Nō tamen  
vsque ad animi deliquium, vt nonnulli arbi-  
tratur. præstat enim minus demere quā o-  
portet, ob plurimā vehementis motus agita-  
tionem, plurimumque laborē quo ægri affli-  
ctantur. Prospiciendum etiam, ne clām eger  
brachii vinculū soluat. Dein rectam in frōte  
Auerfio. venam etiam incidere licebit. Quod si ætas  
venæ sectioni obstiterit, tum cucurbitulæ cū  
scarificatione occipitio & spinæ admoūdæ  
erunt: quæ etiam hoc nomine conferre solēt,  
quod à capite humorū defluxum in contra-  
Clyster. rium auellunt. In hūc sanè vsum præstat cly-  
steribus vti, hoc modo cōpositis. R. Foliorū  
maluæ, violarū, intybi (quod scariolā vocāt)  
la. Lucæ, añ m. i. hordei decorticati § i. myxo.



rû (sebesten nominant) numero xi. Decoquã-  
 tur in aqua sufficienti ad tertias. R̃ Colaturę  
 lb̃ i. casię fistularis recens extractę § i s. mel-  
 lis rosacei § i. olei violacei § iii. salis 3 i s. mis-  
 sce, fiat clyster. Si volueris vt validius purget,  
 adicienda erit hierę picrę, aut eclegmaris de  
 succo rosaceo § s. Auertendi etiã à capite hu-  
 mores, ligaturis extremitatum, frictionibus  
 pedũ cum sale & aceto, ac similibus. Caput Localia.  
 verò rosaceo vel oxyrhodino, tepidioribus  
 irrigari oportet. Inflammato enim cerebro vel  
 membranis eius, frigiditas tuta non est, sicut  
 neq; vehemēs caliditas. Frigiditas enī mea-  
 tus constringit, neq; finit excrementa è capi-  
 te discuti: at ingens caliditas feruorē conge-  
 minat. In hunc vsum etiam conueniunt succi  
 plantaginis, solani, & alia quorũ suprà facta  
 est mentio. Si passio vehemētior fuerit, caput  
 faciẽmque assiduē oleo in quo capita papa-  
 uerum decocta sunt, fovebis. Odorē quoque  
 naribus obiiiciemus, rosas, violas, flores nym-  
 phææ, caphuram, camphoram hodie nomi-  
 nāt: ac nares ipsas intus, vel frontē, ex iis aut  
 similib. medicamētis illinemus. Nam sopire  
 ac stupefacere principē facultatem oportet,  
 cerebrum scilicet, quod supra modum inca-  
 luit, refrigerando. Si vigiliæ etiam vehemen-  
 ter vrgent, quæ somnum conciliare possunt, Somni-  
 qualia multa quæ suprà dicta sunt, huc transf-  
 ferenda adhibebimus. Conferet autem inter



Vnguentum. cætera hoc vnguentū, quod R<sup>x</sup> vnguenti pō-  
 pileōn 3 ii. olei violacei 3 iii. se. hyoscyami,  
 corticis mandragoræ, añ 3 s. opii gr. ii. croci  
 3 s. aceti parum, cerę albę quod satis est. Em-  
 brocha. brocha etiam hæc tepida capiti adhibenda,  
 quæ R<sup>x</sup> Florum violarum ficcarum, rosarum  
 rubearum, nymphææ, añ m 1 s. hordei excor-  
 ticati 3 i. se. papaueris albi 3 ii. se. lactucę 3 iii.  
 Decoquantur in aqua fontana sufficienti, &  
 Digestio fiat embrocha. Postremum, vbi morbus iam  
 resedit, mitiorq; factus est, id quod tertio die  
 plurimum accidere solet, digerentia quæ re-  
 liquias morbi discutere possunt, medicamen-  
 ta admoēda erūt. In quem vsum priori em-  
 brochę flores chamæmeli, anethi & meliloti  
 admiscere licebit. Sunt qui gallinas aut catu-  
 los per medium fissos capiti apponant. Simi-  
 liter sunt qui calidum pulmonem arietis, vel  
 recēns ex animali exceptum, vel aqua feruē-  
 ti calefactum admoueant. Si autem diuti-  
 num iam malū fuerit, in oleo serpillum de-  
 coquere cōuenit. Galenus lib. 11. & 13. Ther-  
 meth. castoreo vtēdum esse phlegmone iam  
 inclinante docet, quoniam non continuò lo-  
 cis circa cerebrum, sed ossibus interueniēti-  
 bus occurrat. Inest autem ei medicamento  
 & partium tenuitas, quod ipsum iis quorum  
 per dēsa propugnacula transmitti vim opor-  
 tet, est accommodum.



## DE LETHARGO. CAP. XIII.

Lethargos passio phrenitidi cōtraria est. *λήθαργος*  
 est enī marcor, & inexpugnabilis penē dor-  
 miēdi necessitas. Hoc vitio correptis omniū  
 rerum obliuio accidit, vt verbis nulla suppe-  
 ditetur materia: hinc etiam nomen natūm *λήθη.*  
 est. Lethe enim Græcis obliuio est, Arge autē *ἀργκ.*  
 captura, vel Arge iners: vt Lethargos non sit *ἀργή.*  
 aliud, nisi iners obliuio, vel morbus obli-  
 uionē inducens. Causa eius est pituita, quæ *Causæ.*  
 frigore nimio & humiditate cerebrū imbuit.  
 Lethargicos comitatur febris lenta. putrescit *Signa.*  
 enim humor pituitosus in hoc morbo, Gale-  
 no lib. 13. The. meth. teste, cum profunda in-  
 somnum delatione. Pulsus his magni rariq;  
 sunt, & vndosi. spiratio nimis rara, & imbecil-  
 lis. Somnolēti perpetuò sunt, desidiofi, igna-  
 ui. Vix & tardē quocunque modo interpel-  
 lentur, respondent. Oculos quandoq; ad vo-  
 ciferationem aperiunt, & denuo claudūt, ad  
 soporēmq; reuertūt. Omnium veluti amē-  
 tes obliuiscuntur. Oscitant crebro, & hiante  
 ore aliquandiu persistunt, tāquam claudere  
 id obliu. Ad meiendum vocati, porrectā ma-  
 tulam manu tenentes, meiere obliuiscuntur.  
 Deiciunt per aluū magna ex parte liqui-  
 diora. Nonnullis contrā venter indurescit.  
 Vrinam reddūt iumentis similem. Quidam  
 ex eis tremiscunt, & sudoribus vndiquaque  
 madent. Cubile, in quo decumbit æger, *Viētus.*



- Victus.** splēdidum, lucidum & tepidum sit. Gibi sint attenuantes, incidentes, exiccantes, qui con-  
diantur apio, aniso, cymino, pipere & simi-  
libus. Ex auibus, montanæ auiculæ, pullus  
domesticus, perdix: olerib. porri, asparagi,  
petroselinum. Cremor auenæ, vel alica eius  
cum oxymelite, vel salibus, vel pulegio, con-  
ueniunt. Potus sit hydromeli, aut vinū aquo-  
sum, tenue & albū. Si vires permittunt, & ni-  
hil aliorum obstiterit, Galeno lib. 13. Ther-  
meth. autore, sanguinē statim ab initio mit-  
tere expedit. Sin minus, clysteribus acribus  
alius eluenda, de quibus in cap. de apople-  
**Localia.** xia dicemus. Dein oxyrhodinum capiti ad-  
mouendū. Nam repellendū à capite humor  
est, quisquis is fuerit, eodem Galeno teste. In  
quem vsum etiam frictiones cū pyrethro, pi-  
pere, sale, & aceto, ligaturęq; extremitatū cō-  
**Excitato** ferunt. Odoramēta quoque excitatoria ad-  
**ria.** mouenda, veluti castoreum, funiculus extrin-  
sæ lucernæ, pix humida, bitumē, chalbanū,  
sulphur, sagapenum (serapinum vocant bar-  
bari) cornu ceruinum, abrotonum, & peuce-  
danum. Extrema crurāque pungere, nonnū-  
quam pilos etiam in ipsis vehementius euel-  
lere oportet, quò excitētur. Licebit etiam in  
aceto thymum, pulegium, & origanū, aliā-  
que id genus incoquere, ac narib. ægri ad-  
mouere, quò vapor ad cerebrū delatus, cras-  
situdinem humoris dissecet. Palatum etiam



valentibus & acribus medicamentis, verbi gratiâ sinapi cum melle, antidoto Mithridati, theriaca, & puluere & pyrethri inungendū. Conariq; oportet, pituitam indidem affixā digitis eiicere. Ab his vero etiam sternutamētis vtetur: & si admittantur, apoplegmatis-morum vſus erit. At si iis affectus non discutitur, caput radēdum, deinde fouendum est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis. Ad hæc sinapismo vti in capite prodest, ex caricis & sinapi ex aceto contritis confecto. Postea cucurbitulas occipiti affigere cū plurimo igne oportet, circa primam & secundam vertebraſ. Caſtorio etiam caput illinendum. Quinetiam, vt Alexander Trallianus lib. i. cap. 20. docet idipſum potui dare cum oxymelite expedit. Nam vno hoc medicamento nonnulli miſerrime toto corpore impediti, ſanitati reſtituti ſunt. Præterea ad naturæ excretionē frequenter ſollicitare oportebit, tum clyſteribus, tum iis quæ vrinā mouent: pubem oleo rutaceo, cui ſit adiectum paululum caſtorei, aſpergere. Caterum vbi morbus inclinare inceperit, geſtatio ſtatim continua vtilis eſt, & balneum, quod ſupra modum conferre ſolet. Siquidem Alexander Trallianus ſe cognouiſſe quempiam ſcribit, qui lethargo grauiffimo laborauerit, ad eò vt ſe leuari non ſentiret. Is poſt duodeuiginti morbi dies balneum ingreſſus, tantum ſenſit

Historia.



auxilii, ut à somno statim expergisceretur, aliosq; attente intelligeret, & ipse verba expedite faceret, familiares oēs agnoscens. Quod si verò æstū balnei, ob vires imbecillas ferre haud possit, saltē domi in folio aquæ calidæ lauāndus erit. Cauendū tamen, ne aqua caput egrotātis perfundatur. Smegmate autē mordaciore in balneo detergēd<sup>o</sup>, ut vini fece vsta sinapi, pyrethro, pipere, lauri baccis, calce viua, & similibus: quib<sup>o</sup> duplū nitri addendū.

**Kāgor.**

DE CARO.

CAP. XIIII.

**Subet.**  
**Differen**  
**tia cari**  
**ab apo**  
**plexia.**

**Alethar**  
**go.**

**Causa.**

**Signa.**

**Victus &**

Caros est passio, quam sensuum vniuersarūmq; motionum priuatio, spirandi facultate manente illæsa, consequitur. Arabes Subet appellant. Differt ab apoplexia, quod in hac spiratio vehementer opprimatur, sic ut quis vel magno conatu vix spirare possit: In illo autem spirandi facultas, Galeno lib. 4. de patientib. loc. cap. 2. teste, haudquaquam lædatur. Distat etiam à lethargo, quod lethargici interrogati respondent, neq; omnino muti decumbunt. Caro verò laborantes, somni profunditate occupantur, ut si stimulentur, sentiāt quidem, nihil tamen dicāt, neq; oculos aperiant. Huius passionis frigidus ac crassus, aut omnino viscidus humor, causa est. Signa ex iis quæ dicta sunt, innotescēt. profunditate namq; somni occupantur, oculique in hac passione perpetuò conueniunt. Horum victus & curatio cū lethargicis cō-



uenit, ad maiorem tantum incisionem attenuatio-  
nuationemque declinamus. Stomacho etiam  
quæ calefaciant & corroborent, medicamen-  
ta adhibenda, de quibus suo dicemus loco.

## DE CATOCHA ET CATA-

## LEPSI. CAP. XV.

Catocha & catalepsis Græcis, detentio  
& deprehensio Latinis dici potest. Recentio-  
res medici congelationem nominant. Est au-  
tem detentio subita & occupatio tū mentis,  
tum corporis, sensu ac motu priuati, ægro in  
ea corporis figura permanente, in qua fuerit  
correptus, siue sederit aut iacuerit, siue clau-  
sis siue apertis oculis fuerit. Fit haud secus  
atque priora mala, à frigido pituitosoq; hu-  
more, cerebri posteriora potissimū molestā-  
te. Inuadit hoc mali hominem subito: vo-  
ce præterea sensuque priuatur, nihil audit,  
nihil respondet, respiratio nulla apparet, sed  
quasi mortuus decumbit. Pulsus est paruus,  
languidus, ac vehementer densus. Aluus &  
vrina detinentur, nō quidem siccitatis ratio-  
ne (plurimo enim humido eger abundet) sed  
propter insensibilitatem. Differt à caro, quia  
ut in hoc palpebræ perpetuò clauduntur, sic  
in illa interdum apertæ manent. Viæ  
ratio eadem est quæ lethargi. ægros enim  
similiter nutrire confert, interim diebus sin-  
gulis, interim vno interposito. Passio sanè  
hæc periculosa est, si aut cibo aut potu erre-

Κατοχή.  
κατὰ-  
ληψις.  
Conge-  
latio.

Causa.

Signa.

Catoche  
discrimē  
à caro.  
Viæ.



**Curatio.** tur. Huic etiam malo, præsertim si facies rubescit, & vires validæ fuerint, sanguinis missione securritur. Secunda autem in cubito vena exterior superiorve. Clysteribus etiã venter soluendus erit, aliãque omnia quæ de lethargi curatione suprâ diximus, adhibenda.

## DE APOPLEXIA. CAP. XVI.

**Apoplexia quid.**

Apoplexia est, ubi patiente cõmuni nervorum principio, omnes corporis particulae motum simul & sensum amiserunt. Vel est priuatio sensus & motus in vniuerso corpore, cum functionum à volutatis imperio prodeuntium læsione subito superueniens. Fit à

**Causa.**

fridigo, crasso, lentoque humore, ventriculos cerebri principalissimos vna vice & cumulatim replere, quæ nimia cruditates ebriitatesq; frequentes potissimum procreant. Fit etiam ob causam aut ictum, cerebrum concutientes, atq; vt illuc confluant humores efficientes. Aëris etiam frigidi occursum, qui cerebri humiditates & supernacua coarctat, & constringendo exprimit. Qui in hanc passionem incidunt, sensu omnino carentes, mortui viuunt. Quapropter clausis oculis instar dormientium decumbunt, atq; stertunt. Interrogati, nihil respondet. Si stimulenter, nihil sentiunt. Discernitur verò passionis magnitudo ex noxæ, quam spirationi infert, vehementia. ubi enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: ubi autem paulu

**Signa.**

**Apoplexia magnitudo.**

hil sentiunt. Discernitur verò passionis magnitudo ex noxæ, quam spirationi infert, vehementia. ubi enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: ubi autem paulu



impedimenti est, paruum in cerebro noxam  
 esse conicere oportet. Omnium vero pessi-  
 ma spiratio putanda est, quæ & intermittitur  
 & magna cum violentia trahitur. Passio hæc  
 nequaquam, aut raro curatur. Neque enim  
 temere ab Hippocrate dictum est, Apoplexiâ  
 fortem soluere, impossibile: debile vero, non  
 facile. Qui eius discrimen effugerint, in diu-  
 turnam subinde passionem incidere solent,  
 aut quibusdam membris, aut vniuerso corpo-  
 re resoluti, sæpe etiam ratione violata. Qui  
 igitur quoquo modo curationem recipiunt,  
 iis statim sanguis ex utrisque humerariis, mo-  
 do plenitudo adsit, & virium robur, detrahē-  
 dus est. Alius denique clysteribus acerbis du-  
 cendus, qualis est qui R<sup>x</sup> saluæ, origani, be-  
 tonicæ, rutæ, añ m i. calamenti, hyssopi, pu-  
 legii, añ m s. sc. fœniculi, fœfeli (filer monta-  
 num nominant) ammi, añ 3 iii, centaurii mi-  
 noris m i. polypodii 3 vi. agarici 3 iii. medul-  
 læ colocynthidos 3 ii. Decoquantur in aqua  
 sufficiens, vsq; ad medietatis consumptionē.  
 R<sup>x</sup> Colaturæ § xiii. hieræ picræ, benedictæ  
 laxatiuæ, añ § s. eclegmatis Indi 3 iii. mellis  
 rosacei § i. oleorum rutacei, costini, de casto-  
 reo añ § i. salis gemmæ 3 i s. misce, fiat cly-  
 ster. Comendatur etiam vsus glandium (sup-  
 positoria nominant barbari) ex colocynthi-  
 de, agarico, elleboro, & similibus confecta-  
 tum. vt, R<sup>x</sup> pulueris colocynthidos, agarici, el-

Curatio.

2. Aph.

42.

Clyster.

Glandes.



- lebori, añ 3 ii. salis gemmæ 3 i. mellis cocti  
 3 ii. fiant glandes longitudinis sex digitorū,  
 appenso filo vt ad arbitrium extrahi possint.  
 Post hæc totum corpus oleo copioso calido  
 inungendum. Extremis etiam corporis par-  
 tibus ligaturæ, & frictiones vehementes, cū  
 decocto radicis iridis adhibendæ. Cucurbi-  
 tulæ etiam humeris affigendæ. Caput deniq;  
 prius rasum, irrigandum oleo anethino, ru-  
 taceo, aut eo in quo prius serpillum, aut cala-  
 mintha decocta sit. Naribus admouenda ea  
 quæ odore suo excitant, vti est opopanax, ca-  
 storeum, sagapenum, galbanumq;. Sternuta-  
 mentorum etiam ratio habenda erit, quæ ex  
 struthii (cōdisi appellant) ellebori albi, & ca-  
 storei puluere naribus indito constent. Em-  
 brocharū etiam vsus conueniet, quæ ex cha-  
 mæmeli, meliloti, saluiæ, pulegii, maioranæ,  
 organi, calaminthæ & saturiæ decocto cō-  
 ficietur. Sinapismis quoq; vtendū (emplastra  
 hodie rubrificantia vocāt) in hunc vel simile  
 modum confectis. R. olei costini 3 i. oleorū  
 castorei, euphorbii añ 3 iii. sinapi 3 ii. casto-  
 rei 3 i. sagapeni, euphorbii añ 3 s. aceti 3 i. ce-  
 ræ q. s. ad incrassandum: fiat emplastrum. Sar-  
 tago præterea, vt docet Razes, calefacienda,  
 & capiti calida admouenda. Oportet autem  
 & ori per vim aperto digitum vel pennam  
 oleo irino madefactam inferre, vt ea quæ in-  
 sunt eiiciantur. Ceterum sedes etiam iis quæ
- Reuul-**  
**sio.**
- Odora -**  
**menta.**
- Sternuta**  
**menta.**
- Embro -**  
**chæ.**
- Empla-**  
**strum ru**  
**brificās .**
- Vomit<sup>9</sup> .**



flatus educunt, ruta, cumino, nitro, & melle  
illinenda. Vbi passio se remiserit, cibus mol- **Victus.**  
lis, distribui facilis, & succulentus assumetur.  
Si vox nondum redit, & vires permittunt, cu-  
curbitulæ occipiti cum scarificatione affigā-  
tur. Si fieri possit, etiam hypochondriis. AÆ-  
gri deinde gestabuntur curru, lectica, aut le-  
cto pensili. Potus sit hydromeli. Post vigesi-  
mum primum diem, ægroti balneo creden-  
tur. Sed de reliqua curandi ratione in capite  
sequenti plura.

## DE RESOLUTIONE. CAP. XVII.

Paralysis Græcè, Resolutio latine, est, Ga- **παράλυ-  
σις.**  
leno lib. 3. de Patiētib. loc. cap. 10. autore, vbi **Resolu-  
tio.**  
alterum latus, aut dextrum aut sinistrum, sen-  
sum & motum amiserit. Interdum etiam in  
vna duntaxat parte, manu scilicet, crure, lin-  
gua, accidit. Quum verò per resolutionē in-  
terdum sensus duntaxat, interdū motus, nō.  
nunquam ambo simul pereant (cuius rei cau-  
sam reddit Galenus lib. 1. de Symptomatum  
causis, cap. 4.) nervorū resolutio potissimum **Causæ.**  
dicitur, vbi motus deperditus est. Generatur  
quidem à multis crassis & viscidis humori-  
bus, nervos obstruentibus, impredientibúsq;  
ne animalis facultas è principe parte ad mē-  
bra delabatur. Hac ratione refrigeratio ex ni-  
ue, cōpressio nervosorū corporū, resolutionē  
efficere possunt. Ad eius passionis noti **Signa.**  
tiam non opus est multis indiciis. si enim



**Victus.**

motu pars aliqua corporis destituitur; resolu-  
lutione affectam esse nemo non videt. A qua  
verò causa factus sit morbus, partim ex ægri  
relatione, partim etiam ex notis suprà de do-  
lore capitis ex pituitosis humorib. orto com-  
memoratis, deprehendere licebit. Vi&º ratio  
in vniuersum attenuatoria sit, & siccans. Ver-  
setur igitur æger in aëre calido & sicco, pri-  
misque tribus dieb. tenuissimo vtatur victu.  
hoc est omnimodâ in ediam sustineat, aut so-  
lius melicrati exhibitione, aut ptisanæ succo  
paucò contentus sit. Dein cibi boni succi, &  
concoctum faciles, assique exhibedi, autum  
potissimum carnes môtanarum, & perdicû,  
oua sorbilia, amygdalæ, & pinæ. Vtatur  
etiam fœniculo, petroselino, hyssopo, ma-  
iorana, saluia, & saturcia. Viter pisces, fru-  
ctus, & omnia frigida & humida. Potus sit  
modicus sitimq; quàm possunt maximâ su-  
stineant. Bibant autem hydromeli, cui saluia  
aut cinnamomum admixtum sit. Aut vtatur  
potione quæ hodie Hippocras nominatur,  
sic confecta. R. cinnamomi ꝯ ii. zingiberis  
ꝯ s. piperis longi, granorum paradisi, acori  
(galangâ vocât barbari) añ ꝯ i. cardamomi ꝯ i  
s. nucis mysticæ, gariophyllorû, maceris añ  
ꝯ i. Decoquatur in aque fontanę lb. vi. quoad  
quarta pars, hoc est lb. i s. fuerit absumpta.  
Refrigerata colentur & exprimantur, ac sac-  
chari lb. s. dulcescat liquor colatus, & fiat po-

**Hippo-  
cras.**



tio. Vino nō vtatur, donec morb⁹ ex integro  
 deficiat. aut si fieri vix possit, vt tanto tēpore  
 æger vini potione careat, detur quidē, at nō  
 nisi modicū aquosūmq; & in morbi inclina  
 tione. Mot⁹ & exercitiū, si iis vti poterit, sum  
 mē cōferūt. Somnum fugiat diurnū, noctur  
 nus sit mediocris. Gaudeat & animi perturba  
 tiones euitet. Curandi ratio, si iusserit ætas, **Curatio.**  
 habitus corporis, tēpus anni, & similia, à san  
 guinis missione aspicietur, potissimū si ple  
 nitudinis signa affuerint. Oportet tamē abla  
 tionem esse moderatam, ne corpus refrigere  
 tur, sanguisq; à partibus incolumioribus au  
 ferēdus. Quibuldā verò dieb. post sanguinis  
 missione trāfactis, alius primò clysterib. ir- **Clyster.**  
 ritetur huiusmodi aut similibus. R̄ Maluē, al  
 thææ, mercurialis, camomillæ, saluic, betoni  
 cæ M i. stœchadis arabicæ § i. rutæ, calamin  
 thæ, añ M s. se. fœniculi 3 iii. Decoquātur in  
 aqua, quoad tertia pars absumatur. R̄ colatu  
 ræ lb. i. benedictæ laxatiuæ § s. electu. Indi 3  
 iii. mellis rosacei § s. oleorū laurini, irini, ru  
 tacei, añ § i. salis 3 i s. misce, fiat enema. Dein **Prepara-**  
 decocta & syrupos, pituitosos humores ad **tio hu-**  
 expulsionem præparantes, exhibebis, quo- **morum.**  
 rum copia suprā cap. octauo habetur. Præ- **Purgatio**  
 paratis ad educationem humoribus, quæ illos  
 euacuent, propinanda medicamenta erunt:  
 qualia sunt, præter ea quæ cap. iam citato cō  
 memorauimus, pilulæ azaiaret, arabicæ, fœ-



Capitis  
purga-  
tio.

Discutiē-  
tia.

tidæ, quibus nunquam non agaricum admi-  
scendum erit. Non autē semel, sed iterum at-  
que iterum purgandi sunt ægri, diebus qua-  
tuor vel quinque interpositis. Post purgatio-  
nes verò, theriaca & Mithridati antidot<sup>us</sup> vti-  
lissima est. Post totius corporis euacuationē,  
sternutamentis, apophlegmatismis, gargari-  
smis, odoramētis, & aliis cap. octauo produ-  
ctis vtendū. Capiti denique, vnde totius mor-  
bi radix exoritur, calida medicamenta illi-  
nenda erunt: vt sunt castorium, peucedani ra-  
dix, menta, baccæ lauri, irino oleo, cui parū  
aceti adiectū sit, incocta. Quod si itaq; aëris  
ambientis frigiditas non impediat, caput ra-  
datur, totūque vsq; ad frontem inūgatur.  
Cæterū ea etiam quæ discutiunt medicamen-  
ta, iis locis vnde nervi ad patientem partem  
sensum aut motum, vel vtrunq; deferentes o-  
riuntur, admouenda erūt, quemadmodū Ga-  
lenus lib. 3. de Affec. lo. cap. 10. elegātī histo-  
ria de Pausania sophista docet. A leuioribus  
verò semper auspicandū, nēpe ab oleo cha-  
mæmelino, anethino de spica, liliaceo, & iri-  
no, quibus etiam membra ipsa affecta foun-  
da sunt: quæ etiam hoc nomine vt calefiant,  
lintheis, aut pelle vulpina, & similib. operien-  
da erunt. Aut cum decocto saluiæ, maioranæ  
chamæmeli, hyperici, stæchadis & rosmari-  
ni fouenda. Progrediendum deinceps ad va-  
lentiora, oleum costinum, vulpinum, ruta-



ceum, laurinum, de vermibus, de castoreo,  
 de laterib. (quod etiā philosophorum nomi-  
 nāt) & de euphorbio. Quib⁹ interdū adiciū-  
 tur vnguenta Agrippæ, marciatōn, arragōn:  
 & alia medicamenta simplicia calida, vt est  
 betonica, saluia, rosmarini flores, radix aco-  
 ri (galangam nominant) verbasculum odo-  
 ratum (herbam paralyfis vocant) ruta, cala-  
 mintha, pyrethrum, piper, castoreum, & eu-  
 phorbiū, in hunc aut similem modum. R̄ vn Vnguen-  
 guentorū arragōn, marciatōn añ § i. vnguen-  
 ti Agrippæ § s. oleorum costini, vulpini añ 3-  
 v. olei de vermib. § s. olei de castoreo 3 i s.  
 pulueris betonice, piperis, saluie añ 3 i. ca-  
 storei euphorbii añ 3 s. radice galange 3 ii.  
 ceræ quod sufficit. fiat vnguētum. Vel sic. R̄ Aliud.  
 oleorum costini § ii. de piperib⁹ § i s. olei de  
 euphorbio 3 ii. vini sublimati (aquam vitæ  
 aliās vocant) § ii s. succorū saluie, verbasculi  
 odorati, hoc est herbe paralyfis, añ § i s. ra-  
 dicis galagæ 3 iii. stœchadis arabice, florum  
 rosmarini, añ 3 ii. pyrethri, piperis, añ 3 i. eu-  
 phorbii 3 s. Contundantur contundenda, &  
 omnia simul quoad vinum & succi absumā-  
 tur, decoquantur. Dein exprimantur olea, &  
 addatur ceræ quod sufficit, fiat vnguentum  
 molle in modum linimenti. Eadem etiam ra-  
 tione emplastra cōponi possunt, in eū vel si- Empla-  
 milē modum. R̄ Baccarum lauri, pyrethri, strum.  
 piperis añ 3 ii. galagæ 3 i, stœchadis arabi-  
 d ii



**Cucurbi-  
tulæ.** cæ, betonice, sambuci, añ 3 i s. sinapi, nigelle,  
añ 3 i. euphorbii, castorei, añ 3 i. olei costi-  
ni 1 s. olei de piperibus 1. olei de euphor-  
bio 3. iii. cum cera & resina, quod satis est, fiat  
emplastrum. Porro mēbris affectis cucurbi-  
tulæ sunt applicandæ, citra tamen scarifica-  
tionem. Et si cucurbitulis idonea nō fuerint,  
vincinis imponendæ. Post cucurbitulas præ-  
dictis vnguentis & linimētis, sic tamē vt prius  
**Balneū.** fricentur membra affecta, vtendum. Neque  
paruam vtilitatem præstabit laconicum: & si  
haberi possunt, thermæ sulphuræ, alumino-  
sæ, & saluginosæ supra modū cōferent: qua-  
les sunt in Germania nostra Badenix, Fering  
iuxta syluam Martianam, & Cellenses. quas,  
gestatiōes in curru, vehiculo, aut lectica præ-  
cedere debent.

DE MORBO COMITIALI.  
CAP. XVIII.

**ἐπιλη-  
ψία.** Epilepsia Græcis dicta est hæc passio, q̃  
nimirum sensum capitis, atque mentem pa-  
riter apprehendat. Comitialis autem, quod  
hac passione correpti, in comitiis maxime  
manifestabantur, comitiāq; quo die aliquis  
concidisset, interrumpēbatur. Est autem, Ga-  
leno lib. 3. de Patientib. loc. cap. 5. teste, con-  
uulsio omnium corporis partium, non per-  
petua, sed quæ ex tēporum accidit interual-  
lis, cum mentis ac sensuum oblesione. Gigni-  
**Causæ.** tur hæc passio trifariā. Primū, vbi cerc-



brum primogenia passione patitur. id quod fit, ubi crassus viscosusque pituitæ vel atræ bilis humor spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruit, nervorum principio seipsum quatiente, quod excutiat id quod noxium est. A crasso autem humore hanc passionem induci, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Secundò fit per consensum oris ventriculi male affecti, dum scilicet cerebrum excutere nititur, quicquid ad illud à stomacho eleuatur. Sic Galenus lib. 5. Cap. 5. de Patientib. locis, Grammaticum quendam iuuenem fuisse scribit, qui quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur, comitiali passione corripiebatur: idque non alia ratione, quam quod os ventriculi, utpote quod facile sentiebat, pateretur: ac deinde per consensum & totum cerebrum, & corpus uniuersum conuulsione concutiebatur. Tertiò fit, sed rarò, cum à parte aliqua veluti quædam frigida aura sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit. Hoc genus passionis comitalis, Galenus lib. 3. de Patientib. loc. cap. 7. scribit se vidisse in puero, qui tertiumdecimum ætatis annum agebat. Cum enim adolescens etiam dum cum optimis eius tempestatis medicis conuenisset, ad idoneam inueniendam curationem, audiuit tum narrante puero, affectum ipsum à crure initium capere, mox illinc rectè ascendere per

d iii



Signa.

femur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrū perueniret. quod cum primum tāgeret, ipsum haudquam sibi constare. Præcedit hāc passionem corporis animiq; status minime volūtarius, tristitia, eorum quæ perceperūt obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiúsque repletio continua, iracūdia, pallor faciei, & linguæ inordinatus motus. Quum primū inuaserit malum, ægri concidunt, conuellunturque, stertunt, ac vociferantur interdum. Nonnulli tremunt, atque circumaguntur. Sed peculiaris admodum morbi nota est oris spuma. Non desunt etiam, quibus vrina & stercus præter voluntatem excernitur, nonnullis & genitura. Quibus ab ore ventriculi vitiū oritur, palpitatio ipsius præcedit, turbatio & erosio. Ex inedia seu cibo tardius assumpto, excandescunt, & affliguntur. Occupat hoc passionis genus maximè pueros, eosque adhuc paruulos, quod videlicet humidior cerebri tēperamēto præditi sint: quam ob causā Pædicos, hoc est infantilis seu puerilis morbus nominatur. In quibus acutissima est passio, statim iugulat, & crebris accessibus, & symptomatū vehemētia. Plerisque autē longa esse solet. Nā si non pubertate, vel mēstruorū initio, vel puerperio solutus fuerit, sæpe usque ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem fuerit

Puer cur  
passione  
comitia.  
li corri-  
pianu.

καιδι-  
κός.

5. Aph. 7



affectus. Ratio victus utilis est, quæ incidit, **Victus.**  
 & extenuat. Aëris itaque constitutio, in quo  
 æger versetur, sit calida & sicca, potissimū si à  
 pituitoso oriatur humore. Caparis esus miri-  
 ficè prodest. Fugere oportet carnes omnes,  
 præter auium montanarū, legumina, pisces,  
 & vinum, præsertim antiquum crassum & co-  
 piosum. pro quo bibat hydromeli, aut vinū  
 aquosum & dilutū. Exercitia profunt, & fri-  
 ctiones, sed capiti post omnes reliquas cor-  
 poris partes adhibitæ. In balneo mora diu-  
 turna obest. Deuitet coitū liberaliorem, mo-  
 deratus autem prodest. Somnus sit nocturnus  
 & mediocris, caueat impensè diurnū. Fugiat  
 sinapi, allia, cepas, & eiusmodi, potū statim  
 à balneo, potissimum vini meracioris. Si in-  
 fans ægrotus fuerit, non admodum medica-  
 mentorum præfidiis subuenire studebimus.  
 nam ætate ad calidiorem sicciorēque sta-  
 tum vergente, & victu moderatiore, sua spō-  
 te plerūque morbus finitur, Hippocrate qui-  
 dem teste, qui sic scriptum reliquit: Quicun-  
 que iuuenes passione comitiali laborant, mu-  
 tatione maximè ætatis, & temporum, & lo-  
 corum, & victuum quoque liberantur. Proin-  
 de solius nutricis ratio habenda erit, ac lac il-  
 lius emendandum, utq; calidius & subtilius  
 efficiatur conandū. Quapropter nutrix boni  
 succi cibus vtatur, ante cibum exerceatur, coi-  
 tum vitet: à viri siquidem consuetudine lac

Curatio  
 infantium.

2. Aph.  
 45.

d iiii



Curatio  
adulto-  
rum.

odoris gratiam in deterius mutat, & humi-  
dius efficitur, ac menstrua eliciuntur: & præ-  
scripta paulò antè victus ratiõe vtatur. Capi-  
ta tamen infantium assidue oleo anethino &  
irino inungenda, neque vnquam vel calida  
aqua frigida vel lauanda, multo minus tota  
immergenda, madefaciendaque. Dato etiam  
ad elingendum mel despumatum, ac collo su-  
spedito radicem pæoniæ viridem. Qui post  
annos pueriles in passionem hanc prolabun-  
tur, eorum partes cõuulsæ ac distractæ inun-  
gi, irrigari, & in rectum dirigi debent. Dein-  
de os aperiendum, cunctisque dētibus inter-  
ponendus, ac penna oleo irino illita, pituitę  
extrahendæ gratia, vomitus prouocandus.  
Odoramentis etiam sensum excitare conue-  
nit, peucedano videlicet, ruta, & bitumine.  
Perseuerante exacerbatione, medicus auda-  
cter & violenter illorum maxillas distrahat,  
infundatque in os castoreum cū oxymelite.  
Clysterem etiam acrem excitatis iam iniice-  
re oportet. Qui conualescunt, viribus antea  
recreatis, hiera Galeni, aut ex colocynthide  
purgandi sunt. Hęc saucē noui & acuti morbi  
comitialis curatio est. deinceps quomodo  
inueterato succurratur, trademus. Oportet æ-  
gros diu aquā bibere, atq; initio curationis,  
nisi quid prohibeat, sanguinē ex vena popli-  
tis mittere. Interpositis quatuor aut quinque  
diebus corpus reficere, ac medicamēta exte-

Curatio  
comitia-  
lis inuete-  
rati.  
Præpara-  
tio.



nuātia propinare expedit, syrupū de absinthio, de hyssopo, de stœchade, oxymeli scylliticum, decoctum hyssopi, radicis pæonia, & alia quæ suprà Cap. 8. cōmemorauimus. Dein purgantibus medicamentis vacuandi sunt, nempe pilulis cocciis, de agarico, & similib. loco iā citato productis: idq; si pituitoso humore passio orta fuerit, faciendum. Si verò ab atra bile cœperit, ea quæ humorē hunc vacuare possunt, exhibēda, quæ in cap. de Melancholia recēsebuntur. Vbi satis purgatus est ager, ad balneum ducendus. Tercio die hypochondriis & scapulis cucurbitulæ cum scarificatione affigendæ sunt: tū quibusdam diebus corpore reficiendo interpositis, rursus hiera Galeni purgandus erit. Post ea capiti & occipitio cucurbitulæ admouendæ. Sequenti die panis in mulsa coctus, additis amygdalis amaris, aut serpyllo, aut calaminta, aut menta, aut ruta, cataplasmatibus instar capiti applicandus. Atq; id tribus diebus efficias. Mox caput derafis capillis, peucedani succo in aceto diluto, in quo serpillū aut iris incocta sit, perungendum. Rursus interea corpore recreato, purgandus ager erit. Quo peracto, sternutatoria, apophlegmatismos, & ea quæ per nares purgāt, adhibebis. Tempore interposito, si necesse videbitur, Discutiē clystere aluus eluenda erit. Tandē vnguentia medicata, linimenta, & emplastra, quibus discutiē camenta.



di vis inest, applicanda: quorum in præcedē-  
ti cap. mentio facta est. Quædam deniq; sunt  
medicamenta, quæ naturæ quadam proprie-  
tate comitiali morbo aduersantur: vt est ra-  
dix pæoniæ, visc<sup>9</sup> quercinus, cornu ceruinū,  
ossa humana cōbusta, & alia multa, quæ recē-  
sentur à recentioribus. Si verò ob passionem  
primariam stomachi passio comitialis con-  
tingat, sollicitudo habenda est, vt eger probè  
concoquat. Panis igitur diligenter confectus  
ex vino antiquo tenui & albo, cū aliquo co-  
rum quæ leniter adstringūt temperato, circa  
horam tertiam diei assumēdus. Item hieram  
picram bis tēve singulis annis dare expedit,  
vt copiosè cum de stomachi morbis agetur,  
dicemus. Vbi autem ex particula quadā hæc  
passio inuadere percipitur, siue ea manus, si-  
ue pes fuerit, fune excipi debet quæ superpo-  
sita est. Cum remittit, peracta totius corpo-  
ris inanitione, prius inunctionibus excalfa-  
cere corpus oportet: deinde medicamenta  
quæ rarefaciunt, & malam temperaturā par-  
tis, vnde malum oritur, emendāt, apponēda.  
Succedente etiam tempore sinapismis locus  
irritandus erit. Post quæ theriaca, & natura-  
lia balnea locum obtinent.

## DE INCUBO.

## CAP. XIX.

ἑφιάλ.

της.

Incubus.

Ephialtes Græcis passio, quam Latini  
Incubum & incubonem nominant, vbi ali-  
quis noctu se grandi mole opprimi, inua-



diſque ab alio credit. Fit id vitii ex crapula,  
 & continua ventriculi cruditate, vnde vapo-  
 res craſſi & frigidi eleuati, cerebri ventricu-  
 los replent, prohibētes facultates cerebri per  
 nervos diffundi. Comitantur eo detentos  
 difficilis mot<sup>9</sup>, torpidus in ſomno ſenſus, ſuf-  
 focationis imaginatio, & veluti ingruentis  
 alicuius occupatio. Ad hęc vox ſupprimitur,  
 aut incerta indiſcretāq; editur. Quidam ita  
 inanibus imaginibus afficiūtur, vt in ſe graſ-  
 ſatos audire credāt. Cum plurima tandē an-  
 xietate attenuato ſpiritu & diſcuſſo, atq; aper-  
 tis meatibus, repente excitantur. Occurren-  
 dum igitur huic malo per initia. Nā perſeue-  
 rans, & aſſiduē inuadēs, grauius aliquod ma-  
 lum, vt apoplexiā, morbum comitiale, aut  
 maniā prænūciat ac inducit, craſſo humore  
 in ventriculis cerebri ſenſim collecto. Vi-  
 ctus itaq; ſit tenuis, & qui flatuſ minime ge-  
 neret. Vino nō vtatur, niſi aquoſo. Somnum  
 fugiat diurnū, nec ſtatim à comēſtione cubi-  
 tum eat: atque vt ſummatim dicam, totus vi-  
 ctus talis ſit, qualis eſt eorum qui comitali  
 morbo laborant. Curādi ratio, ſi plenitudo  
 fuerit, totius corporis à ſanguinis detractio-  
 ne auſpicāda. Cubiti autē vena exterior ſe-  
 cāda eſt. Sin cacoſchymia affuerit, purgatio-  
 nibus corpus vacuādū. Si tamē pituita redū-  
 det, humores extenuātibus medicamētis ad  
 purgationē preparādi ſunt. Purgato corpore

Signa.

Victus.

Curatio.



**Localia.** localia adhibere medicamenta oportet, vt in  
præcedentibus monstratū est. Succurrit eiſdē  
ſemen proniæ nigrū. Dāda verò ſunt potui  
grana quindecim, trita ex aqua. Caput etiā  
ſouendum anethino oleo calido, & pileo te-  
gendum, dum cubitum eūt. Intra corpus ex-  
hibenda, quæ caput corroborant, aromaticū  
roſaceum, diamoſchi dulcis confectio, pliri-  
ſarcoticon, diambra, dianthos, & cuiusmodi.

DE MELANCHOLIA. CAP. XX.

**Melācho** Melancholia mētis eſt alienatio, ſeu de-  
**lia quid.** ſipientia, ſine febre. Fit interdum quidē vni-  
**Cauſa.** uerſo in venis ſanguinē melācholico effecto,  
ob commune ſanē vitium, cerebro quoq; ip-  
ſo ſimul læſo. Nōnunquam verò, quādo re-  
liqui corporis ſanguinis proſus innocu<sup>9</sup> eſt,  
ſolus autem iſ qui in cerebro contentus eſt,  
alteratur. idque biſariam cōtingit. Aut enim  
aliūde in ipſum deriuatur, aut in ipſomet ge-  
nita eſt, quum videlicet internus calor aut fla-  
uam bilem, aut craſſum atrūmque ſanguinē  
ſuperaſſauit. Interdum etiam ob inflammata  
& malē affecta circa ventriculum hypochon-  
dria prouenit, quæ modò auram quandā ma-  
ligniore, modò ſubſtātiæ humoris partē  
ad cerebrum ſurſum tranſmittunt. Quemad-  
modum enim aliqui frequēter eleuata à ven-  
triculo ſuliginosa quadam aut ſumoſa exha-  
latione, aut omnino craſſo vapore quidpiā  
ſuffuſioni ſimile præ oculis obici ſentiūt: ſic



ascendente ad cerebrum melancholica exhalatione, tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentem accidunt. Atque adeo tres sunt in vniuersum melācholiae species. Vna, quando totum corpus melancholico sanguine abundat: Altera, quādo idem cerebrum ipsum solū occupat: Tertia, quando hypochondria ipsa primò male affecta, in consensum cerebrum ducunt: & hæc melācholiae species hypochondriaca & statiosa dicitur. Cōmunia omniū signa sunt, metus, tristitia, odium, & auersio hominum, iuxta hoc Hippocraticū: Si timor atq; morositia longo tēpore habentes perseverent, ex eo, atra bilis significatur. Item alii se credunt animalia bruta esse, & voces ipsorum imitantur. Sic Galen. lib. 3. cap. 6. de patientibus locis scribit fuisse quendam, qui se gallum esse putauit: ideòque gallos cantare audiens, ut hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatiens, gallorum sonum imitatus est. Alii vasa fictilia & testas se esse arbitrantur, atque idcirco obuiantibus, ne collidantur, cedunt. Hi mortem expetunt, illi eandē expauescūt. Nonnulli semper ridēt, Democritūq; agunt: aliqui Heraclitū, semper plorātes. Alii putāt se numine afflatos esse, & vaticinantur futura. Peculiares autem notæ illorum hæc sunt.

**Signa cōmunia.**  
6, Aph. 23.  
Melācholicorū variæ imagines.

**Signa peculiaria.**  
Qui ex totius corporis consensu melācholia laborant, iis gracilis corporis habitus, ni-



ger, hirsutus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel ex acquisito per solitudines quasdam, aut vigilias, aut prauorum ciborum esus, aut hemorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex hypochondriis vitium contraxerunt, eos sanè cruditates, acidi ructus, ardor, hypochondriorum grauitas arguunt: hypochondria quoque sursum conuelluntur, & nonnunquam inflammatione conflictantur, idque potissimum circa mali exordium. Deinde ubi id ipsum accreuerit, atræ bilis comitatur symptomata, quæ utique concoctione, vel excretionem, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu leuantur. Quum verò nullum ex iis, aut certe pauca circa ventriculum eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum per se & primaria passione vexari, atræque bilis humore affici declarant. Hi autem inter cetera, vnam aliquam rem fixis ac intentis in eam prorsus oculis, diutius intuentur. **Vitus.** Vitus ratio talis sit, quæ atram bilem minime procreet: quapropter in aëre versetur calido & humido. Cibis vescatur boni succi, humidis & temperatis, pane in clibano cocto ac probè confecto, carnibus caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum, piscibus saxatilibus & eiusmodi. Vitet cibos qui melancholicum efficiunt humorem, quos diffusè Galen. lib. 3. de patientibus. loc. cap. 6. commemorat. Vinum bibat tenue, album, neque valde antiquum: crassum verò & nigrum vi-



tet. Exercitium sit mediocre, equitatio aut  
 deambulatio per loca amœna & viridia, aut  
 nauigatio. Balneo aquæ dulcis, quo se vno  
 præsidio cū victu humido, Galenus morbum  
 hūc vbi nondū in longū esset protractus, cu-  
 rasse scribit, frequenter vtatur. Somnus illi su-  
 pra modū confert, veluti etiam coitus, at mo-  
 deratus. Gaudeat & lætetur, in hocque habe-  
 at qui cātu aut aliis musicis instrumentis hi-  
 laritatem excitent. Vbi vniuersum corpus  
 sanguine melancholico abundauerit, curan-  
 di rationem à venæ sectione auspicari oportet.  
 Secunda autem est, Galeno loco iam cita-  
 to teste, cubiti vena: præcipuè autem me-  
 dia, quæ scilicet communis est & ei quæ hu-  
 meraria nominatur, & ei quæ per axillam ad  
 manum fertur, iecoriâque dicitur. Vbi verò  
 solum cerebrum sanguinem melâcholicum  
 continet, eger sanguinis detractione non in-  
 diget, nisi fortè multum sanguinis sit, ac præ-  
 seruationis gratia venam incidamus. Quum  
 itaque ex primaria cerebri passione melan-  
 cholici efficiuntur, frequentibus balneis, vi-  
 ctu boni succi, & humido, & minime fla-  
 tuoso, vnâ cum decenti animi delectatione,  
 sine alio potentiori remedio curandi sunt.  
 cum humor qui molestat, nondum ob tem-  
 poris lōgitudinem vt excernatur contumax  
 est. Si enim malū aliquādiu durauerit, tū va-  
 lētiora magisq; varia medicamēta adhibere

Curatio.



LEONHARTI FUCHSII

Decoctū  
præpa-  
rans.

oportet. Siue igitur ex totius corporis cōfor-  
tio, facta prius, vt diximus, sanguinis detra-  
ctione: siue solius cerebri primario affectu-  
melancholia orta fuerit, medicamenta quæ  
per inferna purgāt, exhibere oportet. Inter-  
positis tamē aliquot à venę sectione diebus,  
hoc decoctum in aurora bibat, quod R<sup>x</sup> Flo-  
rum boraginis, buglossę, violarum M i. passu-  
larum mundatarum § i. hemionitidos (scolo-  
pendriam vocāt) M i. fumiterræ M s. corticū  
radicum capparū, tamaricis, añ. 3 iii. radicū  
fœniculi, petroselini, glycyrhizæ añ 3 i. thy-  
mi, epithymi añ 3 s. Decoquantur singula in  
ib iii. aquæ, donec tertia pars absumatur: de-  
in colentur, atque saccharo sufficienti dulce-  
scat colatura, & adiiciantur syrupi de fumo-  
terræ, syrupi de epithymo añ § ii. & fiat po-  
tio. In eundem vsum hodie exhibent syrupū  
violaceum, de buglossa, adiectis aquis scolopendriæ, lupi salictarii, intybi domestici (en-  
diuiam appellant) & buglossi. Ego tamen a-  
quarū distillatarū & ignis cōmertio expres-  
sarum vsum, vetriculo potissimū, noxium  
esse arbitror. atque adeò multo consultius es-  
se puto, vt prædictarum herbarum decoctis  
vtamur, ac syrupis in hunc modū admiscea-  
mus. R<sup>x</sup> Syrupi de buglossa § i. syrupi de epi-  
thymo § s. decocti scolopendriæ, fumiterræ  
& endiuicę § iii. misce, fiat potio. Post hæc cor-  
pus purgetur eclegmate hæmech appellato,



& diasenæ: catapotis Indis, de lapide arme- Decoctū  
nio, & similibus. Proderit autē hoc decocto purgās.  
purgante vti. R<sup>x</sup> Florū buglossi (boraginē ho-  
die appellant) florum violarum & rosarū añ  
m i. passularū mundatarum, tamarindorū añ  
§ i. myrobalanorū ceruleorum (indos vocāt)  
luteorū (citrinos nominant) empeliticorum,  
beletzicorū añ § s. folliculorū senæ, polypo-  
dii añ 3 vi. prunorū damascenorū numero x.  
Coquātur in aqua sufficienti, ad tertias. dein  
coletur, & saccharo dulcescat colatura, & de  
ea exhibeantur § iiii. In quibus, si non satis  
purget, licebit dissolvere 3 ii. eclegmatis dia-  
senæ Mirificè etiam cōferet dilutum epithy-  
mi, in eum modum compositum. R<sup>x</sup> Epithy- Dilutum  
mi § s. maceretur in § iiii. feri caprini, horis epithy-  
24. dein validè exprimatur & coletur, atque mi.  
in aurora propinetur. Et hoc, quod R<sup>x</sup> Folio Dilutum  
rū senæ § ii. prunorum damascenorum nume foliorum  
ro xii. Contundantur & macerentur in sero senæ.  
caprino horis viginti quatuor: deinde expri- Pulvis.  
mantur & colentur, vt suprā. Licebit & hoc  
pulvere vti, q<sup>d</sup> R<sup>x</sup> epithymi § s. lapidis arme-  
nii, agarici añ 3 ii. scāmonia præparata 3 i.  
gariophyllorum numero xx. Redigātur sin-  
gula in puluerem, & detur singulis septima-  
nis 3 i. vel 3 s. Neq; temerè etiā quis à pur-  
gatione interiectis quibusdam diebus clyste-  
ribus vtetur, vt qui à capite auertere possint.  
R<sup>x</sup> Fumiterræ, lupi salictarii, thymi añ m i. Clyster.



epithymi m s. senæ polypodii añ 3 vi. carta-  
mi § s. seminū anisi, fœniculi, ammi, comini,  
añ 3 ii. Coquatur vsq; ad tertias. R̄ colaturæ  
th 1. Casī fistularis recēns extractæ § i. ecleg-  
matis diasenē § s. oleorū, violacei, camomille  
añ § i s. salis cōmunis 3 i s. misce, fiat clyster.  
Porro si hæmorrhoidibus aut mensibus sup-  
pressis malum fuerit cōcitatum, horū quoq;  
purgationem moliemur, Hippocrate sic præ-  
cipiente. ait enim, Atra bile vexatis, hæmor-  
rhoides superuenientes, bonum. Et rursus,  
6. Aph. Infantiētibz si varices vel hæmorrhoides su-  
11. peruenerint, insanix solutio. Ceterū danda  
6. Aph. Corrobo etiam sunt medicamenta, quæ lætitiā pariūt,  
21. rantia. atque vires reficiunt: vt sunt cōseruæ buglos-  
fi seu boraginis, intybi domestici, violarum,  
Balnea. lætificans Galeni vocatum, dianthos, & simi-  
lia. Nulla denique ratione, vt antea quoque  
Embryo - gligendus. Embrochæ etiam, quæ caput hu-  
cha. mectare possunt, adhibeantur. R̄ Maluæ, al-  
thææ, violarū añ m i s. camomillæ, stœcha-  
dis arabicæ añ m i. florū nymphææ m s. se. la-  
ctucæ 3 i. Bulliāt in aqua sufficiēti, & fiat em-  
brocha, quæ raso capiti admoueatur. In hūc  
etiam vsū convenient inunctiones ex oleo  
violaceo, nymphææ, & similib⁹. Studiose de-  
niq; annitēdum, vt imaginationes peruersæ  
& immēsa mœstitia, quacunque fieri potest  
ratione, propulsentur. In hunc sanē modum



Alexāder Trallianus lib. i. cap. 22. mulierem *Historia.*  
 quandam sanitati restituit: quæ melancholie  
 malo correpta, inter dormiendum anguem se  
 deglutisse putabat. Ciens enim ei vomitum,  
 anguem extinctū pelui, qua vomitionē exci-  
 piebat, clandestinē inseruit: quem simul atq;  
 conspexisset melancholica, euomisse rata, om-  
 nem suspicionē falsam posuit, & salua eua-  
 fit. Præterea si ob hypochondriorum offen- *Hypo-*  
 sionem passio constitit, & horum habenda *chōdria-*  
 sollicitudo erit. Fouebuntur itaque rutæ, ane- *cæ melan-*  
 thi, absinthii, pulegii, agni seminis, baccarū *choliae*  
 lauri, & similiū decocto. Hæc etenim dolo- *Curatio.*  
 res quoque leniunt, & discutiunt flatus, po-  
 tissimum si oleo incocta affectæ parti cata-  
 plasmatis instar applicantur. Præter hæc tamē  
 cataplasmatibus insunt etiam ea, quæ flatibus  
 discutiendis conducunt, nempe apium, ani-  
 sum, cuminum, vel ligusticū, leuisticum vo-  
 cant. Cum hæc admoues, longo tempore per  
 diem & pasto & ieiuno adhærere fines. Vbi  
 ademeris, aliud quoddā operimentū super-  
 accommodato, lanam scilicet latiore. Cucur-  
 bitulis etiam ad flatus digerendos leuibis,  
 hoc est, citra scarificationem vtitur. Videbi-  
 tur enim cibi præsidium hoc, Galeno lib. 12.  
 Ther. meth. autore, in huiusmodi affectu in-  
 cantamenti cuiuspiam simile quid efficere. il-  
 lico enī cucurbita admota, qui spiritu flatuo-  
 so cruciantur, tū à dolore liberi, tū omnino



vomitibus ut concitandus. sani redduntur. Porro ad dolores inflammationesque, cum scarificatione. Quibus vitium inueterauerit, presentissimum est remedium per vomitum purgatio. Non tamen validis vomitoriis utendum: talia enim infesta sunt, stomachoque anxietatem afferunt. Concitetur igitur vomitus cum aqua tepida, cui oxymeli sit admixtum. Quod si tamen neque hoc modo possunt euomere aegri, digitos aut pedinas demittendo irritare oportet. Proderit autem iis vnicuique vomitus, qui per elleborum album fit, in hunc modum. R. Ellebori albi 3 i. concidatur in minutas particulas, & raphano satis magno indatur. transactis tribus diebus iterum eximatur, raphanusque fortiter exprimatur. dein accipe succi ex raphano expressi 3 vi. aquae calidae 3 iiii. oxymelitis 3 i. & totum calidum aegro propinato. Vel in hunc, qui R. ellebori albi optimi 3 iiii. & raphano prius perforato inseratur infiganturve, ac ibi noctem unam integram dimittantur. Postridie ubi in raphanum vires ellebori migrauerint, amoto elleboro raphanus in minutas partes dissectus, in oxymelite exhibeatur, diligenter cauendo, ne ellebori quidpiam in raphano relinquatur.

DE CONVULSIONE. CAP. XXI.

σπασμός Spasmos Graece, conuulsio Latine, est, ubi nervi atque muscoli praeter voluntatem conuulsiuntur, in eamque dispositionem veniunt, quam



etiam in motibus secundum arbitrium factis  
 assumpserunt. Vel breuius, ut definit Galen.  
 lib. 2. de Symp. causis cap. 2. convulsio est, que  
 ueruos musculosque ad eundem cogit affe-  
 ctum, in quem ab animalis facultate, quoniam na-  
 turalem habitum seruarent, ducebatur. Eius  
 autem tres sunt species. Tetanos, quum ceruix *τέτανος*  
 una cum reliquo corpore immobilis manet,  
 & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in  
 utranque partem recta intenditur. Latini vo-  
 cant distensionem, Celsus rigorem. Empro- *ἐμπροσ-*  
 sthotonos, quum caput, ceruix, reliquumque cor- *θότονος.*  
 pus in pectus contrahitur: latinè tensio ad an- *ὀπισθό-*  
 teriora dici potest. opisthotonos, quando ca- *τόνος.*  
 put in scopulas conuellitur: latinis tensio ad *6. Aph.*  
 posteriora appellari potest. Hippocrates con- *39.*  
 uulsionis duas duntaxat esse causas statuit,  
 repletionem nimirum, & inanitionem neruo-  
 rum corporum. Sicuti enim in exterioribus  
 videmus lora & chordas extendi, ubi aut mul-  
 ta madent humiditate, aut vehementius ex-  
 iccantur: sic & in corporibus animalium, par-  
 est non raro fieri conuulsionem. Animaduer-  
 tendum autem, hic Hippocratem loqui de con-  
 uulsione ea quæ primò fit, aut, ut apertius di-  
 cam, quæ propria passio est. Fit enim conuul- *Connul-*  
 sio etiam per consensum, quum scilicet ali- *sio per*  
 quid à parte primò patiente ad cerebrum ipsum consen-  
 effertur, quod ut à se expellat, huiusmodi sin-  
 motu concutitur. Iuniores medici barbaram se-



**Spasmus** Stantes medicinam, spasmū non proportio-  
 non pro- natum ad materiā nominant: quia scilicet nō  
 portio- accidat ob materiā, quæ implere aut inani-  
 natus ad re partes neruosas possit: sed à qualitate qua-  
 materiā. dam, alteratis per continuationem partibus:  
 aut substātia, vel spiritali veluti aura vel flui-  
 da ad neruorum principium delata, sicut cō-  
**Signa.** tingit in iis qui à scorpione aut alia fera ve-  
 nenata icti sunt. Quando aliquem sanū re-  
 pentē Galeno. 2. Aph. cōm. 26. teste, aut non  
 multō postea à morbi initio conuulsio corri-  
 pit, à repletiōe fieri necesse est. Vbi verò post  
 plurimos sudores, aut vomitū, aut deiectiones  
 alui, aut sanguinis eruptiōes, aut vigilias, aut  
 famem, aut motus tum multos tū vehemen-  
 tes subsequitur, inanitio in causa est. Conuul-  
 sio per consensum facile ex ægri relatione di-  
 gnoscitur. **Victus.** Victus ratio in conuulsione quæ  
 fit à repletionē, eadem est huic quæ in resolu-  
 tione, calida nempe & sicca. In ea verò quæ  
 ab inanitione fit, humida sit oportet. Nutriē-  
 di enim sunt sorbitionibus & iuribus pingui-  
 bus, & carnibus concoctu facilibus & probè  
 nutrientibus. Vino vtatur tenui & inaquoso,  
 quod facile per omnia corporis mēbra distri-  
 buit: nisi febris affuerit. tunc enim ptisanæ  
 cremor utilis erit. Somn<sup>9</sup> etiam accersendus  
 erit. & victus in vniversum talis sit, qualis est  
**Curatio** eorum qui hectica laborant febre. **Curatio**  
**conuul-** conuulsionis à repletionē ortæ, à sanguinis



sione auspicāda, modò nihil adfit quod ean- sionis a  
dem fieri probibeat. Liberaliter autem san- repletio-  
guinem auferre conuenit, modò non confer- ne.  
tim id fiat, sed pluribus vicibus. Detrahendus  
autē sanguis ex cubiti vena media. Dein cly-  
stere acri, si ita visum fuerit, alius eluenda.  
Partes autem quæ conuelluntur, valenter cō-  
tinendæ sunt, & inordinatis moribus resistē-  
dum. oleo quoque rutaceo aut irino, aut alio  
quodam ex hoc genere perfricandæ: aut la-  
nis oleis eiusmodi imbutis contegendæ. Vel  
vesicam latā calido oleo repletam, superim-  
ponere oportet. Si verò à pituitosis humori-  
bus conuulsio euenerit, ii primum omnium  
extenuandi & incidendi, utque idonei sint  
ad expulsionem, præparandi: præparati, me-  
dicamentis in capitibus de Resolutione &  
morbo comitali dictis euacuandi. Cucur-  
bitulas etiam cum scarificatione admouere  
prodest: leues enim lædunt. si quidem cru-  
ra contrahantur, coxis, & postremæ verte-  
bræ: si manus conuellantur, dorso, & pri-  
mæ ipsius vertebræ, tum ei quæ humeros su-  
periacet. Caput præterea apophlegmatismis,  
gargarismis, & similibus medicamentis pur-  
gandum. Procedente tempore balneo uti cō- Balneū.  
fert. Singulis itaq; dieb<sup>9</sup> bis aut ter in aquas  
sulphureas, vel aluminosas, vel salsas descen-  
dat: non tamen diutius, ne vires cōuellāt, im-



5. Aph.  
21.

Conuul-  
siois ex  
inanitio-  
ne & sic-  
citate cu-  
ratio.

Curatio  
conuul-  
sionis à  
cō sensu.

moretur. Aut si therimarum nullus vsus esse poterit, laconico vti licebit, aut aqua cui incocta sint folia lauri, abrotanum, pulegium, absinthium, ruta, salvia, hypericon, maiorana, & betonica. Conuulsæ quoque partes pel libus luporum & vulpium vestiuntur. Inunctiones denique, quæ in cap. de Resolutione dictæ sunt, adhibere conuenit. Frigidæ superfusione, cuius Hippocrates meminit, cum sit periculosa, non facile vti licebit, nisi singula quæ ab illo requiruntur, adsint. Cæterum calida medicamenta, vt est theriaca, antidotus Mithridati, deglutienda erunt. Omnium tamen securissimum & optimum est castoreû dilutum, ad cochlearis parui mensuram, hoc est, drachmam vnā. Conuulsio, quæ ex inanitione & siccitate fit, maximum sanè malum est, & propemodum insanabile. Eos autem qui sic conuelluntur, oleo vel hydrelæo calido fouere oportet. Ad lauacrum etiam deducere oportet, temperatōque solio vti, cū oleo & frictione lenissima. Et in vniuersum ferè curentur, vt hæctica correpti. Curatio conuulsionis ab ictu feræ venenatæ, eadem est cum ea quæ adhibetur iis qui à cane rabido morfi sunt. Annitendum enim vt venenū extrahatur, vulnus latius efficiendo, locūque totum in circuitu scarificando, superimpositis cucurbitulis. Confert & marubii & anagallidis folia illinere. Theriaca etiam cū



rosaceo diluta, & vlceri apposita, eò q̄ vene-  
num à profundo attrahat atque euacuet. hæc  
enim alexiteriorum, teste Galeno libro. 5. de  
simpl. med. facul. cap. 17. actio est. vt hinc to-  
to cælo errare Gentilem, & qui hunc sequun-  
tur, constet, quum theriacam admotam ve-  
nenum magis intrò & in profundum pelle-  
re garriunt.

## DE TREMOR. CAP. XXII.

Tromos Græcis, tremor latinis dicitur: & *τρόμος.*  
est passio, quæ duob<sup>9</sup> perficitur motib<sup>9</sup>. vno,  
dum cogitur membrum ob morbum atque  
grauitatem, ad inferiora repere: altero, dum  
furfum à facultate fertur. Eius origo commu- *Causa.*  
niter ex neruorū imbecillitate est. Priuatim  
verò, frigidius naturæ temperamentū, frigi-  
dæ potio, & præsertim in febrib. intempesti-  
uè assumpta: frigidi, crassi, & lenti succi, vini  
multi meracioris vsus, senectus, timor. Signa *Signa.*  
quibus causæ dignoscuntur, nulla sunt neces-  
saria, quòd partim ex ægro, partim etiam ex  
iis quæ suprà dicta sunt, deprehendi queant.  
Vicus ratio sic instituat, vt causis planè cō-  
traria sit. Cibus verò diductu facilis offera- *Vicus.*  
tur, & boni succi: primū sorbilis, mox vo-  
latilium & piscium molli carne præditorū.  
Si autem crassorum viscosorumq; succorum  
copia fuerit, vti cōuenit iis quæ incidunt ex-  
tenuantque. Vitent in vniuersum omnia quæ  
neruos offendere possunt, vini potionem, po-



tissimū meracioris. Bibant dilutum & aquo-  
 Curatio. sum, aut hydromeli. Qui ex erroribus com-  
 missis manifestè tremunt, à noxiis deinceps  
 abstineant. Qui igitur ex vini potu tremunt,  
 iis vinum circuncidendum est, quoad in to-  
 tum morbo fuerint liberati. Bibāt interea hy-  
 dromeli, cū decocto saluiae aut betonicae. Si  
 à frigidis & crassis humorib⁹ tremor accidit,  
 curandi ratio eadem erit adhibenda quæ re-  
 solutioni & conuulsioni à repletionē factæ,  
 sanguinis dūtaxat missione excepta. Extre-  
 mæ autē corporis partes oleis calefacientib⁹  
 præunctæ, lanis mollibus contegantur. Dein  
 cucurbitulæ citra scarificationē à priori ver-  
 tebra vsque ad spinam lumbosque affigan-  
 tur, vt scilicet crassi & lēti humores vertebra-  
 rum foramina obstruentes, ad cutis superfi-  
 ciem trahantur, atque adeò subinde facilius  
 discutiantur. Proderit etiā, vt eger quotidie  
 piperis grana quinque ex mulsi cyatho, hoc  
 est ℥ i s.umat. Simplicia quoque hæc præ-  
 sumpta trementes adiuuant, castoreum, lepo-  
 ris cerebrum comestum, althææ radicis deco-  
 ctum, & eupatorii. Quid multa? medicamen-  
 tis, vñctionibus præsertim, ad resolutionem  
 conscriptis vtendum est.

Destilla- DE DESTILLATIONE. CAP. XXIII.  
 tio quid. Destillationem hoc loco communiter ac-  
 cipere oportet, vt sub se cōplectatur omnes  
 ex capite in subiectas partes defluxus. Hui⁹



autem tria sunt genera: quorum primum est  
 catarrhoos, qui destillatio propriè Latinis *κατάρρ-  
 dicunt. Fit, Galeno lib. 3. de Symp. caus. teste, ροος.*  
 vbi ad os ac fauces humor delabitur. Alterū  
 coryza Græcis, Latinis grauedo appellatur: *κόρυφα.*  
 fit, dū ad nares decūbit humor. Tertiū Bran- *βράγ-*  
 chos, Latinis raucedo vocatur: accidit, vbi *χος.*  
 ad asperā arteriā humor destillat. Ob varias *Causæ.*  
 causas accidere solet. Vel enī calor ambiētis  
 qui in cerebro sunt humores dissoluens, vel  
 eiusdem frigiditas eosdem cōstringens, vt iis  
 potissimum qui aperto capite balneum egre-  
 diuntur, accidere solet, destillationem conci-  
 liat. Frigida etiam cerebri intemperies, quæ  
 cur eius alimentum nō probè concoquatur,  
 & calida, quæ aliunde vt trahantur ad ipsū  
 humores efficiunt, destillationem procreare  
 possunt. Causæ extrinsecæ facilè de ægroto-  
 rum sermonibus agnosci possunt. Qui ex ca- *Signa.*  
 lore destillatione corripuntur, his particule  
 incalescunt, acris tenuisque humor destillat  
 tum per nares, tum per os, facies rubescit &  
 nasus. Hos etiā vt plurimū febris comitatur.  
 Qui ex frigore, iis caput vndique & frons di-  
 stenditur. meatusque (quos ethmoides nomi-  
 nāt) claudūtur, ita vt ne vox deorsum per na-  
 res trāsmeare queat. Pituita & crassius humor  
 ē naribus stillat. Fugiant aërem impensè ca- *Vitius.*  
 lidum & frigidum, præsertim à balneo, ven-  
 tos austrinos & aquilonios, laconicum, &



omnia quæ dissoluere humores in cerebro possunt. Utantur cibis concoctu facilibus & boni succi. deuitēt eos qui vaporum copiam ad cerebrum trāsmittunt, cepas, allia, si napi, raphanum, & odora menta suprà modum calida. In cœna ii minus quàm in pradio comedant. Potus sit hydromeli, aut decoctū hordei vel cinnamomi. Fugiendus somnus diurnus, & supinus. Vbi calida intēperies passionem effecit, iis pugnādum præsidiis, quæ dolori capitis ex tali causa cōtracto cōueniunt. Præsentiſſimum autem remediū est, capitis irroratio, maximè in æstate. Quod si frigida intēperies afficiat, caput calefaciētibus subtilibusque oleis, irino, rutaceoque perungendum. Irinū verò nō solūm illinitur, sed etiam naribus instillatur, aliaq; quæ suprà de capitis dolore ex frigore orto dicta sunt, adhibentur. Si autem calidus humor à capite destilla uerit, simulque febris inuaserit, ac totius corporis plenitudo fuerit, sanguis è venà exteriore cubiti mittendus erit. Sin sanguinis missione vti non licuerit, clystere aluus eluēda, atque à capite exuperātes humores deorsum trahendi. aut medicamentis bilem per inferna ducentibus corpus purgandū, catapotiiis nimirū aureis, alephāginis, & similib. Avertendi etiā à capite sunt humores frictiōibus extremitatū, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Proderunt etiā medicamēta in-

Si calid<sup>us</sup>  
humor.

Auersio.



tra corpus sumpta, quib. alterādi inest facultas: ut est syrupus violaceus, nymphaeae, de papauere, & similes. Embrochae etiā, & odoramēta suprà in cap. de Doloze capitis commemorata adhibeantur. Emplastrū quoque ex terra sigillata, aut bolo armenio & plantaginis succo confectum, raso capiti imponatur. Si verò frigidus humor sit qui à capite destillet, per ea quae pituitam purgant, corpus vacuabis. In quem usum nō parum proderit validi clysteris iniectio. Quo peracto, à capite auertere atque retrahere humores cōueniet. Dein ubi materia concocta fuerit, apophlegmatismis, gargarismis, & similib. medicamentis caput purgandum. Sacculi etiam capiti ad mouendi sunt, hunc in modū cōfecti. R. Florū chamæmeli, meliloti, stæchadis arabicae, foliorū lauri, pulegii, origani, añ m s. cinnamomi, gariophyllorū, añ 3 s. maceris 3 ii. nucis myristicae, galliæ moschatae, añ 3 i. Terantur omnia, & fiat sacculus capitalis, qui futuræ coronali imponatur. Cōfert etiam caput oleis calidis, irino, anethino, & rutaceo perungere. Destillationem verò reprimunt omnia quibus exiccandi inest facultas: potissimum verò nigella, aut cuminū deustum paniculo inditum & illigatū, præsens auxilium affert. In hūc usum suffimēta adhibere oportet, sic composita. R. thuris, mastichis, añ 3 i. ligni aloës 3 i. cinnamomi, gariophyllorum

Si frigidus humor.

Sacculi.

Destillationē reprimētia.  
Pastilli  
& suffitu.



Pastilli añ 3 s. galliæ moschatae ð ii. foliorũ lauri, san-  
 pro suffi talorum luteorũ añ 3 s. moschi, ambar añ gr.  
 tu. 1. Teratur singula, & cũ styrace liquido quod  
 satis est formentur pastilli, quorum vnus pru-  
 nis inferatur. Aliud. R. saluiæ, maioranæ, ros-  
 marini añ 3 i. maceris, gariophyllorum, cin-  
 namomi añ ð ii. ligni aloës, thuris añ ð i, mi-  
 sce, fiat puluis, qui carbonibus ignitis inii-  
 ciatur.

DE LIPPITVDINE, SIVE OPH-  
 THALMIA. CAP. XXIIII.

*ὀφθαλμία.* Ophthalmia Latinis lippitudo dicitur, est  
 inflammatio tuniciæ vel membranę adnatæ,  
 quam cõiunctiuam hodie vocat. Adnata au-  
 tem dicta propterea, quod aliis quæ oculum  
 ipsum constituunt, tunicis forinsecus adnata  
 sit, ligamentum existens toti oculo ad circũ-  
 iacentia ossa: idcõque ambientes oculorum  
 partes vsque ad malas nonnunquam in vhe-  
 mentiori lippitudine simul attolluntur. Fit  
*Causæ.* vel ex plenitudine vniuersum corpus aggra-  
 uante, ob quam adnata etiam humoribus re-  
 ferta tenditur. Vel ab influetium acrimonia,  
 vehementer erodẽte: vel propter aliquã cras-  
 sorum humorũ, aut spirituum flatulentorum  
 intensionem. *Signa.* Dignoscitur, quando adnata  
 oculi membrana, quæ natura alba est, ob san-  
 guinis cõfluxum rubea esse videtur, & ex o-  
 culis lachrymę resudant, atque in maioribus  
 oculi angulis sordes quædam colliguntur.



Locus in quo decumbit æger, obscurus & te- Viæus.  
 nebrofus sit, & pro cauſe diuerſitate aut frigi-  
 dus aut calidus. Si in propatulum egreditur  
 æger, panniculo atro aut viridi oculos obdu-  
 cat. Tenui vtatur viætu, & cibo parciore. deu-  
 tet carniū lactiſq; eſum. Vino haud vtatur,  
 præſertim inter initia. Bibat itaq; decoctum  
 cinnamomi, aut hordei, donec vigor præter-  
 eat. Quod ſi tamẽ craſſi humores tenſionem  
 procrearint, hydromeli aut vinum tenue &  
 aquoſum bibere conueniret. Exercitari haud  
 prodeſt, ſed quieſcere & dormire. Perturba-  
 tiones animi procul abſint. Si ex plenitudine  
 cõtracta fuerit inflammatio (id quod digno Curatio.  
 ſcitur ſi cum ingenti dolore oculos affigente  
 plurima tenſio, rubedo, renitẽtia, & calor af-  
 fluxerit) à ſanguinis miſſione curandi ratio  
 fuerit, feruidarũque lachrymarũ copia de-  
 auſpicãda erit. Venam autem ſecare oportet  
 cubiti ſuperiorem, quam humeralem vocãt.  
 atque eam potiſſimũ, quẽ è directo eſt. Et  
 ſi vehemens ſit inflammatio, ad animi deli-  
 quiũ vſque ſanguinem auferre conueniet. Si  
 verò à rodentibus, aut craſſis humoribus lip-  
 pitudò orta fuerit, id quod lachrymẽ tenues,  
 ſalſæ, acres, calidæq;, aut contrariæ monſtra-  
 bunt, atque adeò totum corpus cacochy-  
 mum fuerit, prauisq; humorib. abundaue-  
 rit, quæ noxios humores vacuare & purgare  
 poſſunt, medicamenta propinãda, quæ certè



pro redūdantiū ac infestatiū humorū varietate immutāda veniūt. Corpore inanito, humorū impetus qui ad oculos fertur, deorsum ad alias corporis partes ignobiliores frictionibus infernarum partiū, ligaturis artuū, & cucurbitulis reuellendus erit. Posthac adhibenda sunt medicamenta repellētia, quæ nō exasperent, hoc est, non vehementem sortita sint adstrictionem: sed quæ tum propriā sua substantiā sint moderatiora, tū lenitiui liquoris admixtione adhuc magis talia fiant. Lenitiui autē humores sunt potissimum, Galeno lib. 13. Ther. meth. cap. vlt. teste, oui candidū, & fœnigræci decoctū, & ad hæc amplius ipsum lac. In quo prouidū esse cōuenit, vt iuueculæ simulq; boni succi fœminæ ex istat, vberibus ipsius in cotē, in qua collyriū teritur, expressis, quò calidū adhuc oculis infundatur. Hoc autem præcipuè in vehemēti dolore afflicto, aut propter inflammationis magnitudinē, aut ob influentium humorū acritudinem faciendum. Fronti itaque illiendi succi rosarum, plantaginis, solani, foliorū fœlicis, cū oui albo & aceto. His ammiscere oportet bolum armenium, thus, acatiam, sanctalos rubeos, balauftia, & similia, ex quibus adiecto oleo rosaceo & farina hordeacea emplastrum componendum erit. Emplastica & anodyna, vt est cerussa & amyllum, nō temere adhibēda. hæc enim etsi sensum tor-



pescere faciant, tamen vehemētes fluxiones,  
 Galeno 6. Aph. com. 31. teste, non reprimūt,  
 sed excerni prohibent: atque adeò si humo-  
 res fluentes acres fuerint, corneam erodi cō-  
 tingit. Si verò multi, magis irritari, ac vehe-  
 menter extendi. Pariter vehementer stupefa-  
 ciētia, nisi maxima doloris necessitas vrgeat  
 non sunt admouenda: quòd scilicet faculta-  
 tem visoriam offendant, adeò vt cessante in-  
 flammatione, vel debilitate vel nihil omnino  
 videāt. In principio itaque medicamēta quæ  
 refrigerant, adstringūt & repellunt, adhiben-  
 da. In incremēto, repellentib. nonnihil ex iis  
 quæ discutiunt admiscēda. At in vigore miti-  
 gatoria applicanda. In declinatione, ea quæ  
 tantum discutiendi facultate pollēt. Vbi igitur  
 concocta iam phlegmone ipsa fuerit, &  
 simul corpus vacuū, tum vtiq; lauationes in  
 balneo his sunt aptissimæ. nā Galeno vbi su-  
 prā autore, & dolorem statim sedant, & flu-  
 xionem quæ ad oculos fertur, sistūt, maxima  
 quidē eius parte inter lauādum per totū cor-  
 pus excreta, reliquo verò cōtemperato miti-  
 gatōve. Fomentū præterea omnino adhiben-  
 dum est ipsis oculis per spongiā, si quidem  
 mediocris sit dolor, semel aut bis in die: si ve-  
 ro vehementior dolor vrgeat, præstat ter aut  
 quater, & læpius vti, in lōgis præsertim æsti-  
 uis diebus. Fiat autē fomentum per meliloti  
 & scēnigræci decoctū. Est namq; hoc medi-  
 f

Balneum

Fomen-  
tum.



camentum maxime omnium quæ oculis ad-  
mouentur, sine offensa discutiens. Lauādum  
tamē prius curiosè fœnogræcum, ne quid illi  
vel pulueris vel sabuli adhærens clām lateat.  
Aloë etiam per se, vel aqua aut succo fœnicu-  
li diluta mirabiliter confert.

## DE SVFFVSIONE. CAP. XXV.

ὑπόχυμα  
καὶ  
ὑπόχυσ-  
σις.

Causa.

Signa.

Hypochyma & hypochysis, Latinis suf-  
fusio dicitur, barbaris cataracta. Est, vbi hu-  
mor lentus & glaciei modo concretus, inter  
corneam & crystalloidē circa pupillā subit,  
quo visus eatenus saltē impeditur, vt nō pos-  
sit discretas rerū species & colores oculus ap-  
prehendere. Accidit potissimum ex refrige-  
ratione, ac imbecillitate spiritus visorii, Pau-  
lo lib. 6. capite 21. autore. Fit etiam ex vomitu  
violētius cōcitato, & ex ictu, & humore pi-  
gro in cornea mēbrana iuxta pupillam col-  
lecto. Ichoante morbo tanquam pusilli cu-  
lices, vel alia lucētia, caliginosaque quædam  
corpuscula assiduē præ oculis obuersari vi-  
dentur. Quibusdam veluti lanarum filamen-  
ta, & telæ araneæ, quibusdam circa lucer-  
nas circuli offeruntur. Hæc autem nonnun-  
quàm propriæ noxæ oculi, nōnunquam ven-  
triculi passioni ferūtur accepta. Quare inter  
hæc duo discrimē habendum est. Si quidem  
visa ob humorum in ventriculo cōtentorum  
vitium oborta fuerint, vtriq; oculo similiter  
accidūt. Quæ verò per propriam passionem



apparent, neque incipiunt simul in utroque, neque similiter apparēt. Deinde ex tempore quoq; distinguuntur. Si enim tribus quatuorve aut etiā pluribus mēfibus suffusionis symptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, nihil tenebrosum videatur, ab ore ventriculi passionem procedere inuenies. Si verò non ita multum tēporis intercessit, querendum est in primis, utrū ex quo incepit affectus, singulis diebus perpetuò huiusmodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet interueniente die qui omni querela caruerit, an diebus quibusdam laborans exactè videatur conualuisse. Nam continuas suffusionem portendit: intermissio verò, quod malum à ventriculo prodierit, suspicionē excitat. Idq; magis, si vbi perfectè quis concoquens, nullum sibi visum apparere fatetur. Sed multo magis, si quum apparuerūt visa, mordicus in ore vētriculi doluit: maximè verò, si post hęc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint symptomata. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut nō exactè pura videtur, suffusionis esse initium censendum est. **Victus.** **Victus.** ratio sit attenuatoria, & exiccatoria. A vino absteineat in tota medicatione, & pro eo decoctum cīnnamomi, aut hydro-meli bibat. Fugiat omnia caput replentia. A balneis absteineat, nisi vel lassitudinis vel cruditatis causa sint necessaria: atq; ne tū quidē



# EONHARTI FVCHSII

in aëre balnei diutius immorari. neque in folio persistere, sed sensim quidem ingredi, cōfestim verò egredi oportet. Vident pisces, fructus, & quicquid corpus humectare potest. Suffusi in principio, nisi quid obstat, venę cuti exterioris sectione, & acubus clysterib<sup>9</sup> purgationib<sup>9</sup>que curantur. Deinde cucurbitula occipitio cū scarificatione affigenda est, utendūque per intervalla apophlegmatismis, & iis quæ per nares purgāt. Cauterium etiam quale suprà cap. ii. descripsimus, post aures apponendū erit. In oculis autē medicamentis est primum simplicib<sup>9</sup>. utendum, puta melle cum oleo & succo fœniculi: postea cōpositis, quale hoc est, quod R<sup>x</sup> succi fœniculi ꝑ ii. aquæ chelidonii maioris, euphrasie añ ꝑ i s. sagapeni 3 i. misce. Fellis etiā genera per se, aut cū fœniculi succo illita proderūt. Aut myrrhę & piperis partes equales cum melle,

## DE AURIUM DOLORE

### CAP. XXVI.

**Causæ.** Auriū dolor aliquibus ex refrigeratione, in peregrinatione à frigidis ventis facta, oritur. Aliquib<sup>9</sup> verò ex balneis frigidis, & quibusdā ex aquis medicatis excitatur. Fit & auris dolor ex inflāmate, interdum quidem solius circa meatum cutis, interdum verò in profundo, quando videlicet nervus auditorius ad inflammationis affectum peruenit. Qua verò ratione inflammatio, partes



inflammatas distēdens, dolorē parit eodem modo etiam flatulentus spiritus transitū non habēs, dolorem efficit. Saniosi denique & ferrosi humores in corpore aurium generati, consimiliter vt mordaces humores qui extrinsecus illabuntur, dolorem conciliant. Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, de aegri sermonibus facile cognoscitur, & inde quod dolor altē citra grauitatē vel distensionem vel ardorem, fixus sit. At qui ex calida ortus est intemperie, ex eo quod in illo feruoris cuiusdā sine grauitate seu tensione sensus est, deprehenditur. Si grauitas, distensio, simulq; calor & dolor pulsabilis, aut etiā febricula oboritur inflammatione aurē laborare censeo. Sola autē citra grauitatem distensio, spiritum flatulentum, cui exitus nō patescit, indicat. Viētus ratio ex superioribus iuxta causā diuersitatem faciliē institui potest. Cæterum dolorem à sola refrigeratione obortū, calefacientia quā celerrime curant, nempe oleum rutaceum, laurinum, nardinum, cicinum, anethinum, & liliaceum. Oleum etiam in quo allium decoctum est vel cepa, instillatū mirificē confert. Sunt qui magnas cepas exsculpētes, deinde oleo explentes, & in feruēte cinere moderatē calefaciētes, ita aurib⁹ infundāt. Galenus euphorbio perquā exiguō ad multū vetus oleum ammixto vsus est veluti etiā pipere exquisitissimē trito. Mani-  
f.iii.

Signa.

Viēt⁹ cura-  
ratio do-  
loris fri-  
gidi.



**Doloris calidi.** festum verò est omnib<sup>9</sup>, quicquid adhibetur, mediocriter calidum esse oportere. Quñ autem à calida intemperie dolor obortus fuerit, tum contrariis medicamentis propulsandus erit. Mirificè igitur cōfert rosaceum oleū in aurem demissum, vel acetū, vel succus solani, oleūq; nymphææ. Vt R<sup>x</sup> olei rosacei, succi solani añ<sup>9</sup> s. acetū 3 i s. misce. Magnificè etiā eos dolores mitigat oui cādidiū, itēque lac muliebre. Vbi verò aqua medicata circa auditoriū meatum cōtineatur, oleū asiduè infundere conuenit, quo ipsum eluamus: dein lana molli extergere, rursūque infundere. Plurimum etiam prodest adops anserinus, atque item vulpinus. Sed nihil ad aquam euocandā præstantius quàm oris exutio, quæ etiam per calamum ceu canalē exugī potest. Si quis etiam alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declinū saliat, aquam faciliè excutiet.

**A flatib<sup>9</sup> & humo rib<sup>9</sup> cras sis.** Si vero à flatibus, aut crassis viscosisque humoribus dolor excitatus fuerit medicamentis quæ obstructions auferunt & inicidunt, vtendum: cuiusmodi sunt omnia amara, quæ sine erosionē expurgant exterguntque. Ex quo genere est albū item ac nigrum veratrū, amygdalæ amaræ, ex aristolochiis quæcūq; fuerit ad manū, iris illyrica, vitis albæ radix,

**Ab inflā- matione.** centaurii minoris coma, cinnamomū, & polium. Quòd si inflammatio adsit, statim san-



guis ex humerali vena eiusdem lateris, mit-  
tendus est. Deinde oxyrhodinum tepesfactū  
instillandum. At si vehementior fuerit inflā-  
matio, ad sedandos dolores albumen oui cū  
lacte mulieris tepidū infunditur. Cogēte ve-  
rò dolore, necessarium est etiam his quæ sen-  
sum stupefaciant vti. Neque enim mediocre  
periculū est, ne cerebrum nervo per quem fa-  
cultas audiendi distribuitur vicinū, per con-  
sensum afficiatur. Miscetur autem pauculum  
opium muliebri lacti, & oui cādido, quæ &  
ipsa per se aurium inflammationibus p̄sunt.  
Castoreo etiā opium miscetur. Verum mul-  
to ante vsum tempore, Galeno lib. 3. de cōp.  
med. cap. 1. autore, siue pari pondere, siue du-  
plo castoreo ammisceatur, præparatū id esse  
conuenit. Et miscetur quidem in vehementis-  
simis doloribus parī, in minoribus verò du-  
plo. Liquor verò quo prædicta medicamēta  
diligenter priustrita & leuigata, diluūtur, sa-  
pa sit. Opio etiam oleum rosaceum & viola-  
ceum miscetur in hunc modū. R̄ opii ℥s. o-  
leorum rosacei & violacei añ. 3 i s. misce. Phi-  
lonis antidotū frequenter etiā sic laborātib⁹  
profuit, dissolutū lacte muliebri, & instilla-  
tum. Extrinsecus verò aurē assiduē siue oleo  
cōmuni, siue ex quodam calido fomento o-  
portet fouere, lanāque hoc imbutā in aurē  
cōicere, sed ita vt partes inflāmatione tenta-  
tæ quàm fieri potest minimē attingātur. Vbi  
f.iiii.

Stupefa-  
cientia.



autem dolor inueterauerit, & iam in suppu-  
rationem conuerti cœperit, medicamento è  
succo lini seminis utitur, quod vnà cum rosa-  
ceo aut chamæmelino solutum instillabis.

## DE PAROTIDIBVS. CAP. XXVII.

παρωτι-  
des.  
causa.

signa.  
victus.

curatio.

Adstrin-  
gentia &  
reprimē-  
tia medi-  
camenta  
in paroti-  
de nō ad-  
hibēda.

Parotides sunt inflāmationes, quæ in glā-  
dulis auribus adiacentibus fiunt. Causa eius  
non est alia quàm reliquarum inflāmatio-  
num, quæ in glandulosis accidunt partibus.  
Signa nulla ad agnoscendas parotides requi-  
runtur: oculorū enim iudicio subiact. Vi-  
ctus ratio talis, qualis in aliis inflāmatio-  
nibus, instituenda venit. Curādi ratio à ve-  
næ sectione, si ætas aliāque permiserint, au-  
spicanda erit. Incidenda vero humeralis eius-  
dem lateris vena. Non tamen ad eas, quem-  
admodum alias inflāmationes, in principio  
reprimentibus utimur, sed contra attractoria  
medicamenta adhibemus. Atque si hæc nihil  
notatu dignum effecerint, etiam cucurbitu-  
las affigemus, aut fomenta assidua adhibe-  
bimus. Annitendum enim, vt affligens hu-  
mor ex profundo ad cutem attrahatur, præ-  
sertim vbi in capite affectus sit firmatus, hu-  
morib. in eo pertinaciter herentibus. Quin  
& quum citra capitis affectum, in febribus  
acutis natura superuacuos humores ex vasis  
effundens, ad regionem inter cutem & sub-  
iecta corpora deponit, quando sanè & glan-  
dulæ ex effusis humoribus opplentur: me-



lius esse utique etiam tunc videtur, naturę per humorum decubitus seu ex loco in locum impetuosum illapsum febres curanti, opitulari. At verò quum vehementi impetu influxus irruit, nihil nos tentabimus, sed omnia naturę permittemus. Si enim vel cucurbitā vel medicamentum humores ex alto ad cutē attrahens admouerimus, vehemens dolor hominem apprehendet, unde & vigilię suborietur, febres intenduntur, ac vires exoluentur. Mitigare itaque tunc nō humorū influxui opitulari conuenit, per cataplasmatum maxime lenientium vsum. Eligenda vero, quę cū humiditate moderata calorem habeant, doloribus mitigandis sedandisve, atque influentibus humoribus concoquendis & maturandis idoneum. veluti est quod ex farina hordeacea, aut triticea, aut seminis lini cū mulla, aut foenigraci, aut althęę, aut chamęmeli decocto paratur. In hunc etiam vsum valet butyrum assidue illitum, & ouorum vitelli. Si illius etiam adeps cum butyro liquidus, cera exigua addita. Si itaque tumor nō discutitur, suppurantibus medicamentis vtendum est: velut est farina triticea, cum caricarū decocto, & oleo. Si vero suppurata fuerint parotides, tunc aut per sectionē pus elicere oportet, vlcusque velut in eiusmodi moris est curare, aut sanē per acre medicamentū abscessum rumpere: quale est quod ex alliis constat.



ant tentare, vt ipsum per medicamenta attractoria tenuiūq; partiū discutiāmus, bis per diem ablati, & fomentis admotis, donec remiserint & laxati fuerint dolores. Quando verò iam plurimum puris fuerit discussum, tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: deinde verò neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere oportet, vt siquid reliquū in profundo hereat, id ipsum discutiāt. Quòd si durities adsit, ea ipsa quoque molliēda est. quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emolliētibus attractoriis ammixtis. Manifestum autem est q̃ moderatæ parotides, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit tanta, vt vehemētes dolores excitet, neq; caliditas cum humore adest, facile per medicamenta emollientia & discutiētia, quale est emplastrū diachylō, sanari possint.

DE SANGVINIS EX NARIBVS ERUPTIONE. CA. XXVIII.

Causæ.

Causæ profluii sanguinis ex naribus externe multe sunt, nempe casus ab alto, ictus, exercitiū vehemens, mora in sole. Multe etiā sunt internæ, nimirum copia sanguinis, vel eiusdem tenuitas. Omnes autem causæ sub iis tribus complecti possunt. Sanguis enim profluit ex naribus, aut reserato venarum vel arteriarum quę in capite & narib⁹ sunt, ore,



aut tunicâ earundem rupta ac diuisa, aut sudoris instar transcolatus. Porro, reseratur venarum & arteriarû os propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad eos earû impetu ruit, copiam: ad hæc acrem quampiâ, quæ illi extrinsecus incidit, qualitatem. Diuiditur autê tum ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris instar transmittitur tunicâ quidem ipsâ rarefactâ, sanguine vero tenuato. Causæ externæ de sermonibus ægrotantis cognoscuntur. Plenitudinis notæ dictæ sunt suprâ cap. 6. huius libri. Decretoriû sanguinis ex naribus p-fluium, ex morborum, qui præcesserunt, cõstitutione deprehenditur. Victus ratio talis sit, quæ infrigidare & incrassare sanguinem queat. Tenuis etiâ sit. Aëre itaque vtatur frigidiore: cibis boni succi, & concoctu facilibus. Feruente sanguine, vescatur lactucis, endiuiâ, scariola, pyris, cotoneis malis, pullis gallinaccis assis, aut cû omphacio decoctis. Bibat vinum crassum ac rubeû, fugiat verò tenue & album: Aut in potu vtatur aqua frigida, vel decocto cinnamomi. Parû loquatur animique perturbationes (iram potissimum & similes) deuitet. Caput præterea sublime habere conueniet. Curandi verò ratio ab iis q̃ sanguinẽ ad alias corporis partes auertere possunt, auspicâda. Primû itaq; si plenitudo corporis adsit, aut etas pmiserit, egerq; re-

Signa.

Victus.

Curatio.



frictio.

Ligaturę  
cucurbi-  
tę.medica-  
mēta re-  
frigeran-  
tia & ad-  
stringen-  
tia.

solutus adhuc non sit, vena in cubito incidenda est, qui profusioni ē directo respōdet. vbi paululum detraxeris, mox vnā horam inter mittens, rursus detrahes: pōst iterum atque iterum pro laborantis viribus. Frictio etiam infernarum partium, brachiorum videlicet, manūū, femorum, inguinū, ac pedum potissimum, per ea medicamenta quę calefaciūt, adhibenda. Pręterea vincula valentius adducta, iis remediis, quę reuellunt, adnumeranda sunt. Sanguinem denique ē naribus erumpentem retinent magnę in hypochondriis defixę cucurbitę. Infigendę autem sunt, si ex dextra nare profluit sanguis, super iocinore: sin ex sinistra, super liene: si ab vtraque nare, super vtroque sunt imponendę viscere. scapulis etiam cum scarificatione applicandę sunt. His peractis, medicamenta quę refrigerant & adstringunt, intra & extra corpus adhibenda erunt. Extrinsecus itaque apponenda fronti & cōmissurę coronali sunt, epithe mata ex succo plantaginis, lactucę, acetosę, bursę pastorię, polygoni, & similibus. Mirificę vero cōfert, si linteolū in aceto madefactū frigidum, iterum atque iterum fronti & ceruici admoueris. frons etiā spongiis ex aqua frigida fouenda. Proderit etiam hoc epithe mate iocinori & fronti imposito vti, quod ex aquarum rosarū, solani, oxalidis (hoc est acetosę) plātaginis añ ʒ iii. aceti ʒ is. specie-



rû diatrifantali, diarhodô abbatis, añ 3 s. bo-  
 li armenia, eboris vñi, lapidis hæmatitidos,  
 añ 3 i. misce, fiat epithema. Hoc etiã obstruē-  
 ti medicamēto, quod Galen. li. 5. The. meth.  
 optimum esse inter omnia alia asserit, vten-  
 dū, quod R̄ thuris 3 ii. aloës 3 i. Redacta in  
 puluerem cū oui candido subigantur, donec  
 ad mellis crassitudinem redeāt: de hinc lepo-  
 ris mollissimo pilo excipiātur, & admouēā-  
 tur. Licebit etiam linamentum cōtortū hoc  
 medicamento imbutum naribus indere. Mē-  
 tam porrò tritam in nares cōiicere proderit  
 aut spongiam in acre & feruidum acetū con-  
 iectum, forinsecūs ad sanguinem profundē-  
 tem narē apponere. Aliud. R̄ putaminis oui  
 3 ii. gallē omphacitidis 3 i. trita linamēto tor-  
 to aqua aut aceto madefacto excipito, & in-  
 dito. Frontem verò & nasum gypso albumi-  
 ne oui madefacto integere cōfert: aures quo-  
 que validè linteis & cera obturare, & in ore  
 aquam pluuialem frigidā continere. Succus  
 etiam foliorum vrticæ linamēto impositus,  
 sanguinem ex naribus erumpentē reprimat.  
 Idem etiam potest caudæ equinæ succus, aut  
 ipsam & trita applicata. Cochlearum carnē  
 cum aceto tritam, aut easdem cum suis domi-  
 liis vñtas tritāsq;, fronti ac naribus ex aceto  
 admouere conuenit. Supra omnia cōfert san-  
 guis, qui ex ægrotantis promanauit naribus,  
 si i vase figulino tostus fuerit: de quo R̄ 3 iii.



boli armenie, gypsi añ 3 i. caphure 3 i. cū oī  
cādido & exiguo aceto reducātur ad mellis  
crassitudinē, & fronti imponātur. Necessita-  
te urgēte, grana duo aut tria opii adicere li-  
cebit. A tota substantia stercus asinī exic-  
catū, & in puluerē redactū, conducere vi-  
detur, id quod porcinum etiam efficere po-  
test. Intra corpus adhibēda ea quę infrigidāt  
& adstringūt medicamēta, vt sūt syrapi, ro-  
faceus, myrthinus, & nymphae, & de papaue-  
re. Cōseruā rosarū, nymphae, & oxalidis. Pa-  
stilli de terra sigillata, de succino, de ebore  
seu spodio, cū succis paulò antè cōmemora-  
tis. Porro si quid interea ex sanguine absor-  
ptū esse videatur, etiam idipsum, vbi multa-  
cius sit copia, per medicamentum, quod va-  
cuare potest, educito. In vētre enim & intesti-  
nis in grumos coactū, incensionem facit.

## DE DOLORE DENTIVM.

## CAP. XXIX.

**Causa.** Fit interdum ab intemperie vel frigida  
vel calida, interdum verò propter defluxum  
humorum ex capite in radices eorundē: qui  
sua acrimonia illos aut erodunt, aut consimi-  
lem in eis passionem sua copia excitāt, qua-  
lis est circa carnosas partes inflammatio. Si  
**Signa.** à nuda qualitatē intēperie dolor ort⁹ sit, mi-  
nimè grauati⁹ erit: sin ab humore copioso  
inflūēte, non solū grauati⁹ dolor in denti-  
bus sentitur, verū etiā in reliquis partib⁹ quas



pertrahat. Calidus autē humor, vehemētiorē  
frigidus verò, remissiorem mitiorēq; do-  
lorem excitat. **Viētus ratio,** quæ maximè, **Viētus.**  
ne dolor accidat, efficere potest, talis sit, vt su-  
pra modū calida aut frigida deuitentur: po-  
tissimū verò cauendū, ne statim sese sequan-  
tur. Vitanda acida, acerba, & viscosa omnia.  
Lactis etiam frequens vsus dentibus mirificè  
obest. Studiū & diligentia assidua sit in puri-  
ficatione dētiū. quæ sanè res eos à corruptio-  
ne omniū maximè tutos reddit. Utēdū cibis  
boni succi, & concoctu facilibus. Dolorē au-  
tem infestātē, iuxta causę diuer sitatē, viētus  
instituitur. **Curādi ratio,** si à nuda sit qua- **Curatio.**  
litatū intemperie, solis iis quæ alterare pos-  
sūt, medicamētis perficitur. Si à frigore, pro-  
derit vino tepido colluere dētes: extrinsecūs  
maxillę calefaciētibus oleis, chamæmelino,  
rutæceo, irino & similib<sup>9</sup> inungātur. Ad oris  
etiā collutionē in aceto decoquēda erūt ori-  
ganū, calamintha, hyssop<sup>9</sup>, pulegiū, satireia  
verbenacę rectæ radix, & similia. Sin à calo-  
re dolere dentes cœperint, in aceto decoque-  
re cōuenit portulacam, parietariam, semper-  
uiuum minus, & glycyrrhizam. Quod si in-  
tolerabilis existat caloris sensus, vtendum  
est seminibus lactulæ, intybi domestici, &  
papaueris horrensis, decoctis in aceto: forin-  
secūs oleis frigidis partes inungendæ. Porro  
si à redundātia humorū dolor excitatus fue-



- rit, si ætas, tempus anni, & alia permiserint, plenitudoque corporis affuerit, à sanguinis missione curatio inchoanda erit: Derrahéd<sup>9</sup> autem sanguis ex humerali vena, quæ è directo affectum locū respicit. Quo peracto, venas sub lingua incidere oportet, aut scapulis cucurbitas affigere. Si verò vnus dūtaxat humor exundauerit, medicamento quod eū humorem purgare consuevit, euacuetur. In quem vsū clysteres etiam, qui ad inferiora auertunt humorum impetum, adhibere licebit. Vacuato corpore, ea quæ reprimūt medicamenta admouebis: vt sunt succi plātagnis, rosarū, portulacæ, lactucæ, intybi domestici vtriusque, aut prædictarum herbarū decoctum cum modico aceto. Prodest verò mirificè, dolentes dentes acri aceto calido cum galla immatura colluere. Adiicienda etiā interdum erit caphura. Emplastrum quoq; ex farina hordeacea, cum decocto solani, halicacabi, & lactucæ confert. Inungendę etiam vicinę partes extrinsecus oleo rosaceo, nymphææ, exiguo caphuræ adiecto. Principio morbi iā transacto, reprimētibus admiscēda erunt discutientia: vt est decoctum scēnigraci, seminis lini, pyrethri, & hyssopi. Ad stupefacientia, nisi summa vrgente necessitate, nō est perueniendum. In hunc autem vsū adhibebis decoctum seminis aut foliorum hyoscyami cum aceto. Philonii etiam drachma
- Venæ sectionio.**
- Purgatio.**
- Reprimētia.**
- Discutientia.**
- Stupefacientia.**



vna in aqua aut vino diluta, non parum auxilii cōferet. Inter ea tamen, quæ à tota essentia conducunt, egregiè facere fertur ranæ in aqua & aceto probè coctæ decoctū, diutius ore retentum. Præclare prodest etiam senecta serpentis, in vino aut aceto cocta. Eadem quoque vsta ac trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, dentique imposita dolenti confert. Ipsa denique non vsta dētibus adfricta, non parum conducet. Origanum prætereà dentium dolorem lenit, & protinus tollit, si redactum in puluerē cum nitro inspargatur. Quod si verò prædicta nihil contulerint, dens aut ferro aut medicamentis auferendus erit. Quæ autē sint medicamenta ea quæ citra dolorem & absq; ferro dētem extrahere queunt, docet Aërius lib 8. cap. 34.

## DE APHTHIS CAP. XXX.

Aphthæ, vlcera tiōes quæ in superficie oris accidunt, igneæ caliditatis quidpiam habentes, Græcis appellantur: quæ nunc subalbidæ, nunc subrubræ sunt: aliàs crustæ modo nigrescunt, & hæ omniū periculosissimæ existūt. Barbari hunc affectum alcolam nominant.

Fiunt vt plurimū infantibus puerisq; lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutricis, aut nō probè ipsum cōcoxerit infans. Fiūt etiam aliquando in his qui ad perfectā ætatem peruenerunt, tum propter vitiosorū humorum ad os defluxum, tū propter acri-

Que à tota essentia cōducunt.

αφθαί.

Causq.



Signa.

moniam eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote visui aut tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quam conuenit partes sunt, tumoresque & citantur. Visu verò, ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albidiores, pituitæ.

Curatio  
infantiū.

liuentes verò & nigrefactæ, bilis atræ. Quæ infantibus accidunt, facile curantur, utpote quæ ex moderatè adstringentibus sedantur. Infantibus verò ea potissimum conueniunt, quæ in cibis offeruntur. Oportet itaque miscere cibis aliquid ex malis cotoneis, & aliis acerbis, pyrisque ac mespilis. Aliquando etiâ lactucæ quiddam & intybi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata videlicet ulceratione existente. Conuenit etiâ lens cum aceto & aqua decocta, cum modico pane cōmanducata. Quod si infans ipse cibum capere haud possit, nutricem eius huiusmodi victu curare oportet: necnon infantium ora medicamentis cōuenientibus illinire. Si quidem subrubæ infantium ulcerationes fuerint, à principio his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant, est utendum. Si verò subflauæ fuerint, iisdem quidem utendum, sed magis refrigerantibus: Si pituitosiores, adstringentibus: Si nigrescentes, iis quæ generosiùs discutiant. Sufficit itaq; pro iis rosarum flos, ipsa



que rosarum folia sicca cōtusa, galla, & thus, cum mulso aut melle rosaceo illita. Collutio-  
nes etiam oris ex succis rosarum, plātaginis, solani, aut decocto gallarum, balauſtiorum, rhoë obſoniorum, admixto Rob de ribes, aut confectiōe diamorōn, prōsunt. In eis Curatio  
qui iam perfectæ ætatis sunt, durioraq; cor- adultorū  
pora habent, efficacioribus remediis utimur. Viſtus.

Primum itaque, quod ad viſtus rationem attinet, qui in hac ætate constituti, ab omni-  
bus quæ salsa & acria sunt, quæque vitiosos succos progenerare possunt, abſtineant. In plenitudine totius corporis, primum venæ Venæ se-  
humeralis, & dein earū quæ sub lingua sunt, ſectio fiat. In cacoſchymia, humoris redundā ſectio. Purga-  
tis purgatio conuenit: Qua peracta, medica-  
menta quibus adſtringendi & reprimēdi fa-  
cultas ineſt, adhibenda erūt: Deinde verò ea  
quæ citra mordacitatem diſcuriunt, ut eſt fœ-  
numgræcum, glycyrrhizæ radix, melilotum,  
& alia prius ſæpe commemorata. In his ve-  
rò omnibus corporum naturas contemplari oportet, num molles ſint & humide, velut in pueris, eunuchis, & mulierculis: an duræ & aride, velut in piſcatoribus, nautis, venatori-  
bus, atq; agricolis. Fortioribus enim corpo-  
ribus fortiora adhibēda medicamenta, mol-  
liorib⁹ imbecilliora. Atqui ſi exulcerationes  
putreſcere incipiāt, maximè ī infantib⁹, præ-  
clare facit ex decocto gallarū & melle illitio.



Gallas itaque contusas aqua decoque, & cū decocto percolato parem mensuram mellis permiscens, rursus decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoque ut maximo remedio vtere, ita ut locis illitum satis diu digitis adfrices. Nec minùs egregiè facit cētaurii minoris exusti cinis illitus cum melle. Cornu etiam ceruinum vstum, tritū, & adfrictum, mirificè conducit. Ad aphthas quæ proserpunt, summè efficax est fœniculi radix vsta per se & cum melle illita.

DE FOETORE ORIS. CAP. XXXI.

Causæ.

Molestus oris odor primū ob putrescentes gingiuas, dentes, aut ciborum reliquias illic detētas accidit: deinde propter cutis oris calidam intemperiem, humiditatem, quæ in eo multa est, corrumpētē: interdum etiam ob humorem corruptū aut putrefactum, in ore vētriculi hærentem: Nonnunquam vero oris aut pulmonis exulceratione fit, ut molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes vel gingiuas, vel dentes, vel ciborū reliquias oris fœtor accidit, facilè visu aut de egroti sermonibus deprehendi potest: Si ob calidā cutis oris intemperiem, tum calor in ore sentitur, ac sitis adest: Si propter os ventriculi, tūc ante cibi sumptionē præcipuè oris odor molestus esse solet. Oris & pulmoris exulce-

Signa.



rationes, visus etiā agnoscit. totius enim corporis extenuatio phthysicos concomitatur.

Victus ratio talis sit, vt omnia quæ facile in ore aut ventriculo corrumpuntur, euitet ægrotus, lac, pisces, fruct<sup>9</sup> oēs, medullas, & pin-  
guia, aquas prauas, & similia. Vtatur potius cibis boni succi, potissimum verò assis. In cœnæ & prandii fine adstringentibus, pyris, cotoneis malis, & eiusmodi. Potus iuxta causæ diuersitatē sit vel vinum, vel cinnamomi aut hordei decoctum. Somnum statim à cibo fugiat. Si propter gingiuarum aut dentiū corruptionem foetor oris acciderit, corporisquē plenitudo fuerit, ex vena humerali primū sanguis mittendus erit, & dein cucurbitulæ ceruici affigendæ: Sin cacochymū fuerit corpus, medicamento idoneo humor redundans ac molestans vacuandus erit. corpore vacuato, localibus vtēdum: in quem vsum collutiones mirificè conferunt. qualis hæc est, quæ R<sup>x</sup> rosarum rub. plantaginis añ m i s. gallarum, balaust. nucis cupressi añ 3 ii. corticum granatorum 3 i s. aluminis liquidi, rochē nomināt, 3 i. decoquantur in aqua sufficienti, vsque ad tertiæ partis absorptionem. colaturæ adde mellis rosati colati, rob nucum viridum añ ʒ s. diamorōn 3 ii. fiat collutio: cū a qua calida dētes & gingiue colluantur. Proderit etiā frequens collutio ex aqua, cui acetum sit permixtum, manē, & statim à cibo. Non parum

g iii

victus.

Curatio.

Venæ sectio.

Purgatio

Localia.

Collutio



si à cali-  
da intem-  
perie.

etiam confert commanducatio pyrethri, ta-  
maricis & rutæ: collutio item ex aceto scyl-  
litico, aut decocto saluie, aut cum solo vino.  
decoctum mētæ ex aceto & aqua iuuat, si il-  
lo assidue os colluatur. Si à calida intempe-  
rie fit oris fœtor, contrariis curetur medica-  
mentis. Sin ab humore in ore ventriculi cor-  
rupto accidit, per ea quæ humorem illum va-  
cuare possunt, sanetur. Commodè autem per  
vomitum vacuabitur, qui iis quæ cap. 20. di-  
ximus, concitandis medicamentis venit. Dein  
confectiones stomachum roborantes, vt est  
aromaticum rosaceum, diambre, miuâq; co-  
toneorum exhibenda. Medicamenta verò,  
quæ in omni causa competere solent, sunt  
gariophylli, mastiche, macer, lignum aloës,  
cinnamomum, rosæ, santali, nux myristica,  
cubebæ, & alia ciusmodi.

LIBRI PRIMI FINIS.



## LEONHARTI FVSCHSII DE

## MEDENDIS SINGVLARVM

corporis partium, à summo capi-

te ad imos vsq; pedes, passio-

nibus, Lib. II.

DE COLUMELLAE INFLAM-  
MATIONE. CAP. I.

C A R N O S A quædam parti-  
cula in summo ore apparet  
dependens, si quis aperto  
plurimum ore toto linguam  
deprimat. Hæc veteribus  
græcis duobus appellatur nominibus, γαρ-  
γάρων & κίων, id est, gurgulio & columna.  
Postiores autē ferē oēs κιονίδα, hoc est, co-  
lumellam vocāt. Sepe admodū inflāmatio-  
ne afficitur, id quod ex influxu humorū ad  
illam contingere solet. Visu apprehēditur  
potissimū passio, acceditque in deglutiendo  
difficultas, dolor, tumor partis patiētis, & fe-  
bris. Viētus ratio talis sit, qualis in cæteris  
ferē inflāmationibus. conuenit autem præci-  
puè quies inediāq; . Curādi verò ratio si ple-  
nitudo affuerit, atāsque & alia permiserint, à  
venæ sectione auspicāda erit. Incidenda autē  
primū vena in cubito exterior, quā hume-  
ralē vocant, deinde ea q̄ sub lingua est. Alius  
etiā clysteribus subducenda, vt hac ratione  
non tantum vacuentur, verum etiam auertan

columel-  
la.

causa.

signa.

viētus.

curatio.

venæ

sectio.

Auerſio.



tur à loco patiente, humores confluentes. In quem vsum etiam conuenit scapulis affigere cucurbitulas. Neque hic negligenda sunt auxilia quæ fluxum reprimunt, qualia sunt quibus adstringendi facultas inest. vtendū itaq; hac collutione, quæ R<sup>x</sup> succi rosarum, plantaginis, prunellæ, oxalidis, solani añ § ii. diamorôn, rob de ribes añ § s. rob de oxyacantha, quam berberim vocant, 3 ii. aceti in quo rhus, hoc est sumach, maceratus sit, § i. succi malorum granatorū § s. misce, fiat collutio. Vel hoc gargarismo, quod R<sup>x</sup> rosarū rub. rubi, añ m i. balauft. corticis malorum punicorum, gallarum, glandium, añ 3 iii s. rhois, hoc est sumach<sup>i</sup>, hypocythidos añ 3 i s. se. oxalidis, se. citoniorum añ 3 i. Decoquantur in f<sup>b</sup> i. aquæ fontanæ, dum altera pars absumatur. colaturæ adiiice diamorôn § i. rob nucum viridium § s aceti optimi 3 vi. misce, fiat gargarismus. Et iis quidem in principio vtendum: & tum maximè, vbi affectus nō habuerit maiorem causam, nec ægri corpus multis humoribus refertum fuerit, aut particula affecta, naturâ debilis. Sin contra acciderit, sæpe quidem in principio, sæpe verò paulo pōst, id est, in tertio die, quippiam ex diffusoriis cōmiscendum erit, vt est semē lini, foenigræci, & althææ, radix iridis, atque mel. Omnia aurem hæc tepida sunt exhibēda: frigus enim nō tolerāt inflāmata. Si verò in vi-



gorem puenerit passio, gargarizet decoctionem furfurum calidam, aut decoctum glycyrrhizæ, hyssopi & ficuum. hæc enim non solū discutere, verumetiam mitigare malum possunt. Extrinsecus proderit, spōgiis oleo amygdalino madefactis & expressis fouere ceruicem: Aut lana mollis oleo tincta, collo circumponenda. Cataplasmata quoque ex farina hordei, aut semine lini, aut fœnigræci, aut ex iis simul mixtis admouenda.

## DE ANGINA. CAP. II.

Cynanche & Synanche Græcis, Latinis verò angina, propriè est inflāmatio, quæ in gutture vel faucibus fit: sic dicta ἀπὸ τοῦ κυνάγχης ἢ συνάγχης, hoc est, à suffocando. quoniam pestiferū & acutissimum fit malū, quod strāgulatu præsentaneū vitæ discrimen inferre solet. Hippocrates tamen & alii veteres, omnes passiones iis locis accidētes, quas spirandi difficultas comitatur, angine nomine appellant. Sūntque eius propriè loquēdo, quatuor differentiæ: vna, vbi fauces inflāmātur: Altera, quum neque fauces, neq; reliquæ oris partes, neque etiā externarum partiū vlla inflāmata videtur, æger tamen suffocationis periculū in gutture sentit. Tertia, vbi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter inflammātur. Quarta, vbi ad anteriorem regionem ceruicis vertebræ luxātur, unde cauus apparet locus, & dolorem quū tan-

κυνάγχης  
καὶ συνά  
γχης.



gitur, eger sentit. Recentiores, ut Paulus lib.  
3. cap. 27. & alii quidam, inter cynanchen &  
synanchen, item paracynanchen & parasy-  
nanchen, discrimen fecerunt, quod tamen Ga-  
lenus lib. 4. de Locis patientibus cap. 5. repre-  
hendit. His itaque synanche dicitur inflama-  
tio, quæ in interioribus faucium musculis ori-  
tur. Quæ verò in exterioribus earundem muscu-  
lis fit, parasynanche iisdem nominatur. Eodem  
modo & in gutture se habet. si enim interio-  
res eius musculi inflammatione cōficiuntur,  
cynanche: si autem exteriores, parasynanche  
his ipsis appellatur. Oriuntur à sanguine co-  
pioso ac calido præter naturam ad loca iam  
commemorata confluyente. Cognoscuntur  
iis notis. spiritus nō nisi recta ceruice, aut dif-  
ficulter trahitur. nonnullis febris oritur, do-  
lor, faciei rubor, & colli. Ad hæc tumor etiam  
in quibusdam superuenit. Aeger ore hiat: ci-  
bum non deuorare, nō potionem potest. In  
principio itaq; præceps ac compendiariū au-  
xiliū omnis angina requirit. Protinus igitur  
cubiti venam exteriorē eiusdem lateris in-  
cidere oportet, nisi quiddam maioris pericu-  
li impediāt. Parcè autem, & pluribus interpo-  
sitis vicibus, nō vniuersim, sanguis auferend⁹.  
quippe cummulata vniuersimq; facta euacua-  
tione, anima ipsis deficiente, suffocatiōis peri-  
culū superuenit, dum materia in affectā par-  
tem vbertim prorumpit. Curādum etiam ut

συνάρχη  
παράσυ-  
νάρχη.

causa.  
signa.

curatio.

venæ  
sectio.



modica fiat venę diductio. Nam quum in a-  
 liis, tum in magnis venę diductionib. acerua-  
 tim animi defectus irruit. Neq; tamen angu-  
 stiolem facere venę incisionem conuenit, ne  
 sanguis velut percoletur, & crassior eius pars  
 intus remaneat. quę causa huius passionis ex-  
 istit. Si per hęc parum proficitur, eas quoque  
 venas incidere cōuenit quę sub lingua sunt,  
 idque primo statim die. Quod si quid venę  
 incisionem fieri prohibeat, alius acriore cly-  
 stere, qualem in cap. de apoplexia descripsi-  
 mus, subduci debet. Post vniuersales aut ena-  
 cuatiōes, cucurbitas apponere oportet. Et si  
 quidem tumor circa maxillas, aut sub mento  
 persistat, in ipsum tumorem, & cum scarifica-  
 tione plurimum sanguinem extrahere, salēq;  
 respergere scissuras, & cōfricare. Quod si nul-  
 lus extrinsecus appareat tumor, retro in col-  
 lo iuxta primā vertebra cucurbita infigen-  
 da erit, & cōstanti attractione vtendum, fre-  
 quentiūque cucurbita auellenda. Auertendi  
 etiā humores, ne ad locū affectum cōfluant.  
 in quē vsum pedes aqua calida foueri debēt,  
 extremę partes validē deligari & fricari. col-  
 lum quoq; lanis oleo calido imbutis cōrega-  
 tur. Gargarizandū etiam statim per initia ex  
 iis quę cap. i de columellę inflāmatione di-  
 cta sunt. Cū morbus vrget consistitve, iis qui-  
 bus discutiendi vis inest, vtendū properē pre-  
 sidiis. vt est decoctū fœnigræci, ficuum, pas-

clystes.

cucurbi-  
te.

auersio.

gargaris  
mi.



Gargaris-  
ma.

fularum glycyrrhizæ: vel valentiorum iridis  
radicis, hyssopi, nigellæ, abrotani, cum oxy-  
melite. Tale itaque gargarisma proderit,  
quod R<sup>x</sup> glycyrrhizę decorticatæ § i. passula-  
rum § s. ficuum aridarū numero vi. fœnigręci  
3 ii. hyssopi, abrotani añ ms. Coquatur in lb.  
i. aquæ fontanę, vsque ad medietatis cõsum-  
ptionem. colaturę adice mellis rosacei co-  
lati § i s. oxymelitis simplicis § i. misce, fiat  
gargarisma. Item stercus caninū aridum con-  
tusum, & cum melle perunctum, præstantis-  
simum est remedium, atque huius generis al-  
bum maximè: tum hirundinū similiter cinis

Cataplas-  
ma.

efficax est. Foris cervici etiam adhibeantur,  
quæ discutere valent cataplasmata & empla-  
stra, quale est quod R<sup>x</sup> farinę feminis lini, fœ-  
nigręci, hordeaceę añ § i. se. althęæ 3 ii. maluę  
flor. camomillę, meliloti añ m i. ferueant in  
aqua, donec mollescant: dein in mortario cõ-  
tundantur, adiectis oleorum chamęmelini,  
liliorū alborum añ § i s. fiat cataplasma. Non

Viſtus.

inutile est, si collū oleis, chamęmelino, ane-  
thino, liliaceo inungatur, aut decocto fœni-  
gręci, meliloti, chamęmeliq; foueatur. Qui  
angina infestantur, triduo aqua mulsa pro  
cibo vtatur: inde ptisanę cremore per se, aut  
cum suavi quadā potionc. Pręditus enim est  
is succus facultate extenuandi, discutiendi,  
alendi, & refrigeradi. Deinde vbi inflamma-  
tio imminuta fuerit, & ægri melius iā deglu-



tire cœperint, ouorū lutea perliquida, ac for-  
bitiones ex alica exhibebis. In summa, cibi  
agri viribus respondeant. ideóq; immodica  
alimenta vitanda. Somnus quoque, vt in o-  
mnib. aliis inflammationibus, sic in angina  
omnium maximè fugiendus. nam Hippoc.  
teste, sanguis in somno intrò magis repit.

## DE TVSSI. CAP. III.

Tussis variæ sunt causæ. Nam intemperies *Causæ.*  
frigida respirationis instrumētorum, tussim  
efficit. Humor etiam à capite in asperā arte-  
riam distillans, & sola asperitas mēbranæ as-  
peram arteriam intrinsecus ambiētis, tussim  
irritant. qui præterlabūtur etiam potus & ci-  
bi, tussim mouent. Lumbrici quoque stoma-  
chum infestantes, tussiculas paruas excitant.  
Acris deniq; humor stomachum perturbās,  
ac irritatiuam aliquam qualitatem ad fauces  
demittens, tussim producit. Humor etiam in  
pulmone & thorace detentus, in morbo late-  
rali, inflammatione pulmonis & tabe, maxi-  
mæ tussis causa existit. In summa, quicquid  
asperam arteriā exasperare potest, veluti fu-  
mus, puluis, & eiusmodi, tussis causa esse po-  
test. Signum autem ob solam intemperiem *Signa.*  
frigidam tussientium est, si per crebras inspi-  
rationes irritentur, frigiditate videlicet exin-  
de intensiore facta & aucta. Facile deniq; sūt  
pallida, siti nulla premuntur, calidis optimè,  
frigidis malè afficiuntur. Moderatè & mini-



me violenter tussiūt. Id quod 6. Epid. 2. par.  
 „ Aphorif. 12. sic scribēs testatur Hippocrates:  
 „ Tusses ficcæ, leuiter irritantes, nō à maligno,  
 „ sed vento potius accidūt Id verò hinc mani-  
 „ festum fit, quando loquuntur, aut os aperiūt,  
 tunc tussiant: cum verò nō, minimè. Quæ ve-  
 rò cum titillatione partium ab vtraque pala-  
 ti parte contingunt tusses, palàm ostendunt  
 defluxum à capite ad asperā arteriam defer-  
 ri, itémque ad pulmonem. Id quod ex diffici-  
 li, quæ comitatur, spiratione deprehenditur.  
 Quòd si sic affecti nihil expuāt, tenuem de-  
 fluxum indicat, qui expulsionē spiritus disse-  
 ctus, præ tenuitate sua rursus fluxū reflectit.

**Viātus.**

Ratio viātus iuxta causarum diuersitatem  
 variabitur. Si enim ex frigida intemperie in-  
 strumentorum respirationi deseruientium or-  
 ta fuerit tussis, aēr & ventus, cibi & potus fri-  
 gidi vitandi erunt. Sin ob humorem à capite  
 destillātem excitabitur, talis sit viātus ratio,  
 qualem suprà in cap. de Destillatione descri-  
 psimus. In vniuersum verò falsa, acria, & que-  
 cunque arteriam exasperare valent, vitanda.

**Curatio.**

Tussis ex frigiditate orta, per ea quæ instru-  
 mēta respirationis calefaciūt curabitur. Cer-  
 uix itaque lanis calidis vestiatur: rarò inspi-  
 randum, adeò vt non solum per spiritus com-  
 pressionem retinere queant ægrotātes & im-  
 pedire tussim, sed sanare etiā sæpissimè, per  
 respirationis inhibitionē frigefactas parti-



culas calefaciēdo. quapropter si hi leniter in-  
 spirant & aërem attrahūt, ac in calida domo  
 versantur, parum vel omnino nihil tussunt.  
 Thorax etiam calidis vnguētis, vt est oleum  
 iuinum, liliorū alborum, anethinum, & eius-  
 modi. Si verò humor tenuis & acris ex capite Tussis à  
 in thoracē destillans tussim excitauerit, tum tenuibus  
 per cibos potiss. boni succi, & per medicamē & acrib.  
 ta quæ refrigerant, spissant, & acrimoniam humori-  
 mordacitatēque arcent & obtundunt, cura bus cura-  
 bitur. In hūc sanē vsum cōuenit exhibere sy- tio.  
 rupū violaceum, nymphae, de papauere cō-  
 fectiones diatragacathē, diapenidii sine spe-  
 ciebus, pilulas, bechicas, & eiusmodi. item ea  
 etiam medicamenta, quæ à veterib. dolorem  
 leuantia & arteriaca dicuntur. de quibus Ga-  
 len<sup>9</sup> copiosissimē scribit lib. 7. de cōp. med.  
 secundum locos. Potissimum autem hoc cō-  
 feret, quod R<sup>x</sup> cōseruæ violarū, & nymphae Ecleg-  
 añ 3 s. diatragacathē frigide, diapenidii sine ma.  
 speciebus añ 3 vi. succi glycyrrhizæ 3 ii. pilula-  
 rum bechicarū 3 i. styracis calamitidis 3 i s.  
 myrrhæ, rosarū siccarum añ 3 i. tragacanthæ,  
 nucum pinearū añ 3 s. cum syrupo violaceo  
 quod satis est, fiat eclegma. Conueniunt etiā Tussis à  
 quæ suprā in cap. de Destillatione dicta sunt. crassis &  
 Si autem crassus aut viscosus fuerit affligens viscosis  
 humor, per ea quæ extenuant & incidunt, me- humori-  
 debimur. Exhibebimus itaq; syropos de gly bus cura-  
 cyrrhiza, de hyssopo, de prasio, de calamin. tio.



**Decoctū** tha, & similes. Aut decoctū hoc, quod **R̄** radicum iridis, petroselini, glycyrrizæ añ § i. radicis inulæ campanæ vocatę § s. caricarum numero vii. passularum mundatarum § i. se. vrticæ, anisi, fœniculi añ 3 ii. hyssopi, adiāti, scabiosæ, prasii, añ m i s. agarici optimi 3 iii. Decoquantur in aqua fontana iustæ quantitatis, donec tertia pars absumatur. Dein colētur, & colaturę adiciātur syrupi de hyssopo,

**Purgatio.** de prasio añ § ii s. misce, fiat potio. Posthæc, si videbitur vtile, corpus per ea quæ crassos & glutinosos humores purgāt, vacuandū. Inter alia verò multa, quę suprà dicta sunt, vnicē cōfert agarici dilutum, quod sic fit. **R̄** agarici electi 3 ii. zingiberis 3 i salis gemmæ gr. iii. macerētur per noctem in vini albi odoriferi § ii. succi absinthii & fœniculi añ § i. Mane colentur & exprimantur, & dissoluatur in iis eclegmatis indi 3 ii. oxymelitis scyllitici § s. & fiat potio. Vacuato corpore, eclegmata (quę officinis Loch appellātur,) exhibenda; de pino, sanum & expertū, de scylla, diairis solomonis cōfectio, & similes, quę singula in hunc modum coniungenda sunt. **R̄** loch de pino, sani & experti, de scylla añ 3 ii s. diairis solomonis § i. trochiscorū pectoralium 3 i s. pulueris diapenidi cum specieb. 3 i. pulueris radicis inulę, iridis añ 3 ii s. succi glycyrrizę 3 i s. cum syrupo de prasio quod satis est, fiat eclegma. Thorax extrinsecus inūgatur oleis

**Agarici dilutum.**

**Loch.**



calidis liliorum alborū, irino, amygdalarum  
dulciū, adiectis pinguedinib. & aliis, in hunc  
quidem modum. R. oleorum liliorum albo- **Vnguen-**  
rum, amygdalarum dulcium añ 3 iiii. pingue **tum.**  
dinis gallinæ 3 i. butyri recentis 3 ii. mucis fœ  
nigræci, radices althææ añ 3 i s. styracis cala-  
mitidos 3 s. pulueris radices inulæ, iridis añ  
3 i. croci 3 s. cum cera, quod satis est, fiat vn-  
guentum. Reliqua quæ ad tussis curationem  
requiruntur, ex capite de Destillatione petē-  
da crunt.

## DE ASTHMA. CAP. IIII.

Qui citra febrem crebrò respirant, quem-  
admodum solent qui citatiore cursu fatiga- **Asthma-**  
ti sunt, eos medici Græci Asthmaticos, Lati- **tici.**  
ni Anhelosos & suspiriosos vocare consue- **Suspirio,**  
rūt. Eisdem etiam propterea, quòd thoracis **fi.**  
corpus penitus rectum habere coguntur ob **Ortho-**  
suffocationis timorem, orthopnoicos nomi- **pnoici.**  
nant. Fit autem Asthma, quum aut crassorum **Causæ.**  
humorum ac viscosorum multitudo pulmo-  
nis bronchiis fuerit infarcta, aut tumor quis-  
piâ abscessui similis in ipso constiterit. Simi-  
liter autè difficulter spirant, qui asperam ar-  
teriâ à multa destillatione habent repletam.  
Facile autem inuicem hæ passionēs distin- **Signa.**  
guantur. Nam destillatio etiam sanis ex ma-  
nifesta causa repentè accidit, in totum fere  
citra febrem, concomitantibus etiam pro-  
priis destillationis signis. Si verò tumor abs-



Victus.

cessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur: neque ita diu post, inflammatione in pus trāsmutata, pus reicitur cum tussi. Si autem crudum tuberculū gignatur, hi neq; gravitatē magnā sentiunt, neq; difficultate spirādi admodū infestātur. Qui propriē asthmatici & orthopnoici appellātur, in totum febrem non habēt, gravitatis verò sensus eis cōtingit, neque quippiam purulētum per sputum reiciāt. Victus ratio in vniuersum calida & sicca sit. vitandus itaque aēr frigidus & humidus. vtendum carnibus perdicum, auicularum montanarum, gallinarum, caponū, & similibus. Fugiēdi pisces, fructus, item legumina, & omnia alia quæ crassos ac glutinosos humores procreare possunt. vtendum frequenter hyslopo, oreoselino, & foeniculo. vini autem potio ambabus cōuenit affectionibus, saltem tenuis substantiæ. In vniuersum autem paucus potus cōuenit, quibus abscessus oboritur: multus verò, quibus brōchia tenacib<sup>9</sup> & crassis humorib. sunt obstructa. Etenim hos humores repurgantia medicamenra necessario tusses commouēt. verū non faciliē per sputum reicitur ob crassitudinem, id quod repurgatum est: humectatione igitur multa indiget, quò facilius efferatur. Exercitio vtendū ante cibum, aut nō subito, quòd multi hac ratioē extincti sint. Frictiones etiam thoracis profunt. Fugiat ager irā,



in cerorē, & alias animū vehemēter perturbā  
tes affectiones. Porro curatio prædictarum Curatio.

passionū quiddam cōmune habet, quiddam  
etiā propriū: commune quidē virisq; vt redū  
dantia humoris has passiones generantis cō  
sumatur & aboleatur. Proprium autem, vt si  
à crassis ac tenacibus humoribus fiat passio,  
per extenuantia & extergentia medicamēta  
sanctur. Si verò à tumorib. abscessui similib<sup>9</sup>  
oriatur passio, per extenuantia & exiccātia.

Quæ sanē curandi ratio omnibus in profun  
do corporis abscessibus cōmunis existit. In  
crassis itaq; & tenacibus humoribus, conue  
niunt extenuantia & abstergetia citra vechē  
mentē calefactionē. ab immodico siquidem  
calore, quemadmodū etiam frigore, prædicti  
humores magis crassescūt, cogūtur, & cōtra  
hūtur, ita vt subinde difficulter auelli abster  
gīve possint. Quapropter maximē prodest Præpara.  
eis oxymeli scylliticū, ipsaq; scylla assa, cum tio.  
melle trita & delincta. Syrupus itē de glycy  
rhiza, de prasio, aut hyssopo, & decoctū quod  
supra in cap. de Tussi commemorauimus.

Quod ad euacuationē attinet, si necessitas vr Venæ se.  
geat, vena in cubito media, aut interna ante tio.

hec omnia incidēda, & tantū sanguinis quā  
tum vires patiūtur detrahendum. Sin corpus  
plethoricum non fuerit, facta humorum ad Purga.  
euacuationem præparatione, medicamenta, tio.  
quæ crassos & tenaces humores vacuare pos  
sunt.



sunt, frequēter exhibēda. Cōueniunt in hūc  
 vsum pilulæ de agarico, & coccię. Confectio  
 diaturbat cū rhabarbaro, eclegma indi, dia-  
 phenicōn. Dandū etiam dilutū agarici, quod  
 præcedenti cap. descripsimus. Alius quoque  
 clysteribus fortibus eluēda. Vomendū etiam  
 per iterualla ex sumpta radícula, & aliis quæ  
 vomitum mouent, de quibus diximus lib. i.  
 cap. 20. Interea dum frequētior sit purgatio,  
 exhibenda etiam medicamenta quæ sensim  
 & paulatim extenuare ad discutere humores  
 in thorace possunt. Intra corpus quidem, ari-  
 stolochia rotūda, inulę & iridis radix, semen  
 vrticæ, hyssopus, nigella, calamintha, & eius  
 modi, ex quibus decocta vel eclegmata con-  
 struenda. In hunc vsum loch, quæ in cap. de  
 Tussi recensuimus. conuenient. Thoraci fo-

Catapla-  
smata.

Vnguen-  
tum.

Abscess<sup>us</sup>  
curatio.

rinsecūs cataplasmata ex ficub. & hordeacea  
 farina, cui adiecta sit resina, cera & mel, im-  
 ponēda. Vnguēta etiam & olea magis calefa-  
 cientia, irinū, anethinū, & rutaceū admouen-  
 da thoraci, in hūc cōfecta modū. R. oleorum  
 anethini, rutacei añ 3 iii s. adipis anatis, galli-  
 næ añ 3 ii. radices iridis, inulæ añ 3 i. sc. lini 3  
 i. styracis calamitidos 3 iii. cū cera, quantum  
 sufficit, fiat vnguentum. Thorax tamen nun-  
 quam non antea fricandus pāno aspero, quō  
 apertis meatibus facilius vis medicamento-  
 rum ad profunda penetrare possit. Ceterū  
 abscessus qui attenuantib. & resiccantibus in-



digent, vt diximus, maximè aromatum gaudent facultatibus, quas omnes cōstat esse tenuium partium & resiccatorias, nec non calefacere. Conuenient itaque tum theriaca, mithridatis cōfectio, diamoschi dulcis, aromatici rosacei, & similes.

## DE PLEVRITIDE. CAP. V.

Pleuritis est inflammatio membrane, intrinsecus costas succingētis. Fit ex sanguine copioso calido, vt aliæ inflammationes, ad membranas prædictas præter naturam confluente. Huic accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor vehementer pungens, pulsus durus, & serræ modo asper. Et si sputum rubrum & cruentum fuerit, sanguinem superare significat: sin flauum & subpalidum, flauam bilem. Quemadmodū rursus, si album fuerit, & leuiter spumofum, pituitā: nigrius verò, melancholiam in sanguine præualere monstrabit. Succo ptisanæ primis duob. dieb. contentus in cibo sit æger: deinceps ptisana amygdalæ mundatæ & tritæ decoquantur, idque matutino potissimum tempore. vespere sumat lac amygdalarū, aut panis puri micæ cum iure gallorum, maximè vbi ægri vires imbecillas videris. Pisces etiā saxatiles in declinatione potissimum morbi dare conuenit. Acerba & adstringentia omnia vitanda. Potus sit, aqua decocti cinnamomi. Frigidam aquam, quod sputum in crude-

πλευρίτις  
causa.

NOTA.

viētus.



curatio. affectum, iramque & mororem fugiat. cu-  
 randi ratio cōfestim à venæ sectione incipiē-  
 da. secunda verò vena cubiti interna in bra-  
 chio è directo posito. hæc enim non solum à  
 loco affecto retrahit, verùm etiam euacuat,  
 vt in nostra apologia ea de re conscripta fu-  
 issimè demonstrauimus: id quod in pleuri-  
 tide & aliis inflammationibus internis ma-  
 ximopere requiritur. Eousque autem detra-  
 hēdus sanguis, donec vel multo rubicūdior,  
 teste Hippocrate, vel pro puro rubidoque li-  
 uidus effluxerit. Dein clyster aluo infunda-  
 tur leuis, si non vt conuenit, sua sponte deii-  
 ciat. qualis est qui R<sup>x</sup> malue, foliorum viola-  
 rum, mercurialis, spinachia, intybi domesti-  
 ci vtriusque añ m i. hordei integri § i. coquan-  
 tur in aqua iustæ quantitatis, quoad tertia  
 pars absumatur. R<sup>x</sup> colaturæ libram vnam,  
 castia recens extractæ § i s. olcorum chamæ-  
 melini, violacei añ § i s. butyri recentis salis  
 expertis § s. salis communis 3 i. misce, fiat cly-  
 ster. Forinsecus à corporis vacuatione calori-  
 fica ac dolorem leuantia fomenta adhiben-  
 da erunt, vt sunt sacculi ex floribus chamæ-  
 meli, anethi, meliloti, phlomi (tapsm bar-  
 batum nominant) seminibus lini & sceni-  
 greci, milio & furfure compositi. A qua etiā  
 calida, aut decoctum prædictorum medica-  
 mentorum, aut olea calida in vtre, vesica, vel

2. vict.  
 acut. 10.  
 clyster.

fomenta



vasculo adhibēda. Quinetiam vtiliter admo-  
uetur spongia magna mollisque iam dictis  
rebus intincta, & subinde expressa. Vestien-  
da verò fomenta sunt, vt eorum vis non cele Empla-  
riter euanescat. In hunc etiā vsum cōuenient sum.  
emplastrum, in eum modum composita. R. flo-  
rum chamemeli, verbasci (tapsum barbatum  
vocant) anethi añ m s. seminis lini, scenigræ-  
ci añ 3 iii. seminis anisi 3 i. farinæ hordei p.  
i. Bulliant in aqua vsque ad mellis crassitudi-  
nem. Dein adde oleorum chamæmelini, a-  
nethini, nardini añ 3 i s. Bulliant denuò, &  
addantur duo vitelli ouorum, croci 3 i. &  
fiat emplastrum. Post septimum diem, si eo. Curcubi-  
dem modo dolor persistat, cucurbita lateri ta.  
affigenda est, & cutis scarificanda. Manife-  
stissima enim in pleuriticis vtilitas ex cucur-  
bitæ appositione apparet. vulnuscula autem  
scarificati loci sale inspergenda, si egri susti-  
nere queāt. in aliis verò linteolū oleo made-  
factū ac sale cōpersum imponatur. Sequen-  
ti deinde à scarificatione die, optimum est  
rursus cucurbitā affigere, quò sanguis sanio-  
sus ex impactis vulnusculis extrahatur. Non  
negligat etiam medicus exhibere intra cor-  
pus ea quæ ad sputi facilem excreationem fa-  
ciūt medicamenta, vt sunt diapenidiōn, dia-  
tragacanthōn frigidum, saccharum viola-  
ceum, trochisci pectorales, adiectis etiam in-  
cientia. terdum loch & aliis in cap. de ruffi cōmemo-

h iiii



suppura-  
tionē iu-  
uantia.  
vnguen-  
tum.

ratis. Extrinsecus adhibenda medicamenta, quib. discutiendi inest facultas, ut sunt scœnigræcum, anethū, melilotum, hyssopus, & similia iam sepe commemorata. Quod si permutationis in pus signa appareāt, coadiuuare permutationem oportet. hoc aut simili vnguento: quod R̄ oleorū chamæmelini, amygdalarum dulcium, liliorum alb orū añ 3 iiii. butyri salem non experti, pinguedinis gallinæ añ 3 ii. mucī scœnigræci, seminum lini, althææ añ 3. ceræ quod satis est, fiat vnguentū. Ruptā phlegmōne, ea quæ extergent atq; purificant à pure ac sanie, exhibēda: ut est aqua mellis, aut decoctum bordei, aut sacchari rubei. Facta absterfione puris & saniei, glutinātia adhibenda medicamenta: de quibus omnib. in cap. de phthisi copiosè dicemus.

## DE PERIPNEUMONIA. CAP. VI.

causæ.

Peripneumonia est inflammatio pulmonis, cum febre acuta. Hæc plurimum ex valentibus in pulmonem destillationibus, aut angina, aut asthmate, aut pleuritide aliisve morbis cōtrahitur. Aliquando etiam ipsa inflammatio passionis origo est. Hunc affectum subsequitur difficultas spiritus, febris acuta & ardens, gravitas distensioque thoracis citra dolorē. quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, fuerint inflammata, etiam dolorem percipiunt. malæ in his rubent, na-



sus in summo fit simus, venæ temporum eleuantur, oculi intumescunt, prostratus est appetitus, linguæ adest siccitas: aquæ frigidæ, magis autem aëris frigidi cōcupiscentia, exspiratio calida, tussis sicca. si verò quid effertur, spumofum est ac biliosum, ampliùsque cruentum & floridum vehementer. Quòd ad cibum attinet, dàda est peripneumonici sorbitio ex ptisanæ cremore cum melle, organo aut hyssopo. magis enim quàm in pleuritide, extenuatoriis cibis opus est: chondrus etiam seu alica cocta ex aqua mulsa iis cōuenit. Potus exiguus sit quantitate, humiditas enim nocet pulmoni. Possunt virtutis tuédæ gratiâ, potissimū si suffocatio vrgeat, vti mulsa per se, & cum nucleis pineis: aut mulsa, in qua decoctū sit hyssopum, aut iris sicca aque mulsæ inspergenda. In vniuersum autem victus ratio eorum, qui peripneumonia afficiuntur, eadem ferè sit, quæ pleuriticorum. In iis, qui ex aliis morbis in hūc incidūt affectum, sanguinis detractio vitāda est, maximè si diu malum hoc durauerit, vel si per initia sanguinem miserint. Alius clysteribus ducenda, si egrè deicit: aut cucurbitulæ, vbi nihil obstat, thoraci & lateribus admouendæ sunt, eæque pergrandes & multæ, cute incisa. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuasit, cōfestim vena in cubito interna secanda est: & si sustinuerint vires, ex vtroque brachio san-

victus.

curatio.



Sputi e-  
ductio.

guis extrahendus: primum quidē modicus,  
& non vsque ad animi defectionem, vt vide-  
licet asseruetur ad repetendam extractionē.  
Si verò quid prohibeat venæ sectionē, cucur-  
bitulas certē vniuerso thoraci lateribúsq; af-  
figere oportet, iisque tantum sanguinis eli-  
ciendū, quantū vires patiuntur. Aut acri cly-  
stere alium cluere conuenit ex decocto ni-  
mirū hyssopi, iridis, rutæ, adiecta colocyn-  
thide, sale & aliis quæ suprà in cap. de Apo-  
plexia dicta sunt. Posthęc curādum, vt sputi-  
eductio quàm celerrimē & facillimē fiat. in  
quem sanē vsum ea quæ suprà in cap. de pleu-  
ritide memorata sunt, eclegmata, vnguenta,  
& emplastra conueniunt: tantum in eo diuer-  
sa, quòd hic omnia valentiora, & maiori ex-  
tenuādi facultate prædita esse debent. Con-  
uenient itaq; loch, decoctū hyssopi & iridis,  
oleum rutaceū, nardinūq; :ceratū ex oleis  
iā dictis, terebinthina, medulla ceruina, iride  
& hyssopo tenuissimē tritis confectum, tho-  
raci & lateribus impositum.

ἁιμο-  
πτόης.  
ἁιμόπτυ-  
σις.

## DE CRVENTO SPVTO. CA. VII.

Hæmoptoes aut rectiùs hæmoptysis, est  
sanguinis sputio seu reiectatio. Fit ex cau-  
sa interdum externa & manifesta, nēpe dela-  
psu ex alto, aut si grauiùs aliquod corp⁹ tho-  
raci inciderit, clamore magno aut frigore  
(nā id rumpere venas scribit hippocrates) &  
confimilibus: Nōnunquam ex occulta, veluti



plenitudine, aut oris venarū apertione, aut 6. Epid.  
earundē erosione. Venarum autē ora aperiū par 3.  
tur ob calidas dispositiones præcedentes, ve- Aph. 10.  
luti si calidis balneis plurimis vsus sit homo,  
habitētq; in calida regione, consimili existē-  
te maximē anni tempore, cibis quoq; & po-  
tionibus calidis vtatur. ipsa verò vasorū ero-  
sio ex acribus contingit humoribus, siue à ca-  
pite in pulmonem delabentibus, seu in ipso  
pulmone generatis. Porro sanguis modò ex  
thorace & pulmone, aut aspera arteria edu-  
citur: modò ex aliis locis, oris, aut gingiua-  
rum, aut faucium, aut columellæ, aut ventri-  
culo, ad quem ex venis ac partibus adiacenti-  
bus, iecore nimirum & liene, sanguis dela-  
bitur. Cause externe & manifeste, è sermo- signa  
nibus ægrotantis aut assidētū cognosci pos-  
sunt. Si ob plenitudinē accidit, tum cōfertim  
sanguis reiicitur: At si propter oris venę aper-  
tionē, tū ea quę diximus præcesserūt, & neque  
inflāmationes, neq; febres, neq; labores tor-  
quēt, sicut in iis euenit qui ob exesas venas sã  
guinē expuūt: sed cōtrā vacuati melius leuiūs  
que agūt, si verò ex venarū erosione cruentū  
sputū editur, nō confertim, sed paulatim san-  
guis reiicitur, & semp peius habēt. Ceterū sã-  
guis qui spumofus & subalbidus atq; ex iter-  
uallo cū tussi absq; dolore reiicitur, ex pulmo-  
ne fertur, si verò pituitosa cū tussi leuiore reii-  
ciātur, ex aspera arteria p̄dire scito. si ater sã



guis & in grumū cōcretus fuerit, dolorēq;  
in loco intendat, ex thorace educi significa-  
tur. si verò ex locis circa fauces aut columel-  
lam sanguis feratur, per excreationes excer-  
nitur: si verò ex aliquo loco oris aut gingi-  
narum, simpliciter expuitur. accidit autē nō.  
nunquam per palatū sanguinem educi, pro-  
pter hirudinem deuoratam, & alicui indidē  
particulæ adhærescentem. id quod localis do-  
lor qui concomitatur patientem particulam,  
& sanguis ipse qui tenuis est & serosus, osten-  
dēt: si ex stomachoeductio fiet, non magna  
sanguinis eruptio cōtinget, graciles enim sto-  
machi venæ: si verò ex iecore & liene san-  
guis in vētrem deferatur, aderit tumor: si au-  
tē à capite sanguis feratur, titillatio palati ac-  
cidit, & frequens excreatio, atque hoc modo  
expuunt. irritatur enim ad tussim, & tamen  
non valde tussunt. Sanguis etiam colore ni-  
ger est, mixtus cum aliquo pure vel pituita,  
& cum excreatione statim se in linguam in-  
fert rotundus, facileque reiicitur per sputum.

viētus.

Viētus ratio sit talis quę moderatam quan-  
dam adstringendi facultatem obtineat. vta-  
tur itaque oryza, alica, frumentaceis que aliis  
cibis, quibus succus mali granatorum, aut py-  
rorum adiectus sit. conuenient ex carnibus  
columbæ syluestres, turdi, perdices, si cum  
omphacio seu vna acerba, rhoe obsoniorum  
coquantur. Utendum etiam cotoneis, pyris,



pomis adstringētibus, moris rubi, & aliis supra in capite de Profluuiio sanguinis narium memoratis. Bibendum vinum crassum rubeū, aut pro eo aqua, in qua chalybs ignitus extinctus est. Cauendum ab iracundia, clamore, frequenti locutione & omni corporis motu.

Curadi ratio iuxta causarum diuersitatem variatur. Si enim à capite feratur sanguis, simplicior & exigua sufficit curatio: adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida, nisi quod defertur multum sit, curationem perficient. quæ sanè ex cap. de Colu mellæ inflammatione petenda sunt. Multum enim si à capite defluerit, euacuatione sanguinis per nares, aut venæ alicuius incisione opus erit. Qui ob destillationem sanguinem expuunt, his statim in principio venam incidere oportet, ac pro virium modo sanguinē detrahare. Clystere etiā adhibito aluus euacuanda. Deinde frictis quàm plurimum brachiis ac cruribus, extremæ eorū partes ligentur. Postea verò capiti raso medicamentum cui exiccandi & discutiendi facultas inest (quale est quod ex fimo syluestrium columbarū cōstat) imponendū. aliāque deinceps omnia, quæ destillationem reprimere & sistere possunt, de quibus suo diximus loco, adhibenda.

Qui ex pulmone sanguinem reiiciūt, ruptis scilicet venis, aut earundem oris patefactis, iis præcipiendum in primis, ne respirent val-

Curatio  
sanguinis à capite destillantis.

Curatio  
eorū qui ob destillationem sanguinē expuunt.  
Frictio.

Curatio  
eorū qui ex pul-



mone san dē, sonūmq; edant, & vt parum loquantur &  
guinem sileant. Incidere etiam statim venam oportet  
reiciunt. in cubito internā, ac sanguinis detractionem

bis aut etiā ter reiterare, paulatim reuellendi  
gratiā. Non enim euacuatione copiosa indi-  
gent tales, nimirum à passione ipsa euacuati.  
In hunc sanē vsum frictionibus extremitatū,  
& earundem cum latis linteolis constriptione  
& ligatura vtendum. Postquam hæc per-  
acta fuerint, primū quidem poscā dilutam  
& tepidam bibendam exhibere conuenit, vt  
si quis sanguinis grumus ī viscere hēreat, in-  
de dissolutus eiiciatur. neq; quicquam obstat  
bis & ter in tribus horis hāc potionē iterare.

Adstrin-  
gentia.

Post hæc autē, medicamēta adstringentia &  
obstruendi meatus vim habētia, intrinsecūs  
& extrinsecus adhibeātur. Per os quidē sum-  
pta proficiunt portulaca comesta, succus au-  
tem eius bibitus efficacior est: succus planta-  
ginis, polygoni, vix acerbæ, decoctū rhois  
(sumach appellant) gallę, corticis glādiū,  
radicis rubi, balaustiorum, seminis oxylapa-  
thi, radicis equiseti, & aliorum quæ in capite  
de Sanguinis ex naribus profluuio dicta sunt.

Ecleg-  
ma.

Vsus etiam sit huius eclegmatis, quod R̄x cō-  
seruæ rosarum veteris, rob dē ribes añ ̄ i. dia-  
tragacāthi frigidi, diacotone cōn simplicis añ  
̄ s. pulueris corallorum, lapidis hēmatidos,  
terræ lemnix (sigillatam vocant) añ ̄ ii. bo-  
li armenix 3 i. sanguinem draconis 3 s. ba-



laustiorum, thuris añ s. cum syrupo myr-  
 thino, quod satis est, fiat eclegma. Extrinse-  
 cùs thorax ex vino adstringente oleisque co-  
 toneorum, rosaceo, aut myrthino irrigan-  
 dus. Si verò multa sanguinis eruptio fiat, ma-  
 ximè in æstate, & citra ruffim eius reiectio-  
 nes contingant, neque debilis sit æger, sed  
 robustus & carnosus, acetum pro vino ad-  
 mouendum est spongiis exceptum. Pròde-  
 rit iam dictis òleis adicere bolum armeniã,  
 terram lemniam, corallo, & similia, ac cum  
 cera componere vnguentum quale infrà lib.  
 iii. cap. iii. describemus. Cataplasma quoque  
 ex palmulis (dactylos vocant) acatia, sym-  
 phyti radice, cortice mali granati, & len-  
 tium farina apparatus, adhibendum. Nec  
 minus cõfert quod ex carnibus malorum pu-  
 nicorum, thure, corallis rubeis, balaustis,  
 bolo armenia, terra lemnia, & eiusmodi cõ-  
 ponitur. Maximum enim hoc est, cui dilige-  
 ter animum attendere oportet, vt mox factũ  
 vasorum rupturã, & dum adhuc cruentum  
 est vulnus, concreseat priusquam inflamma-  
 tio apprehendat. Etenim si inflammatio præ-  
 uenerit, parum spei est ad huiusmodi vul-  
 neris conglutinationem, quippe quæ se in  
 multos dies extendit: eluere enim oportet tũ  
 pus tum serosum sanguinem ipsius vlceris,  
 posteaquam inflammatio fuerit soluta: reli-  
 quam autẽ curationẽ, quemadmodũ in ta-

Vnguen-  
 tum.



**Curatio** bidis fieri solet, ordinare oportet. Qui ab e-  
 eorū qui rosione sanguinem expuunt, iis primū quæ  
 ab erosio acres humores in pulmonem destillātes pur-  
 ne san- gare possunt, medicamenta exhibenda, vt in  
 guinem capite de Destillatione dictum est. Deinceps  
 expuunt. ea quæ alterare & incrassare acres & tenues  
 humores, atque adeò sistere destillationem  
 valent, vt est syrupus violarum, rosarū, myr-  
 tinus, miua cotoneorum, & alia quæ paulò  
 antè memorata sunt. In hūc vsum interdum  
 syrupū de papauere, & alia narcotica & stu-  
 pefacientia adhibemus. Destillatione cessan-  
 te, corrosæ partes cibus boni succi, & medica-  
 mentis carnem generatibus reficiantur. Por-  
 rō qui vomunt sanguinem, eādē victus ac-  
 curandi ratione, quæ antea dicta est, vtantur,  
 solā hac curā adhibita, ne crebrò cibum, aut  
 vomunt potum sumant. quippe facilè curatur, si auxi-  
 sangui- lia quæ bibuntur, particulis ipsis sanguinem  
 nem. fundentibus applicentur. At sanguine in vē-  
 triculi instar grumi concreto, coagulum po-  
 tandū est, maximè leporinum, vel thymbra  
 seu satireia cum aceto: vel ex aloë sic affecti  
 Curatio vacuari debet. Qui per palatum sanguinem  
 eorū qui excreant, gargarizabunt ex adstringētibus,  
 per pala- fronti que & capiti admouenda sunt quæ ex  
 tum san- naribus sanguinem fundentibus accommo-  
 guinem dantur. Porro postquā omnia, vt postulat  
 excreant. ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor sub-  
 stiterit, vires ipsis reficiendæ sunt, roburque



adhibendum. In primis autem cauendus frequens usus balnei, vini potio, ira & venus.

## DE EMPYEMATE. CAP. VIII.

Empyema, purulenta excreatio atq; suppuratio latinis dicitur. & empyici, hoc est, suppurati seu purulenti vocantur. Fit quādo abscessus in membrana intrinsecus costas succingente, aut aliqua alia thoracis factus acervatim rumpitur, & in vacuum thoracis locū effunditur inter pulmonem, & membranam costas succingentem. Interdum propter sanguinis eruptionem vlcere ad cicatricem non perducto, interim etiam propter cōfluxum ex capite & aliis partibus superioribus illuc manantē. ut in angina, iuxta hoc Hippocraticum, Quicumque ab angina liberantur, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus pereunt, si verò has effugerint, suppurantur.

ἐμπύημα.  
μα.  
ἐμπύημα.  
κόι.  
Causæ.

5. Aph.  
10.

Cognosces autē suppuratos hoc pacto. Gravitas adest thoracis, tussis valida siccaq; eum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quem relevari quoque videntur, febri- cula per initia affligit, languida, inordinata, & ad iudicandum difficilis. Postquam verò ruptura abscessus iam appetit, vehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermone conturbantur, offendūtūque spiritu. Rupto abscessu aliquid in profundo thoracis transfluere apparet, iuxta multiplices re- clinationis permutationes: & maximè quā

Signa.



ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdā sonitus sæpe sensibilibus in reclinacionibus ipsorum auditur. Pus etiā educitur, nunc purum, nūc fœculentum. Erumpunt autem suppurationes, aliquæ quidē sursum in vacuum videlicet thoracis locum, & hæ periculosiores existunt: aliquæ verò deorsum, & hæ quidem in aluum & intestina ac vesicam transfunduntur, per vasa quædā transmissione ad eas partes facta. Semper autem hæctica febris laborant suppurati, quoad sursum omnia fuerit educta. **Victus.** ratio suppuratorum talis sit. aërem inhabitet siccum. Cibis vtantur boni succi & cōcoctu facilib⁹, iure gallorū, carnibus gallinæ, pullorū, auiculōtarum: iure etiam cicerum cum herbis hyssopo, & oroselino, petroselinū officinæ vocāt. Potus sit aqua mulsa, aut vinū album ac tenue. Porro nisi in iis summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabem accersit. Primū igitur puris cōcoctio & digestio adiuuanda fomentis per spongas, cataplasmatibus & emplastris ex hordei, fœnigræci, & seminis lini farinis, caricis pinguib⁹, columbarū fimo, althæa, & resina modica cōpositis. Cerata etiam ex butyro, iride, baccis lauri & ruta cōfecta adhibenda, & alia quæ collectionē maturare & discutere possunt: qualia multa in capite de Asthmate



dicta sunt. Posthæc, si malū hand discutitur,  
 quæ abscessū rumpūt admouenda. Rupturā Rumpē-  
 autem promouet in latus sanū decubitus, sal-  
 torū esus, & catapotia illa dormituro data, sum.  
 quæ R pulueris hieræ picrę Galeni 3 i. pulpe  
 colocynthidis 3 i. cū succo absinthii fiāt pipu-  
 lā, quarū vna aut altera teneatur in ore. sic e-  
 nim æger expuere conabitur, ac nimium ex-  
 puēdo abscessus rumpetur. Ruptione facta,  
 diligēter animaduertēdum erit quò pus pro-  
 reptet. eius enim excretionē adiuuare oportet.  
 Quòd si ad aluū proreptat, magis emol-  
 lientia sint ea quæ offeruntur: Si verò ad ve-  
 sicā serpat, ea quæ vrinam magis cient, adhi-  
 benda: Si verò per tussim puris repurgatio  
 fiat, nihil cōuenientiū aut familiariū exhiberi  
 potest, quàm ptisana optimo melle per-  
 mixta. Possunt etiam ea abstergētia quæ par-  
 tim in cap. de pleuritide dicta sunt, & partim  
 subinde in cap. de Tabe dicentur, exhiberi.  
 Cæterū quæ vrinas cient, cibis cōmode ad-  
 miscētur, vndecūq; tādē puris excretio cō-  
 tingat. Ad puris verò repurgationē mirificē  
 utilis est aqua mulsā cū iride, & plurimā gly-  
 cyrhiza decocta. Radicis etiā dulcis succus  
 cōmanducatus prodest. conuenit etiā deco-  
 ctum hyssopi, iridis, marrubii, & similium,  
 quæ ex cap. de Asthmate petenda erunt. Por-  
 rò deinceps in curatione suppuratorum ne-  
 cessaria sunt, ea in sequent. cap. dicemus.



phthisis.

Causæ.

Signa.

5. Aph.

14.

5. Aph.

11. &amp; 12.

curatio

cur diffi-

cilis.

Victus.

Tabes quam phthisin etiã Græci appellât, propriè est corporis extenuatio, quæ pulmonis exulcerationem sequitur. Fit propter humoris acris & erodētis à capite in pulmonem defluxum: & quum puris aut sanguinis eruptio in suppuratis, peripneumoniacis, & pleuriticis cohibetur. Tabidi cognoscuntur corporis totius & carniū extenuatione, nares etiã iis acutæ, collapsa tempora, oculi concaui, spatulæq; instar alarum prominent. Tussunt quoque ac febre hectica feбриunt, difficulter spirant, genæ liuescunt, ungues curuantur, pallidique apparent. Malo vincente, venter turbatur, sitis ipsos magis conficit, capilli defluunt, & id quod per sputum reiicitur, vehementer foedi odoris est. Difficillimè autem curatur vlcerata pulmonis, propterea quòd citra tussim non repurgantur. Tussientibus autem vlcus dirumpitur, atq; quasi circuitu quodam malum reuertitur. Medicamentorum præterea vires ad vlcus, priusquàm in ventriculo permutentur, peruenire non possunt. Denique per respirationem pulmo semper mouetur, ac tussiendo lacinatur. Vt cunque autem difficilis sit curatio, tamen nihilominus conandum, vt vlceratio illa curetur. Primùm itaq; curandum, vt conuenienti victus ratione vtatur tabidi. Aërem siccum & in calore & frigore temperatū inhabitet.



Cibus illorū sit ptisana hordei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auium montanarum, perdicum, phasianorum, merularum, turdonum, gallinarum, caponum, vitulinae, ha-di lactantis: Pisces squamati, saxatiles, potissimum verò cancri fluuiatiles. Lac verò inter omnia cibaria tabidis optimum, primū humanum, dein asininum & caprinū, quod ex māmīs, si fieri potest, sugatur, aut statim mulctum dum adhuc calet bibatur, quemadmodum fusissimè Galen. lib. 5. Ther. meth. docuit. Animaduertendum tamen, ut statim à lactis vsus alius cibus, potissimum verò vinum nō sumatur, quod sic in ventriculo corrumpetur. Quod si tamen impensè febricitarent, putrida maximè febre, lactis vsus nō conduceret. Inter fructus profunt passulæ, amygdalæ dulces, nuces pineæ, ficus, palmulæ (dactylos vocant) pistacia. Exercitia & motus vehementes deuitent, suauiter tum ante cibum deambulare haud incommodabit à cibo penitus quiescant. Somno vtantur nocturno & mediocri. Fugiāt iram, tristitiā, vigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laconicū, & quicquid corpus exinanire potest. Potus sit vinum aquosum & tenue: aut si febris est vehemens, cinnamomi decoctum, aut Hippocras vulgo nominatum, cuius compositionem pete ex cap. de Resolutione.

Curandi verò ratio si à defluxu humoris Curatio.

i iiii



Glutinā-  
tia.

acris ex capite fit, à destillationis amolitiōe inchoanda erit, quam peculiari capite suprā docuimus: in præsentia, quæ vlcerationē pulmonis curāt, docebim<sup>9</sup>. In primis igitur, quæ abstergendi vi prædita sunt, & quæ, vt facile pus sursum feratur, efficiunt, exhibēda erūt. In quem vsum cōuenit hydromeli, decoctū hordei cum saccharo & melle. Item hyssopi, iridis, caricarū, adianti, & similia. Syrupus de hyssopo, prasio, & glycyrrhiza. Si febris accedit, semina frigida prædictis cōmisceri haud inutile erit. Extrinsecus admouēda emplastra & cataplasmata ex semine lini, fœno græco, & aliis in cap. de Empyemate memoratis. Ex cap. etiam de Asthmate multa remedia ad præsentem vsum conducentia petēda erunt. Absteriso iā & à pure purgato pulmone, ea quæ vlcera eiusdem glutinare possunt, medicamenta sunt exhibenda. commendatur in hunc vsum ab omnibus saccharum rosaceum, quod & abstergendi & glutinādi facultatem obtinet. abstergit autē magis recēs, glutinat verò antiquius. Mirificè etiam confert bol<sup>9</sup> armenia, sanguisq; draconis (appellatus) succinum coralli, se. portulacæ, & similia, quibus adstringēdi & glutinādi facultas inest. Prodest etiā loch de pulmōe vulpis, cōserua symphyti maioris & adiāti, vt & cōseruarum symphyti maioris, adiāti, hoc est, capilli veneris añ ꝑ s. sacchari rosacei ꝑ i. loch



de pulmone vulpis 3 ii. specierum diatraga-  
cathi frigidi 3 iii. boli armeniae 3 ii. cum syru-  
po de papauere. fiat eclegma. Cōueniet etiā  
is puluis quotidie exhibitus, qui R<sup>x</sup> se. papa- Puluis.  
ueris albi 3 v. gummi arabici, amyli, tragacā-  
thi añ 3 i s. seminum portulacæ, althææ, mal-  
uæ añ 3 ii s. seminum cucumeris, melonum,  
citrulli, cucurbitæ, cotoneorum añ 3 iii s. ebo-  
ris vsti, succi liquiritiæ añ 3 i s. penidiorū ad  
pondus omnium, & fiat puluis, de quo mane  
dētur quotidie 3 ii. cum syrupo de papauere,  
aut rosaceo. Hoc quoq; tēpore quo cicatrix  
obducitur, extrinsecus thoraci oleum myr-  
thinū, aut rosaceū adhibendū, adiectis inter-  
dū rhoë obsoniorū, hypocistide, malicorio,  
acatia, galla & similibus. Postremū corpus  
iusta & cōuenienti victus ratione reficiendū.  
in quē vsum mirificè confert hoc medicamē-  
tū quod R<sup>x</sup> pulpæ caponis § i. testiculorū gal vires re-  
li, nucū pinearū, pistationū, amygdalarū dul parantes  
ciū añ § s. specierū eclegmatis de gemmis 3 s. morsuli.  
specierū diarhodōn abbatis, diāthos, aroma-  
tici rosacei añ 3 i. santalorū alborū, cinamo-  
mi electi añ 3 s. maceris 3 i. sacchari candidi  
fimi lb i. dissoluti in aquis boraginis & rosa-  
rum fiat confectio in morsulis.

## DE CORDIS PALPITATIONE. C. X.

Cordis palpitatio est passio, quam alio Cordis  
nomine tremorem cordis appellant. Practi- palpita-  
carum verò, vt vocant, scriptores, perperam tio.



*καρδια* = cardiacam nominant. Cardiacæ enim ad sto-  
*μαχ.* machum, quem veteres olim cardiacam dixe-  
*καρδια* runt, pertinet, ut alibi copiosè monstrauimus.  
 Causæ. Fit ab omni eo quod cor præter naturam affi-  
 cere potest, ut est intemperies omnis, aut hu-  
 moris multitudo in ambiente cor tunica con-  
 tenta, aut tumor præter naturam, & alia quæ  
 à Galeno lib. 5. de patientibus locis cap. 1. re-  
 censentur. Dignoscitur faciliè de sermoni-  
 bus ægri palpitationem hanc euidenter sen-  
 tientis, & ex pulsu. In calida intemperie fe-  
 bris, & pulsus velox atque magnus existit: in  
 frigida, cōtrā. Si humoris multitudo in peri-  
 cardio contenta, palpitationem fecerit, pul-  
 sus est mollis & languidus. Victus ratio,  
 iuxta causas morbum efficientes variatur. In  
 calida, itaq; intēperie, aër sit mediocriter fri-  
 gidus: in frigida, mediocriter calidus. Qua-  
 propter ad eum modū, quē in doloribus ca-  
 pitis curādis exposuimus, instituatur. In vni-  
 uersum autem vitandum, quicquid spiritum  
 vitalem resoluit & conturbat: nimius æstus,  
 ira, fames, vigilia, coitus, frigus immodi-  
 cū, cibi mali succi. Si multitudo humoris in  
 ambiente cor mēbrana contenta palpitationem  
 procreauerit, tota diætā sit extenuato-  
 ria. Potus in calida intēperie sit vinum aquo-  
 sum & tenue, aut iuleb violarum, vel rosarum  
 aut decoctum buglossi, quod hodie borrago  
 dicitur. In frigida, vinum meracius bibatur.



Qui ob calidā intēperiē palpitatiōe corri- Curatio  
piūtur, iis per frigida, quē intēperiem corri- calidā ī-  
gere & corroborare possunt, succurrendū, vt tēperiei.  
ex simplicibus medicamētis sunt rosē, violē,  
nymphææ flores, santali, coralli, caphura, &  
similia. Ex cōpositis, diamargaritōn, diarho-  
dōn abbatis, saccharū rosaceum, violarū, bu-  
glossi, & carūdem herbarum succi & syrupi.  
Ex iis potiones, eclegmata & confectiōes  
pro vniuscuiusq; arbitrio componi possunt.  
Extrinsecūs admouēda vnguēta, emplastra:  
potissimū autem epithemata & sacculi, &  
alia quæ calidā intemperie alterare possunt.  
Tale itaque vnguentum componatur, quod  
℞ oleorum rosacei, violacei, nymphææ añ 3  
ii, corallorum rub. santalorum rub. rosarum vnguen-  
rub. añ 3 i. caphuræ gr. ii. ceræ albæ quod sa- tum.  
tis est, fiat vnguentum. Potest eo spina dorsi,  
aut cordis regio inūgi. Imponatur cordi hoc  
epithema quod ℞ aquæ rosarū, acetosæ, bu- Epithe-  
glossi, añ 3 iiii. aquarū melissophylli. 3 i. spe- ma.  
cierum cōfectiōis cordialis 3 i. santalorum  
rub. corallorū rub. añ 3 s. caphuræ gr. iiii. cro-  
ci gr. iiii. misce, fiat epithema. Vel fiat hic sac-  
culus qui ℞ florum buglossi, violarum, rosa Sacculus.  
rum rub. añ p. i. santalorū omnium añ 3 i. co-  
rallorum rub. & alborum añ 3 i. s. margarita-  
rum 3 i. Redigantur in puluerem, & cū seri-  
co fiat sacculus. Cæterum qui frigida cordis  
intēperie laborāt, iis prosunt ex simplicib⁹,



- ambar, moschus, crocus, lignū aloës, styrax  
gariophylli, macer, zedoaria, melissa, & simi-  
lia. Ex cōpositis, diambra cōfectio, diarthos,  
aromatici rosacei plurifarcoticon. Ex iam di-  
ctis varia remediōrū genera cōponi possunt  
haud secūs quā in calida cordis intēperie.  
cōuenit autē potissimū hoc vnguentū quod
- vnguen-  
tum.** R<sup>x</sup> oleorū de lilio, de spica, de croco añ. 3. ii.  
gallia moschata, alypta moschata añ 3 i. li-  
gni aloës 3 s. maceris 3 i. croci gr. iii. ceræ  
quātū sufficit, fiat vnguentū. Epithema quod
- Epithe-  
ma.** R<sup>x</sup> aquarum melissæ, maiorana, buglosi añ  
3 i. specierum diābra, diamoschi añ 3 s. ma-  
ceris, ligni aloës añ 3 i. ambrae gr. i. vini opti-  
mi 3 i. misce, fiat epithema. Sacculus qui R<sup>x</sup>  
florū melissæ, buglosi añ m i. cinamomi ele-  
cti, gariophyllorum, maceris añ 3 i. li. aloës  
3 i. corticum citri 3 i. s. croci 3 i. ambrae gr. i.  
Redigātur singula in puluerē & fiat sacculus  
cū serico vt suprā. Porro si ab humore aliquo  
in pericardio cōtento palpitatio oriatur, ex-  
tenuanti victus ratione, & venę sectione quæ  
in cubito est, curabitur, Gal. lib. 5. de patien.  
loc. cap. i. teste, qui ibidē sic scriptū reliquit:
- „ Palpitatio cordis pluribus integra valetudi-  
„ ne degentibus tum adolefcētib. tum adultis,  
„ subito sine alio manifesto symptomate eue-  
„ nire visa est, atq; omnes eos sanguinis detra-  
„ ctio iuuat. Nanque hoc pacto plerique perfe-  
„ ctē ab hoc symptomate liberati sunt: præfer-



tim qui utebantur & victu & medicamentis, „  
 quibus ineffet extenuandi facultas. Facile ita „  
 q; quibus ex iis Galeni verbis & quæ antea di-  
 cta sunt, curandi ratione instituit, ita ut diu-  
 tius in ea immorari superuacaneum putem.  
 Alij de igitur petant, quod hic omissum est.

## DE SYNCOPE. CAP. XI.

Syncope Galeno lib. 12. Ther. meth. auto. Syncope  
 re, præceptum est viriū lapsus. Fit ob plurimam Causæ.  
 sanguinis, aut ventris excretionem, motū ve-  
 hementem, dolorem ingentem, vigilias, om-  
 nem immoderatā inanitionem, timorem,  
 terrorē, & alias animi perturbationes, ob cru-  
 dorum denique humorum copiam, inflam-  
 mationis magnitudinē, vitiosos & erodētes  
 humores, auræq; foetidæ inspirationē. Co- Signa.  
 gnoscitur iis notis. Pulsus est rarus & obscu-  
 rus, extremarū partium frigiditas, sudor cir-  
 ca faciē, nitoris cutis eiusdē ablatio, & totius  
 quasi corporis resolutio. Notæ verò, quibus  
 causarum diuersitas deprehenditur, ex aliis  
 capitibus, quæ partim præmissa sunt, partim  
 verò deinceps sequentur, petendæ erūt. Ge- Curatio.  
 neralis curandi ratio nulla est, sed habet ferē  
 quævis causa symptomatis suam peculiare  
 curationē. Si enim propter sanguinis aut vē- Si pro-  
 tris excretionem, aut immoderatos sudores pter san-  
 & repētinas alias euacuationes fit syncope, guinis  
 frigidā faciē aspergere oportet, aut aquā excretio-  
 rosaceā. Extremitatē etiā corporis partes vincu- nem.



lis vehementer constringendæ, ac linteis modicè asperis fricandæ. Crura quidè, si suprà eruprio fiat: manus verò, si infrà. Cucurbitulæ quoq; pro diuersitate partiū, ex quibus sanguis erumpit, affigendæ. Os quoque aperiūdum, pennarum aut digitorum immisionet: auditorius autem meatus, & nares cōprimendæ, vt inspiratus aer interiora petēs, spiritum reficere ac excitare queat. Confestim etiam rebus odoratis animum reuocare conuenit. Nihil enim est Hippocrate in lib. de alimento, teste, quod vires odore citi⁹ reuocet. Prodest itaque, pullos gallinaceos assos ac per mediū discerptos, naribus ægrotorum admo- uere. Post hæc, iusculis concoctu facillimis, alendus ægrotus. vinū etiam huic tenue & dilutum exhibendū. Balneum alui tantū profluuiō conuenit, aliis minime. Cubiculi aer sit frigidus, stratis in pauimēto rosas, vitium palmitibus, rubis, quercus foliis, & huiusmodi adstringentibus. In immoderato sudore, exudantibus partibus oleum myrthinū, rosaceum, cotoneorum illinendum: in primis verò collū, thorax, loca sub alis & inguinibus. In hunc vsum etiam cōuenit amyllum, & thuris pollinē, candido oui excepta aliāq; adstringentia illinere. odoramenta quoque varia offerēda, rosæ, santali, poma cotonea, caphura, flores nymphaeæ, & similia. Extremas autem corporis partes non oportet vincire.



Si ob dolorē syncope fit, iis remediis quib. Si à dolo  
dolor aufertur, curabitur: quæ singula suis lo re.  
cis, potissimum verò in cap. de coli dolori-  
bus dicetur. Qui ob mœrorem, gaudium, Si ob ani  
& alias animi perturbationes syncope corri- mi affe-  
piuntur, ii cōtrariis curādi erunt, odoribús. tus.  
q; & aliis quæ per os sumpta spiritus recrea-  
re possunt. Si propter crudorum humorū co Si ex re-  
piam syncope corripiuntur, tum neq; sangui- dundātia  
nis missionem, neque purgationē sustinent, crudorū  
utpotē quos etiā sine his syncope subito ado humorū.  
riatur. Inaniendi itaque per frictionem erūt.  
Initio igitur morbi statim incipere oportet,  
ac primū crura à superiore parte deorsum,  
linteis non admodū mollibus, sed modicē as-  
peris: deinde & tota brachia ab humeris pa-  
riter ad infimas partes perfricanda. Vbi verò  
artus omnes abundē calidi videntur, & me-  
tus est ne quis ex ampla frictione lassitudi-  
nis sensus superueniat, oleo relaxāte vtendū,  
quale est anethinum, & chamæmelinū. Cū  
iam artus plurimū perfricueris, postea oleū  
detergetur. inde ad spinam dorsi transeundū  
est, hæc q; tota perfricāda similiter: ab hac rur-  
sus ad crura, & hīc ad brachia, ex inde rursus  
ad spinam remeandum, & ita toto die facien-  
dum: idque in splendido & minime humēti  
cubiculo, cuius aēr tēperatus sit. Porro mulla  
in qua hyssopum coctum fuit, his est aptissi-  
ma. Cauendūque, ne vel cibum vel sorbi-



tionem, vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsā trib. primis dūtaxat diebus, vt solū illud tempus intersit quod somno datur, qui certē mediocris sit. Si pulsus robore mediocri sit, ac magnitudine, considerata quę ad aluum spectāt: & si sua sponte commodē non deiiciat, clysteri securus ablue. accidit nāque post aquā mulsam, vt quę in primis venis, quę scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligūtur superuacua, commodē deiiciantur. Quod si iusto maior recrementorū impetus ad aluū citetur, mulsam amplius percoquere oportebit: ita enim minus subducet. Si plenius superuacua descēdant, nec sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua mulsā ptisanæ cremor est. Si verò fluere pergant, alicæ sorbitione nutries. Si ex pulsus imbecillitate vires quoque collapsas didicerimus, panē ex vino diluto exhibere conueniet: idque si nec venter, nec iecur inflammatione laboret. nam si hac infestentur, iam corpore crudis humoribus repleto, nulla planē medicina periculo liberat. atqui si quando crassi abundē humores deprehendantur, oxymeli pro mulsā cōtinuō exhibendum. Ergo si æstas sit, & æger frigidæ potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyems sit, calidū omnibus. Sanē balneum iis est aduersissimum, tum aēr ambiēs vel nimīū calidus, vel frigid⁹. Porro iis, quos



syncope iam premit, si partes modò comme-  
moratæ inflammatione vacet, panis exhibebi-  
tur modicus, isque ex vino fuluo, quod cele-  
rem in corpus digestionem adiuuet. et si estas  
adsit & cōstitutio calida, aquâ frigidâ vinum  
dilues: sin contrâ, calidam miscebis. Inde ad  
frictionē veniendū est, quæ pro tradito quo-  
que iam modo administrabitur. Verūm qui-  
bus ex flaua bili, quæ os ventriculi infestat,  
syncope incidit, iis frigida offerenda potio  
est: nōnunquā etiā vinū, quod calidū natura  
sit, fuluum colore, & substātia tenue. Qui te-  
nuum humorū vitio syncope premūtur, hos  
paulatim nutrire oportet, summāmq; cutem  
densare, & aërem cubiculi refrigerare. vngen-  
di sunt adstringētibus vnguētis: tum cibi iis  
dandi, qui nō admodum promptē diffuāt,  
vt est panis, sorbitiones alicæ, ouorum sorbi-  
lium vitelli, gallorum testiculi, & eiusmodi.  
vinum iis aquosum inter initia dandum est,  
sumptum à cibo. Si ob inflammationis magni-  
tudinē syncope accidat, artus fricādi & fo-  
uendi, manūsque ac pedes vincendi, vigilæ  
imperandæ. Quicunque verò propter vitio-  
sos humores erodentēsq; syncope corripun-  
tur, ii curādi sunt ad eum modum, qui infra  
de dolore stomachi exponetur. Qui exquisi-  
tam & pleniorē syncopes curādi rationem  
desiderat, is legat q̄ tradit Gale. lib. 12. Ther.  
methodi, & quæ infra cap. 4. libri 3. dicētur.

Synco-  
per iam  
premen-  
tis cura-  
tio.

Synco-  
pes ex fla-  
uabile cu-  
ratio.

Synco-  
pes ex te-  
nui hu-  
more cu-  
ratio.

Si ob in-  
flamma-  
tionis  
magni-  
tudinē.  
Si ppter  
eroden-  
tes hu-  
mores.



## DE LACTIS DEFECTV. CAP. XII.

- Causæ.** Lactis defectus accidit propter siccam mammillarum aut totius corporis intemperiem, propter sanguinis boni paucitatem, & quia infans imbecillis non probè ex mammis fugit. quanto enim plus sugendo ex illis adimit, tanto magis attrahitur. Notè quibus causarum diuersitas deprehenditur, notiores sunt quàm ut dici debeant. Sicca enim intemperies ex habitu corporis macilento, & aliis suprà dictis dignoscitur. Sanguinis boni paucitas, ex malo corporis habitu, & ex iis quæ præcesserunt corporis, mensium nimirum aut alui profluvio, exercitiis immodicis, inedia, & similib. inanitionib. Posthabito itaque lactis defectu qui fit ex intemperie sicca, quæ facile ex iis quæ suprà dicta sunt, & deinceps in ca. de Hætica dicetur, curabitur, de eius tantum qui ex sanguinis boni paucitate fit, curatione dicemus. In quo sanè primum sanguis est contemplandus, sic monente Galeno lib. 5. Simp. cap. 20. aut enim minor est quàm conuenit, aut deterior. Itaque qui minor est, vniuersam victus rationem exposcit humectantem & calefacientem mediocriter. Quæcunque enim plus quàm expediat calefaciunt, quæq; deficiant aut refrigerant, partim qualitatem ipsius sanguinis vitiata, partim ipsum minorem reddentia, lac prouenire prohibent. Dare itaque conuenit panem purum, lac, carnem vitulinam,



pullorum gallinæ, perdicum, hœdorum, oua  
 forbilia, pisces saxatiles & squammatos, pas-  
 fulas, amygdalas dulces, maluas, lactucā, bu-  
 glossum, melissophyllon, cucurbitas & eius-  
 modi. Bibendum vinum aquosum, tenue. Fu-  
 giendum immodicū exercitium, ira, mœror,  
 & omnia quæ sanguinem minorem efficere  
 possunt. Si verò deterior est sanguis, si qui- Curatio.  
 dem biliosus fuerit, primum purgationē de-  
 siderat biliosi humoris, mox victū quem mo-  
 dō diximus: Sin pituitosus, medicamēta re-  
 quirat excafacientia, aut primo aut secundo  
 ordine: non tamen desiccantia. hæc enim pi- Lac gene  
 tuitosos humores excafacientes in sanguinē rantia.  
 vertūt. Verū inter ea potiora sunt, quæ non  
 rātum sunt medicamenta, sed & nutrimenta:  
 velut cruca, fœniculū, anethum, apiū, sium  
 eaque virentia priusquam siccētur. Nam sic-  
 ca plus quàm oporteat & excafaciunt & de-  
 siccant. Quæ autem desiccant, humorem san-  
 guinis depascentia, crassiores simulque pau-  
 ciores efficiunt. Et si naturā quoque sint ca-  
 lida, iusto etiam calidiorem: sin frigida, fri-  
 gidiore. Debet enim esse modicè calidus, ac  
 neutiquā crassus, vt ex eo lac generetur. Pro-  
 inde quæ mediocriter excafaciunt, nullām-  
 que insignem adiunctam habent siccitatem,  
 lactis procreatricem facultatē obtinēt: inter  
 quæ, præter ea quæ dicta sunt, est sesamum in  
 vino decoctum. Item butyri recentis & i. cum



vino pota. Prætereà amygdalæ dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti. Laudatur etiam hoc ferculū, quod sic conficitur. R̄ orizæ decies ablutæ, exiccatae, & in puluerē redactæ q. s. coquatúr; in lacte optimo iuxta carbones ignitos, adiciatúr; inter decoquendum sacchari albissimi quod satis est, & fiat pulmentum. Fit præstantius, si addatúr amygdalæ dulces, pistacia, nuges pineæ, farina hordei, cicer, & eiusmodi. Annitendum etiam erit, vt cum leni frictione thoracis, & aliis medicamentis trahendi facultate præditis, ad mammas lac alliciatur.

DE LACTIS REDUNDANTIA. CAP. XIII.

Accidit vt interdum ob lactis redundantiæ mamillæ tumefactæ repleantur, & sic extendantur, vt copiam eius vix ferre queāt.

σταγυρ- Qui sanè affect⁹ Græcis Sparganosis dicitur.  
 νωσις. Fit à causa cōtraria, nempe boni sanguinis  
 Causa. copia. Visu tactúque deprehenditur. Suc-  
 Signa. currendum statim huic affectui, quòd aliàs  
 Curatio. metuendum sit, ne mammx inflammatione corripiantur. Inter initia itaque vena secāda poplitis, aut media quæ est in cubito. Dein vtendum iis quæ leuiter reprimūt, ne scilicet ad pulmonem impetu quodam trudatur sanguis: In hunc vsum proderit spongia, in posca madefacta, apposita, aut palmulæ (dactylos vocāt) cum pane & posca tritæ adhibitæ.



Cōuenit etiā apponere emplastrū ex oleo ro-  
saceo, santalis, coriādro, psyllio, portulaca,  
farina fabarū, lentium, plantaginis succo, &  
aceto, in hūc scilicet modum confectum. **Empla-**  
farinæ fabarum, farinæ lentium añ § i. portu-  
lacæ § i. sc. lini, althææ añ § ii s. plantaginis, co-  
riandri añ 3 ii. bulliāt in aqua, donec ad mel-  
lis crassitudinem redeant. dein addantur olei  
rosacei 3 ii. succi plātaginis, aceti añ § i. bulli-  
ant denuō, & adiiciantur ouorū vitelli duo,  
ac fiat emplastrū. Vel potest fieri ceratū, sic  
compositum. **Ceratū.** R. olei rosacei, myrthini añ § i  
s. farinæ lentii, farinæ fabarum añ 3 i s. men-  
tæ, rutæ añ 3 i. plātaginis, coriādri añ 3 s. cum  
cera & resina q. s. fiat ceratū. Erysimon etiam  
(quod rapistrū hodie vocāt) mirificè prodest  
cum aqua & melle illitū. Ricini etiā folia tri-  
ta, & apium vires illitū, nō modice profunt.  
Vniuersa deniq; vict<sup>9</sup> ratio talis sit, quæ pau-  
cum procreet sanguinem: adeoq; inedia non  
parum conferre in hac passione potest. **Victus.**

DE LACTE IN GRVMOS CON-  
VERSO. CAP. XIII.

Grumescit lac, & in casei formā transit in-  
terdum, quam passionē Græci Thrombosin, **θρόμβωσις.**  
quasi diceret grumescentiā, nominare solēt.  
Fit ob lactis abundantiam, quum scilicet ē  
mammis non fugitur: & deinceps à nimia ca-  
liditate quod in eo tenuium erat partium di-  
gesto, quod reliquū est, cōcrescit. Idem etiā



à frigiditate accidere solet: quæ ut concreascit  
 lac, nonnunquam efficere potest. Interdum  
 etiam lac ipsum suapte natura satis crassum  
 & glutinosum est, ut faciliè in grumos verta-  
 tur. Notæ lactis grumescenssatis mani-  
 festæ sunt, ex tactu enim, atque adeò relatio-  
 ne ægrotâti, statim dignoscitur. **Viſus.** Viſus ra-  
 tio iuxta causarum diuersitatem variatur. In  
 calida mammârû intemperie ad frigidum,  
 in frigida cōtrâ ad calidum declinet. Si pro-  
 pter crassitiē lactis accidit passio, extenuanti  
 prorsus diætâ utendum. **Curatio.** Quod ad curandi  
 rationem attinet, si redūdantia lactis fuerit,  
 nec in mamillis grumescat, ab adultis perī-  
 tisque mulierib. leuiter exugēdum erit. Mam-  
 mæ autem apii virentis, mentæ, vel fœnigræ  
 ci succo illinantur, aliæque quæ suprà in cap.  
 de lactis redundātia dicta sunt, adhibeantur.  
 Leporis autē coagulum ex aqua tritū, si illi-  
 natur, ad omnes mammârû tumores, & pas-  
 siones præcipuè lactis copiâ euenientes, con-  
 fert. Si nimia mammarum caliditas affuerit,  
 tunc portulacæ succus, & solani hortēsis illi-  
 nendi erunt. Item rosaceum cum aceto. Al-  
 sine etiam (morsum gallinæ uocant) illita, mi-  
 rificè confert. Benefacit etiam Cimolia terra  
 ex aceto, aut aqua, & oleo rosaceo illita. Len-  
 tes quoque in aceto coctæ & contusæ, illitæ  
 prosunt. In frigida intemperie, mammæ de-  
 cocto chamæmeli, fœnigræci, anethi, semi-



nis lini & fœniculi fouendæ. oleis etiam chamæmelino, anethino, liliorum alborum, & eiusmodi inungendæ. Cauendum tamen, ne papillam contingant. Fel bibulum illitū confert. medulla panis cum aceto illita prodest. potest adiici menta, aut apium, & fit medicamentum validius. Præter cætera hoc etiā valet, quod R<sup>x</sup> mellis ꝑ s. styracis calamitæ 3 iiii. fellis bubuli 3 ii. olei chamæmelini ꝑ i. myrrhæ, thuris añ 3 ii s. misceantur singula, & reducantur in formam emplastri, quod mammis imponatur.

DE INFLAMMATIONE MAMMARVM. CAP. XV.

Accidit interdū, vt aliæ inflammationes, *causa.*  
propter defluxū sanguinis copiosi & calidi ad mammas. Nonnunquam ob lac casei modo coactum, atque subinde suppuratum. *signa.*  
facile discernūtur: quod prior inflammatio iis quæ neque grauidæ, neque puerperæ sunt, accidat: altera verò, iam commemoratis duntaxat. In prima confestim sanguis mittendus *curatio.*  
ex cubiti vena interna, vel media eiusdem lateris, nisi mensium subesset retentio. tunc enim consultius est poplitis venam secare. Post hæc *adstringentia.*  
ad reprimentia veniendū medicamenta, quæ non oportet esse valida, ne ad interiores corporis partes nobiles humorum impetus tradatur: aut aliqua, quæ discutere possūt, iis miscenda. In hunc itaque vsum conuenit oleum



rosaceū cum succo solani, aceto, & decocto  
 chamæmeli, linteis in iis madefactis, & im-  
 positis mammæ. Valet etiam emplastrum ex  
 farina hordeacea, semine lini, santalis, bolo  
 Discutiē- armenia, adipe porcino, & oleo rosaceo con-  
 tia. festum. Quod si reprimētia medicamenta  
 non contulerint, ad ea quæ discutiunt, statim  
 veniendum est. Cōuenit itaque adhibere hoc  
 Empla- veniendum est. Cōuenit itaque adhibere hoc  
 strum. emplastrum, quod R̄ farine fabarum, farine  
 fœnigræci, seminis lini añ p. r. meliloti, cha-  
 mæmeli añ 3 ii s. medullæ panis triticeī ʒ s.  
 myrrhæ 3 ii. Bulliāt in aqua sufficienti vsque  
 ad mellis crassitudinem, dein addantur olei  
 chamæmelini, anethini añ ʒ i s. & bulliāt ite-  
 rum, dein adiciantur vitelli ouorum nume-  
 ro iii. croci 3 i. & fiat emplastrū. In hūc vsum  
 lini semen, vel fœnumgræcum in oxymelite  
 decoctum illini potest, & alia quibus discu-  
 Matura- tiendi facultas inest, de quibus iam sæpe di-  
 tio. ctum est. Quod si vero spes discutiendi subla-  
 ta fuerit, maturatiōe auxiliabimur, quæ hoc  
 Cataplas- cataplasmate perficietur, quod R̄ maluæ, fo-  
 ma. liorū althææ, violariæ, chamæmelini añ m i s.  
 radicis althææ ʒ i. bulliant in exigua aqua ad  
 mollitudinem vsque, dein contrundantur, &  
 fiat cataplasina. Vel formetur emplastrū ex  
 semine lini, fœnigræci, caricis, radicibus al-  
 thææ & liliorum alborum, adiectis oleis cha-  
 mæmelino & liliaceo, adipib. porci, gallinæ,  
 Ruptio. & similibus. Suppuratione facta, mammillæ



ruptionem sectionemve tentabis, idque medicamentis aut ferro. Medicamenta suppurationes mammas rumpentia sunt, fimus columbinus, fermentum cum pulvere cantharidum, calx viua cum fimo anserino. Si ferro potius uti placuerit, locus prope pupillam lunari sectione accuratissime incidendus erit, ut incisione abscessus quidem profunditas denudetur, sed pupilla cōseruetur. curatio reliqua talis erit, qualis reliquorum vlcerum. Si ob lac coactum inflammatio accidit, tunc vtendum per initia est spōgia molli egelida posca imbuta, expressaque loco fasciis superaccommodetur. item palmule (dactylos nomināt) cum pane & posca trite imponendæ. vel vt edum est ouo toto, cum rosaceo. medulla etiam panis, adiectis myrrha, croco, mēta, & aliis quæ in capite de lactis redūdānita dicta sunt, imponenda. Deinceps si illa nō cōtulerint, reliqua ordine (vt iam commemoratum est) adhibenda erunt.

LIBRI SECVNDI FINIS.

κ ιιι



LEONHARTI FVCHSII DE  
MEDENDIS SINGVLARVM  
corporis humani partium, à sum-  
mo capite ad imos vsq; pe-  
des, passionibus,  
Lib.III.

DE IMBECILLITATE VEN-  
TRICVLI. CAP. I.

causæ.

ENTRICVLI imbecillitas  
ex quacunque intemperie ob-  
V oritur, nullis humoribus vitia-  
tis. Fit etiã ex humore in ipso  
sinu vētriculi cōtento, qui aut

signa.

calfaciendi, aut perfrigerandi, aut humectā-  
di, aut siccandi, aut etiam horum aliqua per  
coniugationem efficiendi naturā obtinet: in-  
terim verò & in ipsas ventriculi tunicas im-  
bibito & impacto. Nudam qualitatem cali-  
dam testantur, sitis vehemens, cibi fastidium,  
nidorosique ructus: Frigidam cōtraria indi-  
cant, modica sitis, immodica appetentia, aci-  
di ructus. In humida, nulla vel exigua saltem  
sitis egrum affligit, saliuę copia adest: in sic-  
ca, linguę siccitas, corporis extenuatio, sitis  
vehementissima, saliuęq; paucitas. Copiam  
autem humorū nausea, vomitus, grauitas vē-  
triculi, & ructus à cibo potis imū ostendunt:  
& si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bi-  
lis vomitus, sitis, ruct⁹ nidorosi, vētriculi mor-



sus aderunt: Sin pituita, nulla ventriculi ero-  
 sio erit, ructus acidi, sitis nulla, tensio ventri-  
 culi. Si ab atra bile, tristitia & metus, ructus  
 & excreatio foetida, pisces olens. *Curatio curatio.*  
 intemperierum per contraria fit. intemperie  
 enim calidam refrigerare oportet, frigidam  
 calfacere: siccam humectare, humidam sicca-  
 re. Similiter verò etiam compositas intempe-  
 raturas aut calfacere & siccare, aut humecta-  
 re & calfacere, aut refrigerare & humectare,  
 aut siccare & refrigerare oportet. Calida ita-  
 que intemperie affecti, refrigerante victu cu-  
 rantur, præcipuè qui ex aceto assumitur. Pa-  
 nis igitur posca imbutus sit. pullis gallinarum,  
 perdicibus, carnibus vitulinis cum aceto aut  
 omphacio decoctis utendum. lactuca denique,  
 portulaca, & similibus herbis, pomis, & py-  
 ris acidis. Bibenda aqua frigida, aut vinum  
 aquosum. Frigida intemperie laborantes, co-  
 trariis medicari oportet, anisi, rutæ, petroseli-  
 ni decocto. Cibi odoramentis, cinamomo,  
 calamo odorato, pipere & similibus condi-  
 tur. Danda etiam compositio dia triaon pipere  
 nominata, & theriaca. Vino utendum veteri,  
 & subadstringenti. Humide remedia sunt, ci-  
 bi qui citra valentem calefactionem refrige-  
 rationemve siccant. præterea consuetæ potio-  
 nis parcitas. Siccam curabis instar hecaticæ,  
 de qua suo loco dicemus. copiosissimè autē  
 Galen. eius curationē, ut etiam reliquarum in-

calidæ in-  
tempe-  
rici.

Frigidæ  
intempe-  
rici.

humidæ

Siccæ.



temperantiam ventriculi, prosequitur lib. 7.

**si ventri-** The. meth. ex quo ea quæ hic desiderantur,  
**culi im-** petenda erunt. Cæterum si humor aliquis ca-  
**becillitas** lesfaciendi vel refrigerandi vim obtinens vē-  
**accidat** triculī imbecillitatem effecerit, diligenter cō-  
**ab humo** siderandum erit, an humor is in sinu seu am-  
**re.** plitudine ventris innatet, an eiusdem tunicis  
 impactus sit. Si in sinu continetur, & biliosus  
 fuerit, per vomitum statim expurgādus erit.

**Bilioso.** Facilem verò vomitum reddit aqua calida,  
 vel malsa dilutissima bibita. satius fuerit, si  
 ante hæc, humectantia exhibeas, veluti pri-  
 sanæ cremorem, aut lutea ouorū. Sin in vētri-  
 culi tunicis est receptus humor biliosus, hic-  
 rā picrā alius purganda erit: qua sanè Gale-  
 no ubi suprā teste, nullum aliud medicamē-  
 tum ad vitiosos humores qui in vētriculi ha-  
 bentur tunicis, præstantius inueniri pōt. Hu-  
 more vacuato, victu vtantur eodem, quo qui  
 calida intemperie affliguntur, vti debēt. Ex-  
 hibendæ etiam cōseruæ, & confectiōes re-  
 frigerantes. Extrinsecūs ventriculo adhibean-  
 tur refrigerantia, & mediocriter adstringen-  
 tia, vt est oleum rosaceum, cotoneorum, adie-  
 ctis satalis, balaustis, corallis & caphura. In-  
 frigidantiū tamen mediocris semper vsus sit,  
 iuxta præsentis intemperiei contrarietatem.  
**Pituito-** Nam immoderatus horum vsus, non modò  
**fo.** non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem mor-  
 bum efficit. Si verò pituitosi, aut crassi & glu-



rinosi humores amplitudini ventris innatet,  
 oxymelite vtendū est, in quo ex incidētibus  
 & extenuatib<sup>9</sup> quedā sint decocta: verbi gra-  
 tiā hyssopus, iris, origanum, satireia, & mar-  
 tubiū: Sin tunicis ventriculi impacti fuerint,  
 tū prius exhibēda quæcunq; lentam hāc pi-  
 tuitam dissecent, pōst deinde purgādū. Qua-  
 lia verò hęc sint medicamenta, capite 8. lib.  
 primi diximus. Est autem & ad illorum hu-  
 morum purgationē non inutilis hiera picra,  
 victus ratione extenuante vtendū. cōfectio-  
 nibus item calidis diatriōn pepercōn, dia-  
 galanga, diacinamomi, diambra, zingibere  
 cōdito, diacori, & similibus. Extrinsecus ad-  
 hibenda sunt olea calefaciētia, quale est nar-  
 dinum, de mēta, de absinthio, mastichinum,  
 & alia eadē facultate prędita. In hūc sanē vsū  
 cōmēdantur cerata, quę vulgus medicorum  
 hodie scuta stomachalia nominat. Hęc in cū  
 componātur modū. R<sup>x</sup> cinamomi selecti, ga-  
 riophyllorū, pīperis longi añ 3 i. galliæ mo-  
 schatæ, maceris añ 3 s. calami aromatici, thu-  
 ris añ 3 i. ligni aloës 3 i. mētę 3 ii. mastichis,  
 ladani añ 3 i. s. oleorū mastichini, nardini añ  
 3 s. cū cera & refina quod satis est, fiat scutum  
 stomachale. Aut R<sup>x</sup> mastichis in puluerē reda-  
 ctę 1 s. spargatur per coriū scuti formam ha-  
 bens, & affundatur oleum nardinū. Dein ad-  
 moueantur igni quoad liquecant singula,  
 & inspergatur cinamomi selecti, nucis mo-

Scutum  
 stomachi



schata, gariophyllorum in puluerem redactorū añ 3 i. & stomacho admoueat̃ur. Quid corrobora-  
 tia ventriculū. multa? medicus hec & alia ventriculum roborantia adhibeat, qualia sunt mēta, absinthiū, thus, mastiche, cinamomum, acorus (galāgā hodie vocant) zingiber, gariophylli, macer, lignum aloës, calamus odorat⁹, & similia, ex quibus variæ medicamentorum formæ componi possunt.

DE INFLAMMATIONE VENTRICULI. CAP. II.

**Causa.** Vētriculi inflammatio haud secūs quā aliarum corporis partium fit, à confluxu sanguinis copiosi & calidi. Hanc testātur dolor immensus, assiduus, & qui nullus medicamentis admotis mitigari potest, tumor, æstus qui tactu diiudicari possit, febris, grauitas & nausea.

**Signa.** Viçtus ratio perinde atq; in aliis inflammationibus sit tenuis. vtendum ptisanæ cremore, abstinendum à carnibus, vino, & aliis cibis calidis. Bibat decoctum cinamomi, aut succum malorum granatorum acidorū, aut aliorum fructuum frigidorum. Parum loquatur, & dormiat. Fugiat tristitiam, & versetur in aëre mediocriter frigido.

**Curatio.** Curandi ratio à sanguinis missione auspicanda, modò plenitudo corporis, & virium robur absint. Incidenda autem vena cubiti interna, & pro virium robore sanguis detrahendus. Posthæc ea quæ adstringunt ac reprimūt, foris vbi do-



lor & tumor maximè apparèt, sunt imponē-  
da. Conuenit in hūc vsum oleum, in quo ma-  
lum cotoneum decoctum sit, admixtā simul  
mastichē, apponere: item succum cotoneorū  
aut pyrorum, adiecta farina hordei, rosarū ru-  
beis, santalis, bolo armenia, & similibus, in  
hunc modum. R<sup>x</sup> Farinæ hordei ꝑ i s. santalo-  
rum alborum & rubcorum, rosarum rub. añ Puls.  
3 ii. boli armenia 3 i s. cū succis lactucæ, por-  
tulacæ, & rosarum, redigantur in formā pul-  
tis, aut emplastri. Quòd si maiori adstrictio-  
ne opus fuerit, addendum aliquid erit de suc-  
co omphacii (agrestam vocant) aut hypocy-  
stidis, aut rhois, sumach appellant. Hæc o-  
mnia, si vehemens sit inflāmatio, actu frigi-  
da sunt admoenda. Quòd si aluus nihil de-  
iiciat, clysteribus leuibus irritāda erit. Neq;  
temerè faciet, qui æstus vehementia paululū  
remissa, casia fistularis ꝑ s. intybi domestici  
succo dissolutam exhibebit. Hoc etiam tem-  
pore cum adstringentibus medicamētis, quæ  
extrinsecus adhibentur, aliqua quibus discu-  
tiendi inest facultas, permiscēda erunt: vt est  
farina scenigræci, flores chamæmeli, semen  
althææ, lini, & eiusmodi. Imo cum etiam ni-  
hil amplius affluit, nec repelli quod in labo-  
rante particula continetur, potest, solis discu-  
tientibus medicamentis vtendum: sed sem-  
per adstringētia, quæ robur illius seruāt, ad-  
miscēda. Id quod Galen. lib. 13. ca. 10. Ther.



LEONHARTI FUCHSII

Empla-  
strum.

meth. copiosimè docet. In hunc sanè vsum hoc cōueniet emplastrū, quod R<sup>x</sup> Farinę semi-  
nis lini, fœnigræci añ ʒ s. seminis anethi 3 ii.  
florū chamæmeli, meliloti añ 3 iii. absinthii,  
balaustiorum, rosarum rub. añ 3 ii. hypocisti-  
dis ʒ ii. oleorum chamæmeli, liliorum albo-  
rū, rosacei, mastichini añ ʒ s. axungię galli-  
næ, anseris añ 3 ii. misce, fiat emplastrum. An-  
te illius appositionem, ventriculi regio hoc

Vnguen-  
tum.

vnguento inungatur, quod R<sup>x</sup> oleorum, cha-  
mæmelini, anethini, cotoneorum, añ 3 iii.  
pulueris radicis althææ, absinthii, se. lini, añ  
ʒ i. ceræ quod satis est, fiat vnguentum.

DE APPETITU CANINO.

CAP. III.

Caninus  
appetit<sup>9</sup>.

Caninus appetitus contraria est amissio-  
ni appetitus passio. plures enim cibos appe-  
tunt sic affecti: atq; quum appetitum cohibe-  
re nequeant, in ingerendis cibis modum ex-  
cedunt: deinde multitudine eorum grauati,  
& assumptos cibos citra nocumentum ferre  
non potentes, ad vomitum diuertunt. postea  
rursus cibo se explentes, rursus ad vomitum  
reuertuntur, quēadmodū canes: vnde etiā ap-  
pellationē malū hoc accepit. Fit propter fri-  
gidiorē vētriculi tēperaturam, vel ob acidos  
humores os vētris mordētes & irritātes. qui p-  
pe frigidi humores vitiiati, rosionem quæ su-  
ctiōni proportionē respōdeat, inducūt, ci-  
borūque appetentiā excitant: vel propter to-

Causæ.



tius corporis, quod æquo rarius & calidius  
 est, immodicā dissipationē, Galen. lib. 1. cap.  
 7. de Symptomātū causis teste. Frigida vē-  
 triculi intēperies ex deprauata concoctione, Signa.  
 inflatione, fluctuatione, murmure, ac egestio-  
 nibus multis deprehenditur. Acidi humores  
 ex rictu acido, multaq; egestionē & liquida  
 admodū cognoscuntur. Immodica dissipatio  
 ubi causa fuerit, tū vētris egestionē lōge pau-  
 ciores procedunt, q̄ pro eorum quæ ingerū-  
 tur modo ac proportionē. Et quæ egerun-  
 tur, sicciora existunt. Frigida intēperies cu-  
 ratur ad eū quē suprà diximus modū. Curatio.  
 si verò ab humoribus acidis ori vētris impa- Acidorū  
 ctis hæc fiat passio, hiera picra Galeni exhi- humorū.  
 benda erit, quū ea, ut suprà cap. 1. eiusdē libri  
 cōmemoratū est, ad vitiosos humores vētri-  
 culo impactos educendos præstantissima sit.  
 Aut si amaritudinē eius abhorruerit æger, in  
 catapotia digestū exhibe. Et si pituitosi fue-  
 rint humores, prius, quæ diffecant calefaciūt.  
 q; deuorāda dabis. Neq; etiā temere tum al-  
 lia, porrū, satureiā, organū, pulegiū, & quæ  
 his similia existūt, cibis permiscebis. Vacua-  
 tis vitiosis humoribus, ea tandem victus ra-  
 tione utatur. Panis non sit recens, neq; be-  
 ne fermentatus. Cibi sint pingues, & oleosi. Vetus.  
 Sorbitiones itaq; conueniūt, quibus mel &  
 oleū plurimum, gallinaceus adeps aut buty-  
 rum adiectū est. Ex oleribus malua. Cerebel



la, item & pinguiore volucrum partes, pisciumque eodem modo & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta modicè alunt. Vinum bibant colore fulvum, substantia tenue, odorumque, & nulla adstringente sapore præditum. Hoc etenim ventriculum excalfacit, & humorum destruit acorem, ut sæpe solum suffecerit cum pinguibus & oleosis cibis ad perfectam curationem. Exhibendum autem tam ieiunis quam cibo sumpto, etiam si nondum sitierint. ieiunis autem calidum sanè, aut certe tepidius. Abstinere autem oportet ab omnibus acidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maximè verò à fructibus. Bellaria tamen eorum sint, pistacia, amygdalæ, nucsque pineæ. Lac etiam ipsis exhibendum, tum per se, tum cum melle: ita tamen ut vitemus in eis, quibus in stomacho acescere consuevit. in his enim maius nocumētum, quam utilitas consequetur. Probè verò concoctum, non solum appetitum obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesque eius sistit. Apparandæ etiam ex ipso lacte potiones & placentæ, ut sunt dulciaria: & oryza cum lacte decocta exhibenda. Lauare quoque per intervalla oportet, cuticulamque ipsorum largè cum oleo pinguefacere. Ac isto curationis modo tantisper, dum à morbo liberetur æger, utendum. Si verò ex immodica dissipatio-



ne caninus appetitus oritur, tunc eorum qui Si ex im-  
 hoc modo patiuntur, cutem densare & spif- modica  
 fiores reddere conuenit, cum oleo ex imma dissolu-  
 turis oliuiis expreffo, aut rofaceo, aut myrthi tione.  
 no, aut alio in quo quippiam adstringens ad  
 lentum ignem decoctum fit. Quinetiā opti-  
 ma ratione æger in aëre frigido ac perspira-  
 bili versabitur. Abstineat autem ab aëre cali-  
 do, cōsimilibusq; balneis, ac vini potu, & ab  
 omnibus quæ tum extrinsecus tum intrinse-  
 cus calefacere possunt. Potui autē detur aqua  
 frigida, aut cinamomi decoctū. Ducatur æ-  
 ger ad lauacrum frigidum, si quidē nihil id  
 fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas,  
 aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax  
 nimirum, aut alia quædam. Cibi ei exhiben-  
 di stabiles, & ægrè corruptibiles, ut sunt car-  
 nes suillæ in vigore existentes, maximè verò  
 ventres. Bubulæ quoq; pinguiore, & omnia  
 simpliciter pingua, & quæ ventri innatant,  
 tardèq; concoquuntur ac distribuuntur. Sūt  
 enim hi (quādoquidē ipsis natura inest acris  
 ac mordax, & ut quispiam dixerit, febriculo-  
 sus calor) ex corū numero qui minori nego-  
 tio bubulas carnes ac alia cōcoctu difficilia,  
 quàm saxatiles pisces similiaq; cōcoctu faci-  
 lia cōficiunt, ut fusius in præfatione libri pri-  
 mi de Alimentis Galenus docet. Ex ouis, ea  
 quæ coquēdo sunt indurata, aut sartagine fri-  
 xa conueniunt. Panis sit nō fermentatus, iu-



sculâq; pinguia. Oryza cum butyro decocta  
 dâda. Iuxta proportionē autē quātum malū  
 imminuitur, tātū ex crassi humoris cibis est  
 detrahendū, & ex adstringētibus forinsecūs  
 admotis imminuendū. Aliquando enim se-  
 data vehementis appetitus accessione, quum  
 corpus ex crudis & crassis humoribus reple-  
 tur, in aliud grauius malum transitio cōtin-  
 git. Inter adstringētia verò, præter ea quæ an-  
 teà dicta sunt, & huic vngueto locus sit, quod  
 vnguen- R. olei rosacei ꝑ i. oleorū myrthini, cotonco-  
 tum ad- rū, añ ꝑ s. succi plātiginis ꝑ ii. santalorū rub.  
 stringēs. mastiches, bistortæ, rosarum rub. añ ꝑ i. boli  
 armenix ꝑ ii. hypocistidis, acatiæ, sanguinis  
 draconis añ ꝑ i. cere quod satis ē, fiat vnguētū.

## DE BULIMO. CAP. IIII.

Βούλιμος  
 causæ.

Signa.

Curatio.

Bulimos ingens Græcis vehemensq; fa-  
 mes dicitur. B̄ enim particula aliis vocibus  
 adiecta, significationē earum auget. Fit ex  
 ventriculi frigidityte indigentiaque, ac viriū  
 imbecillitate, & ferè in totum ab externo fri-  
 gore initium capit. Peregrinationes enim &  
 itinera longa, maximè per niuem facta, affe-  
 ctum hunc inducunt. Deprehenditur facilè.  
 In principio siquidē fames multa adest, quæ  
 tamen nō vsquequaque perdurat. Nam post  
 ea repēte animo linqūtur, cum externarū  
 partium refrigeratione, & spiritus defectio-  
 ne. Curatio huic malo statim adhibenda,  
 quòd sint qui in locis desertis, aut in balneo,



hōc ipso correpti, ex instanti, auxilii, faculta-  
te destituti, perierint. Hi itaq; qui in itinere,  
aut aliàs fame magna citra febrē infestātur,  
aceto aut pulegio ad odorādū exhibito, aut  
terra quæcūq; tādē obrigerit aceto cōsper-  
sa, aut malis, aut pyris, aut aliis similibus fru-  
ctibus qui ad manum fuerint, refouēdi sunt.  
Auxiliatur & panis recens naribus admotus,  
caseus boni odoris, caro suilla assata aut co-  
cta, & in vniuersum omne quod multū alit,  
maximē verò quod nidosorum ac probē cō-  
ditum, sufficientēq; odorem habet. Per hu-  
iusmodi enim odores tales vt plurimum re-  
focillantur: quādo nihil sit, vt diximus cap.  
i. libri secundi, quod odore citius vires refi-  
cere possit. Extremæ etiā eorū partes fasciis  
constringendæ sunt, manuūq; ac pedū sum-  
mitates calidæ aquæ feruentiori imponendæ,  
ipsique tum maxillarum punctura, tū capil-  
lorum ac auriū vellicatione excitādi. Reuo-  
catis verò iam ab exolutione, panē ex vino  
diluto, aut aliud quippiam eorum quæ acer-  
uatim vires reparare possunt, offeres: velut  
sunt oua sorbilia, halica cum vino. Cōpen-  
diosissimū enim auxiliū ex cibo sperare pos-  
sunt: quē etiā si oblatū acceptare non queāt,  
ori indere oportet violenter, cogerēque vt ip-  
sum trāsglutiāt. cūestigio enim à fame, & ab  
animi deliquio liberantur, & celeriter exci-  
tantur. In hunc etiam vsum cōueniunt con-



fectiones ex odoramentis variis composita, ut est aromaticum rosaceum, diambra, dianthos, diamoschi, alipta moschata, & similes pastilli. Quod si in febribus (quod tamè raro accidit) bulimos inuasit, atq; circa exacerbationum declinationem eius accessio irruerit, intrepidè cibi sunt offerendi. Si verò in principio accessionis, aut in vigore apparuerit, per odoramenta ab initio dicta reuocandi sunt ægri, maximè per ea quæ sunt frumetacei generis, velut est panis calidus nidore adhuc emittens, & similia. Frictio etiam partium extremarum adhibeatur, & cataplasmata ex palmulis (dactylos nominant) aut malis cotoneis, in vino decoctis. Atq; hæc usque ad remissionem facere oportet, ut opportunè cibum offerre liceat. Quod si ex his nihilo melius habeat ægri, audendum est per ciborum ingestionem auxilium afferre. Cremorem itaque ptisanæ, aut buccellas unam atque alteram vino albo & tenui madefactas exhibebis. His enim refocillati ac respicientes ex improviso, deinceps usq; ad remissionis tempus perveniunt. Quod autem liceat in accessione ipsa ægrotantes nutrire, pereleganti historia ostendit Galen. lib. 10. Ther. meth. cap. 3. ubi multa ad institutum nostrum faciètia offendes.

## DE INFLATIONE VEN-

## TRICULI. CAP. V.

Causæ. Inflatur ventriculus ex flatibus in eo ge-



neratis. Generantur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in vapores p mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas hoc nomine, quòd extenuare ac dissolvere nō sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cū non tātum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit. Mediocris verò caliditas dissolvit quidem, & transmutat cibos, nō tamen perfectè conficit: vnde sanè flatuum generatio cōtingit, vt fusius Galenus lib. iii. de Sympt. causis cap. 7. docet. Accedit sic patientibus ventriculi grauitas, & distentio: aliquādo autem & tumor, ac eminentia quædam circa os ventriculi, & ipsum adeò vētrē efficitur, ructusque inanes fiunt modicè alleuantes, inhibitiōque flatuū, qui per aluum excerni consueuerunt. Vltrà hæc vehemēs difficultas spiritus ob septi trāsuersi cōpressionem adest, vt aliqui nō dissimile quiddā suffocatiōi se perpeti existiment. Leuantur autem cibo infernè subeūte, & flatibus siue per ructus siue per intestina exclusis. Murmura denique intus audiuntur.

Signa.

Si itaq; ex cibis pituitosis generatur ventriculi inflatio, victus ratione extenuāte vtendū erit, & medicamentis iis quę in cap. i. huius libri dicta sunt. Sin ex mediocri caliditate orta inflatio fuerit, cibis vtendū erit cōcoctis facilibus, & boni succi. Parū etiā comedēdū: inedia siquidē huic affectioni summè cō-

Curatio.



fert. Post omnē cibū vinū meracius exhiben-  
dū. Vbi somnus etiā accesserit, non parum le-  
uat ægrotantes. Multū autem potū tanquam  
infestissimum hostē deuitent. Fructū quoq;  
atq; olerum humidorum esum semper habe-  
ant suspectum. Soliis etiam calidioribus vtā-  
tur. hæc enim Paulo lib. i. cap. 51. teste, miti-  
gant, emolliunt, flatūsque ubicūque fuerint,  
discutiunt. Quod ad medicamenta ipsa atti-  
net, bibant hoc decoctum, quod R̄ calamin-  
thæ, mentastri, chamæmelini, origani, mētæ,  
pulegii añ m i. absinthii m s. seminum anisi,  
apii, cumini, dauci, oreoselini, fœniculi añ 3

Decoctū

iii. seminum vrticę, carei añ 3 ii. radicis inulæ  
campanę § ii. Decoquantur in aqua quanti-  
tatis iustæ, quoad tertia pars absumatur. de-  
in coletur, & saccharo sufficiēti dulcescat, ad-  
icianturq; syrupi de calamintha § iii. & fiat  
potio, de qua (vt moris est) vna vice dentur §  
iiii. Vel vtendum ista (vt vocant) tragea, quæ  
R̄ specierum dianisi, diacumini, diacalamēti  
añ 3 ii. seminum anisi, carui, dauci, fœniculi  
añ 3 i. cubebæ, gariophyllorū añ 3 ii. zin-  
giberis 3 i. piperis 3. sacchari lb s. misce, fiat  
tragea. Glandes quoq; confidēter & citra di-  
lationē supponēdæ sunt, ex rebus flatus pro-  
lectantibus, in hunc modū formatæ. R̄ mel-  
lis cocti § ii. seminum rutæ, cumini, fœniculi  
añ 3 i. seminis carei, anisi añ 3 s. salis 3 ii. mi-  
scē, fiat glans. Aluo autem adstricta, clyster

Tragea.

Glandes.

Clyster.



infundendus, qui R<sup>x</sup> decocti superioris lib. i. benedictæ laxatiuæ 3 vii. oleorum absinthii, rutæ, anethini añ 1. pinguedinis anseris & gallinæ, salis expertium, añ 3 ii s. salis 3 i. misce, fiat clyster. Extrinsecus etiam venter in hoc affectu cum oleis iam dictis inungendus. Aut lana in fasciculum conuoluta, & iis oleis leuiter calidis madefacta imponenda: lanæ quoque sic conuolutæ cuminum tritum, aut apii semen, aut anethi inspergatur. Aut imponatur ventriculo hoc ceratum, quod R<sup>x</sup> oleorū rutacei, anethini, nardini, laurini, añ 1. farinæ seminis lini, fœnigræci añ 3 i s. seminis apii, carei añ 3 i. baccarum lauri, centaurii minoris añ 3 i s. gummi ammoniaci, opopanacis añ 3 ii. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratum. Ceterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum vndique comprehendens, cum flamma copiosa sæpius admota, præsidium in hac passione est, quod incantamenti cuiusquam simile efficit, Galeno etiā lib. 12. Ther. meth. autore. Castoreum etiam ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo anethino appositum prodest.

Ceratū.

Cucurbita magna.

## DE SINGVLTV. CAP. VI.

Lygmos græcè, latinè singultus, est motus venter, qui veluti ei<sup>9</sup> conuulsio est, ab expultrice facultate noxia volētis extrudere fact<sup>9</sup>.

Λυγμός.

Causæ.

Accidit vel ex plenitudine, vel euacuatiōe, aut ob humores acres & medicata qualitate

l iiii



Signa.

curatio  
singult<sup>o</sup>  
ex frigi-  
ditate.Singult<sup>o</sup>  
ex pleni-  
tudine.

Auerfio.

præditos, aut cibos acres & mordaces. Item propter frigiditatem, & alimenti corruptionem, quo sanè nomine maximè omnium pueris frequentes singultus eueniunt. Fit etiam in febribus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio viscere inflâmato. Causæ extrinsecæ facillè ex ægri aut assidëtium sermonibus dignoscuntur plenitudo ex grauitate, euacuatio autem ex iis quæ præcesserunt. cibus corruptus ex illius nidore. acria, ex mordicatione. Singultu itaque à frigiditate oborto, oleum in quo ruta, cuminum, & absinthium sint decocta, lana exceptum stomacho imponendum. Oleum etiam mastichinum, & de castorea inunctum prodest. Pueros calidorum linteorum admotio interdum iuuat. Eis qui ætatis integræ sunt, in potu vinum, aut apium in aqua mulsa decoctum, aut cuminum tritum, aut asarum, aut pulegium, quodlibet eorum per se, aut simul mixta exhibenda. Vtile est & acetum scylliticum sorbendo acceptum. Denique spiritus retentio, quæ calorem auget, galen. lib. 2. de sympt caus. cap. 6. teste, præsens est remedium. Quando verò ex plenitudine singultus oboritur, vomitus optimum remedium fuerit. Crassis autè existëtibus humoribus, cum oxymelite scyllitico, calaminthæ, prassii, & similium iam sæpius commemoratorum decocto extenuandi & incidendi sunt. Deinceps ea quæ in diuersum



humorum copiam trahunt, sunt adhibenda. In quem usum conueniunt ea quæ per inferna purgant, potissimum verò clysteres, extremarum partium frictio & constrictio: cucurbitulæ, cum plurima flamma thoraci, stomacho, & dorso affixæ. Sternutatio etiam cōueniēter eis prouocatur. nam Hippocrate teste, à singultu habitum sternutatio superueniens liberat. Sic etiam vociferatio concinna cum plurimo clamore, deambulatio longa & cōcitata, equitatio, & compressio spiritus cōferunt. Venter etiam roborandus erit per ea quæ intrò sumuntur, vt sunt cōfectiones in hoc in officinis paratæ. Exrinsecus oleis, vnguentis & emplastris in præcedentibus capitibus productis. Singultus autem ex euacuatione sanatur per alimenti cōuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explēt, quæ partim suprà sunt dicta, & copiose in curatione hecticæ febris dicentur. Non mediocriter autem & hic conducit, vertebrae cervicis & dorsif oleo humectante, violacco & amygdalarū dulcium nimirū, perūgere. Porro mordacibus. singultum excitantibus, primū sufficiens remediū vomitum ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stupefactionem & morsum inferentium alterationem ac discussionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigerantia. In quem sanè usum philonium exhiberi potest, aut pilulæ de cynoglossa, quæ in hoc casu mirificè

6. Aph. 13

singultus  
ex euacuationesingultus  
ex mordacitate.pilulæ de  
cynoglossa



Pastillus.

conferre solent. Debent ex vna drachma confici sex pilulę, de quibus vnā antequam cubitum eat æger sumat. Alteratur autem mordacitas per attenuantia & exiccātia. Eiusmodi mixtę facultatis est subiectus pastillus, qui R. costi, croci, spice nardi, rosarū viridium, mastiches añ s, asari, aloës añ 3 ii. opii 3 i. cum succo psilii, fiant pastilli, de quibus detur 3 s. vel 3 i. Commendatur hoc pharmacum à Galeno lib. 8. de comp. medic. secundum locos, cap. iii. pluribus verbis. Obtundit etiam mordacitatē, & ex ea obortum singultum sedat, intybi succus potatus, cucumeris semē decorticatū tritūmq; bibitū. lactucę semen eodem modo: item portulacę succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta. Myxarum quoque decoctum (sebesten hodie vocāt) in potu acceptum. Maximè tamen omnium præstat lac asininum, aut si hoc non adsit, bubulum recens multum bibitum. In eum vsum exhiberi potest saccharum rosarum, aut violarum, diarhodōn abbatis, diatriasandali, iuleb violarum, & eiusmodi.

Χολέρα.

DE CHOLERA. CAP. VII.

Causæ

Cholera est vomitus biliosus, nidorosus & acidus, ad plures horas perseverans, & venter infernè eadem simul excernit. Barbari cholicam & choliricam passionē nomināt. Qui hoc malo afficiuntur, Græcis χοληρώντες, & Latinis cholericici appellantur. Fit ob mul-



tam cruditate, quæ nonnunquã ex magna alimentorũ prauitate, interim ex vitiosorũ humorũ copia originẽ ducit. Signa quibus deprehenditur malũ hoc, manifesta sũt: nam suprà infrãq; excernũt. Sitis etiã sequitur, impeditus pulsus, musculorũq; manũ & pedum, maximẽ verò surarum cõtractio & tensio. Quum itaq; malum hoc acutissimũ sit, & grauissimã syncopẽ, si paulò diuti⁹ duret, inducat, ac curata opera dãda erit, quò confecti & sine mora huic succurratur. Nemo igitur vbi copia vitiosorũ humorũ malũ hoc cõcilauerit, mox in principio, aut cõfertim ea quæ efferũtur cohibere aggrediatur. inutilia enim cum sint, euacuatiõẽ indigent. quare si nauseabundus eger est, & turbatur, cibis etiã nũ crudis in ventriculo manentib. aqua tepida propinari debet: deinde vomere oportet, digito vel pinna ori indita. Neq; tamen cum aqua mullã, neque aqua cũ oleo mixta vomitus citãdus. quòd hæc fluxiones augeat, illa verò mordacitatem operetur, & torsiones augeat. Adiuuare etiam oportet per sedẽ excretionem. alienũ enim velut venenum insidẽs, & ventrem ac intestina rodit, & humores ex vniuerso corpore attrahit. Propinãda autem leuissimã purgãtia medicamẽta, vt est aloẽ, casia fistularis, myrobalanorũ decoctum, & similia. Postquã aluus exinanita est, conquiescere oportet, & ventriculum ac hypo-

Signa.

Curatio.



LEONHARTI PUCHSII

chōdria oleo mastichino, vel nardino, vel de  
absinthio fouere cōueniet, somnūq; accer-  
sire. Prædictis oleis admiscēda interdum alia  
quæ ventrem roborare possunt, de quibus su-  
prà dictū est, & vnguēta cōficienda. Vbi iam  
exacta apparuerit cōcoctio, balneo aquę dul-  
cis, & cibis boni succi vtēdū est. In quorum  
numero est iusculum pulli gallinacei cū om-  
phacio. Carnes item auicularum mōtanarū,  
perdicum, oua sorbilia, & eiusmodi. In potu  
vtendum vino tenui, odorato, & adstringen-  
te, aut succo malorum granatorum, aut syru-  
po rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus  
sit ter aut quater extinctus. Quum verō perse-  
uerauerit malum, & gracilitas per ambitum  
corporis fiat, & maximē si vēter cōsīdat, pul-  
sus minor densūque euadat, tunc sanē extre-  
mas corporis partes vinculis adstringere, ac  
oleo multo calido impinguare oportet. Ca-  
taplasmata etiā & emplastra ex adstringētib.  
& roborantib. cōposita, ventriculo imponen-  
da. Sunt aut eiusmodi, quæ ex palmulis, hy-  
pocistide, acatia, rhu obsoniorū, bolo arme-  
nia, thure, balaustis, rosis, ac myrthi fructib.  
componūtur. Efficax quoque remedium est,  
si linteam in succo malorum syluestriū ma-  
defactum ventriculo imponatur, aut hoc ce-  
ratum, quod R̄ oleorū rosacei, myrthini, co-  
toneorum añ ̄ i. mastiches, thuris, acatiæ añ  
Scutum stomachi. 3 ii. hypocistidis 3 i. santalorum alborum &



rub. añ 3 i. balauſtiorum, ſanguinis draconis  
 3 s. boli armenia; i. ceræ & reſinæ quod tatis  
 eſt, fiat ſcutum ſtomachale. In potu verò fri-  
 gida aqua cyathi meſurâ, hoc eſt, ʒ i s. abſor-  
 benda præbeat. Cauendū tamē ne nimium  
 frigida exiſtat. hæc enim aliquādo innatum  
 calorē ſtupore ſuo extremē offendit, aut in-  
 flammationē ſtomachi aut viſceris alicuius  
 efficit. Inſtilletur autem huic interdum mali  
 punici acidi ſuccus modicus, aut roſarū, vel  
 pampini vitis decoctū. Quod ſi acriora ſint  
 ea quæ excernuntur, vexetq; ardor & ſitis, cu-  
 cumeris ſemen cum aquæ cyathis tribus præ-  
 beatur. Datur etiam vtiliter cū amylo. Tum  
 etiam intybi & lactucæ in poſca coctæ exhi-  
 beantur. Poſt verò ſomnus procurandus, &  
 quies omni modo. Verum ſi fluxio ſiſti ne-  
 queat, vinum quoddam mediocriter adſtrin-  
 gens, neque viribus validum, & quod dulce  
 quidem ſit, nō autem odorum potui dādum  
 eſt. Interant verò in ipſum micæ panis, atq;  
 ita paulatim & per interualla abſorbeāt. Vi-  
 ni tamen multitudo vitāda eſt, ac omni arte  
 conandū vt ipſos ſopiamus, ex roſis, pāpinis,  
 rubo, & ſimilibus pauimento cōſtrato. Odo-  
 ramenta quoque naribus admoueātur, roſæ,  
 mala cōtonea, & eiufmodi. Illitiones etiā ſo-  
 poriferæ circa frontem adhibeātur. Aluo au-  
 tem adhuc egerēte, amyllum cum decoctione  
 capitū papaueris per clyſterem infundatur.

Somnus  
 vt conci-  
 liandus.



simul enim cohibet, refrigerat, & somnū inducit. Ad vomitiones verò coercendas, succum malorum cotoneorum, pyrorum, puni-  
corum, & mespilorum deuorare cōuenit. Si-  
ne his quidem auxiliis cibum retinēt. extrin-  
secus contra ventriculum ipsum cucurbita le-  
uis quàm maxima admouenda est. Ad con-  
tractiones autem in musculis factas, linimen-  
ta oleo calido imbuta musculis circūponere  
oportet, & cerata humida seu vnguenta, qui-  
bus adiectum sit aliquid castorei, & olei iri-  
ni, quorum copiā in cap. de Resolutione &  
conuulsione offendes. Vbi morbus inclinaue-  
rit, ad balneū deducēdi sunt ægri: cibisq; refi-  
ciēdi erūt, pullis gallinaceis, columbis, galli-  
nis, perdicib<sup>9</sup>, palūbis, turdis, & cōsimilibus.

## DE DIARRHOEA. CAP. VIII.

*Διαρροια*  
Causæ.

Diarrhœa Græcis est, copiosum sine ex-  
ulceratione & inflāmatione alui profluuiū.

Fit propter imbecillitatē instrumentorum  
ventris, alimēta copiosa, humidiora & visco-  
siora, eorundēque corruptelam, mordica-  
tionem item in vētre contentorū, defluxum  
quorundam ē supernis ad vētris spatia, imbec-  
cillitatēmq; retētricis facultatis. Notē quib.  
Causæ discernūtur, manifestæ admodū sunt.  
Si enim ob imbecillitatē fit instrumentorum  
concoctioni seruientium, ventriculi nimirū,  
intestinorum, iocinoris & lienis, ex propriis  
capitib. petenda signa erūt. Sin ob alimento-



rum prauorū ingestionē accadat diarrhœa, partim de egri sermonibus, partim ex iis quę excernuntur, disci potest. Si enim biliosa fuerint, flauo colore excremēta infecta erunt, neq; citra mordicationem & caloris sensum eiicientur. Aderit etiam oris amaritudo, sitis, tenuis habitudo corporis, & alia quę habitū biliosum ostendūt. Sin pituitosa fuerint, contraria prorsus quę per aluū excernūtur, erūt. Si à capite in ventrē cōfluunt humores, egestiones spumose erunt, cerebri quę temperies humida. Si à plenitudine totius corporis oriatur, aut iudicatorius sit alui fluor, signis quę in Cōmentario de Plenitudine, & in libris de Crisib. à Galeno dicta sunt, deprehēdetur. Cæterū si ab imbecillitate instrumentorum alui profluuium excitabitur, intemperies quę imbecillitatem parit, suo contrario, quemadmodum cap. i. huius Libri diximus, Alui profluuium corrigenda erit. Si autem propter alias causas fluore alu<sup>o</sup> laborauerit, & natura per hūc nō temere sistenda, quę noxia sunt & superuacua expellere tentauerit, quicq; correpti eo sunt, facile tulerūt, dum. tum vsquequod natura omnem suam curam impenderit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conuenit. Etenim obluētari & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit. Siquidem quę cohibētur, sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas iſerāt, planē pe-

Curatio.

Alui profluuium nō temere sistenda.



Bilioſa  
diarrhoeæ  
curatio.

Lac co-  
ctum.

riculosos. Quare in principio ea quæ in cor-  
poris commoditatem vtiliter excernuntur, mi-  
nimè inhibere oportet. Postquam verò iam  
diutius perseuerauerit fluor, non solū super-  
uacua euacuans, verum habitum corporis ve-  
luti colliquas, viresque consumens, tunc sanè  
resistere eis oportet, tum per ea quæ per os su-  
muntur, tum quæ per anum infunduntur, at-  
que ea quæ extrinsecus imponuntur. Si itaq;  
biliosa pura cremēta prodierint, in magis  
salubria permutare ipsa oportet, nō tamē per  
cohibitionē statim eos curare. Biliosum enī  
tum in ventre, tum in ieiuno intestino aggre-  
gatum, atque post coacervationem retētum  
maximoperè lædet. Nam & stomachum sub-  
uertit, & visceribus inflammationes infert, &  
sirim accendit, & febres instaurat omnesque  
prædictas in capite passionēs efficit, atque in  
totum grauius malum reddit. Quòd si igitur  
humores biliosi in corpore copiosi fuerint,  
natura per medicamēta leuia, vt est dilutum  
rhabarbari, casia fistularis, cortices myroba-  
lanorum luteorum, aut mel aërium (mannā  
Arabes vocant) iuuanda erit. Lac tandem bu-  
bulum aut caprinum tepidū, recēs mulctum  
in potu exhibendū, aut ad ignem decoctum  
assiduēque agitarum, donec ad tertias sit re-  
ductum. quod ipsum & per fluuiales filices,  
ferrique laminas igni cādefactas, ac in lacte  
extinctas fieri potest. In decoquēdo autē su-



perstantem cōcretionem siue spumam auferre oportet. Hōc sanè nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire poteris. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorem aut etiam acorem conuerti consuevit, maiusque nocumentū quàm commodū inferre, sanè in præsens ipsum exhibere vitabimus. Aquę verò quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctionem faciemus, donec dimidiū eius cōsumatur, atque hoc modo exhibebimus. Si autē in intestinis aggregata bilis fuerit, clysteres ex hordeo decocto saccharo rubeo, oleo rosaceo, ouorū vitellis & similib. cōfectos iniicere oportet. Biliosis vacuatis humoribus, intrinsecūs ea quę adstringunt & roborare possunt, exhibenda: vt sunt saccharum rosaceum, diacydoneon sine speciebus, diatriasantali, pastilli de spodio, mīua cotoneorū, & eiusmodi. Extrinsecūs etiā quę idē possunt imponenda medicamenta, de quib. paulò post dicem⁹. Porro in diarrhœa ex humoribus crassis & viscosis, ac eorūdem corruptione facta, haud secūs quàm in priore à purgatiōe auspiciāda curatio erit. Exhibendum itaque in hūc vsum agarici dilutum cum myrobalanis empeliticis, aut aliud quod prædictos humores educere possit. Conueniunt etiam clysteres, potissimum si in intestinis viscosorum humorū copia coaceruata fuerit, ex cētaurii minoris decocto

m

Diarrhœæ  
ex pituitosis  
humoribus.  
Curatio.



Diar-  
rhœæ ex  
imbecil-  
litate retē-  
tricis fa-  
cultatis  
curatio.  
Simpli-  
cia ad-  
stringen-  
tia aluū.

Ceratū.

oleo rutaceo, & similib<sup>9</sup>. Intrā corpus exhi-  
bēda diacydoneōn cum speciebus, zingiber  
coctū, & alia quæ calefacere & exiccare pos-  
sunt. Extrinsecūs etiam quæ robur addūt ad-  
mouenda. Si ob retētricis facultatis imbecil-  
litate orta fuerit diarrhœa, ea sunt adhibē-  
da medicamēta, quæ ad alias fluxiones alui  
immodicas admouētur. Irrigationes itaque  
ex oleo omphacino aut rosaceo, aut melino  
cum vino aliquo austero. Efficacius autē his  
est myrthinum, si vehementiori opus est ad-  
strictione. Gallas etiā, malicorium, & balau-  
stia in oleis prædictis incoquere licebit. Per-  
seuerante autē adhuc fluxione, emplastra &  
cerata ex adstringentibus & exiccantib. ap-  
parata, imponenda erunt, quorum aliqua in  
cap. de Lienteria describemus. Est autem in  
primis hoc efficax & parabile, quod R<sup>x</sup> mo-  
ra præ immaturitate adhuc acerbiora & albi-  
cantia septem, quibus ubi probè contusa fue-  
rint, addūtur olei rosacei ℥ ii. ceræ ℥ i. & fit ce-  
ratum. In potu verò accepta, vētris fluxiōes,  
post sufficientem inutiliū euacuationem, sa-  
nant, cuminum, adianti decoctum, spinæ al-  
bæ radix, apii similiter semen drachmæ pon-  
dere datū. vrinam enim irritat: fluxiones ad  
intestina factas, eò diuertēs. Mora etiā imma-  
tura, & adhuc acerba, ad solē pluribus dieb.  
exiccata, deinde reposita, vsūq; expetente tri-  
ta & bibita, mirificè aluum restringūt. Con



tunduntur quoque & obsoniis admiscetur, quæ admodum rhus (sumach nominatur) consuevit. Interdum enim eius & i. cum pullo gallinaceo decoquitur. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura, & acerba, eodem modo exiccata, & in potu exhibita. Inter compositas Composita cohibent medicinas mirifice conferunt, pastilli de spodio, theriaca, diacydoneo, diatriasantali: & tia aluum. hæc quæ R<sup>x</sup> specierum diatriasantali: specierum Compositio diarhodon abb. añ ð ii. coralliorum rub. thuris in morstu electi, rosarum rub. añ 3 s. spodii 3 i. seminis acetosæ, rhois obsoniorum, id est sumach, añ ð i. balauft. acatię añ 3 s. mastiches ð s. boli armenię 3 i. sacchari candidissimi & viii. dissoluti in aqua plantaginis, fiat compositio in morsulis. Aut hoc eclegma, quod R<sup>x</sup> sacchari rosacei vel Eclegma teris, diacydoneon sine speciebus, rob de ribes, rob. de oxyacantha, id est de berberis, añ & s. miue cotoniorum simplicis 3 iii. diamoron 3 v. specierum diatriasantali ð ii. coralliorum rub. ð s. spodii, balauft. añ 3 s. boli armenię 3 i. cum syrupo myrthino, fiat eclegma. Ceterum istam aquam nunquam non paratam habebis, quæ R<sup>x</sup> rhois Aqua obsoniorum quartam unam, aquæ pluuiialis lb iii. Diar. In quibus die & nocte sumach maceretur, diarrhœæ ex in bulliat. & rhu bene ac valide exprimatur. defluxu In ea siquidem aqua oryza, milium, & alii cibi humorum coquantur, aut saltem aliqua illis portio affundatur. Si propter defluxum ab aliis corporis partibus diarrhœa accidit, curatio ex procuratio.



priis capitibus petēda erit. verbi gratia, si ex capite defluxio fit, ad ea quæ in cap. de curatione destillationis dicta sunt, recurrēdū erit

## DE LIENTERIA. CAP. IX.

λεντη-  
ρία.

Causæ.

Signa.

Lienteria, quemadmodū ipsum nomen indicat, leuor quispiam intestinorum est: passio nimirum, in qua intestina cibos non retinent, sed antequam in ventriculo coquātur, celerrime excreta dilabuntur non cocta, sed qualia antè sumpta fuerunt. Latinis itaque leuitas, aut leuor intestinorū dici potest. Oboritur autē frequēter, dysenteriā magnā præcedēte, & ex profunda vlceratione, cicatrice densa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem quidem suam, ciborū per corpus digestionem fieri non permittit, quum sanè venarum ora sint veluti obturata: venarum inquam, quæ alimentū ex intestinis ad se auellunt: ob leuiorem verò cibum statim, & priusquam permutationem & perfectam concoctionē admittat, dilabi sinit. Fit nōnunquam ex imbecillitate facultatis cibos in ventriculo concoquentis ac digerentis. Hac enim imbecilla, nec coquuntur nec digerūtur alimenta: sed cruda, humentia, imperfecta, nihilve immutata excernuntur, aluo cōtinenter fluida. Interdum etiam post longum vētris profluuium oboritur. Aliquādo etiam aqua inter cutem per ventrem euacuata, lienteria cōsequi solet. Ex quacūque igitur causa lien-



teria orta fit, egri cibum non sentiunt, & malum corporis habitū acquirunt. Succedit itaque egris assidua excretio cruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum. Adest autē simul & ardor per tota hypochondria se dilatās, quem cibi concomitatur fastidiū. Cæterum quum eiusmodi passio fit, facile est itelligere, quod facultatem retentricem & concoctricem tum ventris tū intestinorum omni modo refocillare oportet: id quod in primis per ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest, & victus rationem restituendis ac refocillandis virib. aptam. Conueniunt itaque carnes auicularum mōtanarum, pulli gallinacei assi, in quorū ventre rhus, aut mastiche imponi etiā debet, & alia quę in cap. sequenti de dysenteria commemorabuntur. Vinū bibendum adstringens. cibus autem qui exhibetur, quantitate paucus sit, & cōcoctu facilis. Potus etiā exiguus sit: multus enim, vētris fluxionibus omnibus infestissimus existit. Si itaq; ex imbecillitate facultatis cōcoctricis fit lienteria, eodem modo quo in capite de imbecillitate ventriculi dictū est, curetur. Intra enim & extra corpus adhibenda ea quę adstringunt, & tam ventriculū quàm intestina roborare possunt. Exhibendus itaq; syrupus de absinthio, aut menta, confectionesque aliæ vētriculum corroborantes. Extrinsecus verò admouenda

Curatio.

Curatio  
lienteria  
ex imbecillitate  
facultatis cōcoctricis.



da sunt ea quæ in capite de Diarrhœa dicta sunt, & in sequenti de Dysenteria cap. dicentur. Conueniet autem in primis hoc vnguentum, quod R<sup>x</sup> oleorum mastichini, de absinthio, de mēta, myrthini añ 3 ii. pulueris cinnamomi electi, gariophyllorum, galangæ añ 3 i. balauſt. roſarum rub. añ 3 s. ceræ quod ſatis eſt, fiat vnguentum. Vel hoc ceratum, quod R<sup>x</sup> oleorum mastichini, de absinthio, coto-  
**Vnguen-** **tum.** **Ceratum** eſt, fiat vnguentum. Porro quib. cicatricem fa-  
**Si à cica-** **trice fa-** **Et a liente** **ria oria-** **tur.** **tis eſt,** fiat ceratum. Etam eſſe conieſtamus, iis etiam acriū rerum  
 comeditiones frequentiores aptæ exiſtunt. Acrium enim rerum comedtio velut refricatio  
 nem quandam cicatricem operatur, quin & inſitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodammodo refocillat. Conuenient itaque in hoc caſu Gal. cap. 95. artis medicinalis autore, quæ ſufficienter abſtergunt, & parum adſtringunt. Admiſcēda itaq; ſemper adſtringentibus medicamentis abſtergētia. In aliis cauſis lienterix omnib. eodem curationis modo vtendum eſt, quo in diarrhœa & dysenteria affectis vtimur.



Dysenteria propriè Græcis exulceratio *δυσεντερία* est intestinorum. Latinis tormina, quod intestina dolore torqueantur, nominatur. Fit in. *Causæ.* interdum à causis extrinsecis, veluti frigidityte, ardore, & humiditate. Item malignorū medicamentorū potu, scammonia scilicet, & similia. A fructuū comestione, cruditatibus, acrim ciborū acceptione, ab humorib. mordacib<sup>9</sup> & acris ex vniuerso corpore ad ventrem confluentib. aut in ipso natis. Hæc quidem nunc ex tenebris, nunc per se incipit. Ex. *Signa.* cernuntur primū biliosa, varia, subpinguia: pingui nimirū quod intrinsecus intestinis adhæret, paulatim circumliquefacto. Quū verò superficies intestinorū perfectè fuerit denudata, exulceratioque superne consistit, feculenta ac cruenta excernuntur. Vbi autē altius penetraverit vlceratio, etiā sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur. Et si nō celeriter cohibeatur, vicinos locos depascitur: saniosa verò quædā excernuntur, qualia à mortuorū cadaverib<sup>9</sup> defluere cōsueverūt. Siquidē exulceratur ab exulceratione cruenta stercorei cō- *tio in tenuiorib<sup>9</sup>* mixta, cū labore & torminibus, mordacitate intestinis ac exolutione, vt nō pcul ab animi deliquio *intestinis ægri absint, deiiciantur, à sitiq; in festetur, & consistit.* febricitent, vlceratio tenuia intestina obsidet. Si in cras *fioribus.* Sin autem sincera ac multa egeruntur sterco.



Vi&amp;us.

ra, & coaceruata, & cum flatibus prodeunt, pinguiâ quoque iis cômixta fuerint, & cruor supernatauerit, in crassis intestinis vlcus consistere credendû est. Id quidem nosse, nō mediocriter ad curationem conducit. Nam si in superiorib<sup>9</sup> intestinis vlcus est, ab epotis medicamentis præsidium petendum est: si verò in crassioribus, clysterem subiicere magis cōuenit. Principiū curationis dysentericorum à quiete & modico cibo fiat, vndecunque tandem fluor procedat. Permittentibus itaque febribus, lacte recēs multo adhuc calido vtendum est: aut pro eo lac coctum, quod in capite de Diarrhœa descripsimus, exhibendum. Primū enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt cōtemperando: postremū verò aluum fistit. Oportet autem insuper & panem madefactum, à lactis acceptiōe offerre. Pultes etiam ex lacte apparatus, tum medicamentum, tum nutrimentum optimum præbent: velut est oryza cū lacte, amyli, & oua lacti commista. Sorbitiones quoque aut pultes ex alica miliôq;, adiecto rhoe, cōueniunt. Apparāda item puls ex siccis panibus affusa posca, aut palmarū aut malorum cotoneorū aut pyrorum aut rhois succo. Lenticula quoque probè assata cum plantagine, aut malis cotoneis contusis decocta exhibenda. Olerū vsus non est necessarius: attamē degustandas exhibebis, serin seu endiuia coctā, plātagi-



nem, brassicamque bis coctā. Dams & ouorum assatorum lutea. Carnes, dysentericis nō valde commodæ existunt : dandæ tamen eis qui diuturno malo vexantur. Ex iis autē præ ceteris volucrum eligendę, perdicis nimirū, palumbium, & mōtanarum aucularum. Ex pedestribus carnes capræ & leporis conueniunt. In potu à principio quidem aqua pluuiā, quæ non sit ex ædibus plumbo interceptis delapsa, vtendum est. talis enim aqua sanis etiam potata desynteriam conciliat. Quod si pluuiā optima non adsit, fontana in qua chalybs ignitus extinctus sit, vtetur. Si verò laborauerit stomachus, aut vires fuerint deiectæ, etiam vinum præbendum. sit autem adstringens, & non valde vetustū. Somnus optimum dysentericis remedium. Quod ad curandi rationem attinet, sciendum quidē vtendum esse remediis adstringentibus, obtundentibus, resiccantibus, & vrinam mouentibus, atque adeo fluxionem transferentibus. Quę adstringunt, hæc sunt: lapathi semen, rhus (sumach vocant) galla, malicorium aridum, rubi radix, ladanum, acatia, hypocistis, balauustum, folia salicis, symphyti (consolidā maiorem nominant hodie) radix, folia & semē: rhēon pōnticum, si haberi potest: althææ radix, equisetum, coralli, mastiche, coagulum leporis, sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, verbasci radix, mora acerba, acini

Potus.

Curatio.

Adstringentia.



- Obtūden-  
 tia. vūe, plantaginis semen, similiter folia & ra-  
 dix, maceris cortex. Obtundunt autē & con-  
 temperant humorum morsum & acrimoniā,  
 amyllum, tragacātha, gummi arabicū, adeps  
 caprinus, hircinus, & suillus, anserinus ac gal-  
 linaceus. Resiccat coagulum leporis, cornu  
 ceruinum vstum, testē cancrorū fluuialiū, &  
 saluia. Vrinam mouentia petē ex suo capite.  
 Resiccan-  
 tia. Quod si itaq; crassiora intestina exulceratio-  
 Si crassio-  
 ra intesti-  
 na exulce-  
 ratione  
 laboraue-  
 rint. Clyster  
 abstergēs  
 Infusum  
 congluti-  
 nans. ne laborāt, clysteres adhibeantur: primū qui  
 dē abstergendi vi præditus, qualis est qui R̄  
 aque decoctionis hordei integri lb̄ i. mellis  
 rosacei colati § i. sacchari rubei § s. vitellos  
 oui numero ii. olei rosacei § iii. misce, fiat cly-  
 ster. Facta absterfione, ea quæ glutinare pos-  
 sunt infundantur, quale est quod R̄ rosarum  
 rub. plantaginis, foliorum symphyti, polygo-  
 ni (corrighiolam vocant) verbasci, añ m i. gal-  
 larum, rhois obsoniorum añ 3 ii. bursæ pasto-  
 riæ m s. balaustrorum 3 i. oryzæ tostæ § i. ra-  
 dicis symphyti § s. Decoquantur singula in  
 aqua chalybeata, donec tertia pars absuma-  
 tur. Dein R̄ colaturę lb̄ i. succi plantaginis §  
 ii. acatię, hypocistidis añ 3 ii. boli armenię,  
 sanguinis draconis añ 3 i. adipis caprini, § i.  
 oleorum rosacei, myrthini añ § i s. misce, fiat  
 infusum. Interdum dolor tam vehemens est,  
 Dolor le-  
 niens in-  
 fusum, vt non solum obtundentia, verumetiam stu-  
 pefacientia medicamenta sint inicienda. In  
 quem sanē vsum conuenit hoc vti clystere,



quod R<sup>x</sup> lactis caprini aut vaccini lb i. butyri  
 falis experti ℥ i. adipis caprini ℥ i s. tragacan-  
 the, gummi arabici añ 3 i. vitellos ouorū nu-  
 mero iii. m. pilularum de cynoglossa 3 i. olei  
 rosacei ℥ iii. misce, fiat clyster. Si vehemētiori  
 stupefactiōe opus fuerit, opii grana aliquot  
 pro pilulis de cynoglossa adice, nempe tria  
 aut quatuor. Cæterum si in tenuibus intesti-  
 nis exulceratio cōsistit, tum remedia quæ per  
 os sumuntur, magis desiderat. Cōuenit itaq;  
 decoctum ex rebus adstringentibus suprā cō-  
 memoratis, adiectis syrupis rosaceo & myr-  
 thino, cum aliis quæ in cap. de Diarrhœa di-  
 cta sunt, exhibere. Potest etiam hoc medica-  
 mētum assumi, quod R<sup>x</sup> decocti radicis sym-  
 phyti, aut alterius medicamēti adstringentis  
 ℥ iii. syrupi rosacei ℥ i. syrupi myrthini ℥ s.  
 pulueris trochiscorū de spodio, feminis plan-  
 taginis, boli armeniae añ 3 ii. misce, fiat po-  
 tio. Extrinsecus præter ea quæ cōmemorata  
 sunt in capitibus de Diarrhœa & Lienteria,  
 admouendū erit hoc ceratū, quod R<sup>x</sup> oleorū  
 mastichini, rosacei, myrtini, cotoneorū añ ℥  
 i. farine hordei, fœnigræci añ 3 i s. rosarū rub.  
 plātaginis añ 3 i. balaustiorū, sanguinis dra-  
 conis añ 3 s. Boli armenie, 3 i. hypocistidis, a-  
 catie, mastiches añ 3 ii. cū cera & resina quod  
 satis est, fiat ceratū. Possunt & multa alia ad  
 exēplum illius cōponi, quæ cōmemorare sin-  
 gula & superuacaneum & inutile iudico.

Si in te-  
 nuibus  
 sit exulce-  
 ratio.

Extrinse-  
 cus quæ  
 adhiben-  
 da.  
 Ceratum  
 optimū.



## DE TENESMO. CAP. XI.

Tenes-  
mos.

Causa.

Signa.

Curatio.  
Si à frigo  
re.

Tenesmus est assidua & quæ differri ac deuitari non potest, desidendi seu egerēdi cupiditas, qua tamen nihil præter modica cruenta, vel mucosa, egeritur. Latinis tenesm<sup>o</sup>, barbaris medicis nostri temporis tenasmus. Fit interdum propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, humores acres, biliosos, aut pituitam salsam, vlcus, aut inflammationem in intestino recto obortam. Interdum etiã stercoris in intestino cæco coacti obstructio tenesimum efficit. Causam extrinsecã de sermonibus egri intelliges, quia nimirum podice attigit res frigidas, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex iis quæ excernuntur dignosces, quæ vel biliosa aut pituitosa erunt. In vlcere purulenta ac saniosa excernuntur, & in ano doloris pungentis sensus inest. Inflammatio tumorem recti intestini, & dolorē grauatiuum vnã cum febre efficit. Stercoris multitudinem grauis distentionis sensus circa imum ventrem sequitur.

Curã di ratio iuxta causarum diuersitatem variatur. Si itaq; tenesimum frigus præcesserit, vinum meracum calidum bibendum dato: ac pectinem, inguinãq; ac inter anum & scrotũ intercapedinẽ, *αἰγίνατον* Græci vocãt, oleis ac fomentis calidis irrigato ac foueto: qualia sunt rutaceum, & liliorũ alborũ. Fur-



fures autem in vino decocti, ac sacculo excepti, commodè sedi adhibentur. Clysteres quoque ex decocto mentastri, origani, calaminthæ, chamæmelo, abrotano, semine anisi, feniculi, & similibus cōfecti, adiectis oleis anethino, chamæmelino, liliaceoque, iniicere oportet. Porro mirificè cōfert, si statim ab excretiōe admoueat later perquàm vetustus & à fumo denigratus, vnà cum complexis in eo paleis tusus, deinde feruēti aceto subact⁹, linteoloque illigatus sedi subditus. Caterū si à biliosis humorib⁹ in ano ac intestinis detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abstergendi atque abluendi inest facultas, iniiciendi sunt, qualis est qui R̄ decocti hordei ℥ i. sacchari rub. ℥ i s. mellis rosacei ℥ i. vitellos oui numero ii. olei rosacei ℥ iii. misce, fiat enama. vitet omnia acria æger, ac vtatur mediocriter frigidis & humidis, quæ bilis feruorem obtundere possint. Si à pituitosis humoribus procreetur, tum curabitur vt is qui à frigore factus est, adiectis tantū clysteribus iis, quæ pituitam vacuare possunt medicamentis, benedictâ nimirū laxatiuâ, aut eclegmate indi, vel diaphœnicôn. Si verò ab inflâmat

Si à biliosis humoribus.

Si à pituitosis.

Si ab inflammatione.



LEONHARTI FVCHSII

- iniiciantur per clysterem. Extrinsicè perinaeon, hoc est, locus inter scrotū & anū, oleis rosaceo & myrthino irrigādus. Aut adhibeatur tale fomentū, quod R<sup>x</sup> rosarum rub. plantaginis añ m i. balaustrorū 3 iii. fidiorum § i. baccarum myrthi 3 ii. foliorū rubi § i. Decoquantur singula in aqua sufficiēti, donec tertia pars absumatur. In eo decocto imbuta spōgia sedi adhibeatur. vbi opus est suppuratione aut digestionē, fomenta ex decocto radicis althææ, fœnogræco, chamomillæ, meliloti, & fœrfurum cōposita adhibenda erūt.
- Fomentū.** Si verò ab vlcere fiat teneismus, primū abstergentia infusa, dein glutinantia, haud secus quàm in dysenteria, admouenda. vnguētum etiam hoc sedi inditum cōfert, quod R<sup>x</sup> olei rosacei § i s. mucositatis tragacanthæ, gummi arabici añ 3 iii. cerusæ, plubi vsti añ 3 s. aloës, thuris añ 3 i. ceræ quod satis est, fiat vnguentum, quo linamenta imbuta sedi indantur. Si dolor immensus fuerit, prædictis opii 3 i. addi potest. Si à stercoris multitudine oriatur teneismus, tum clysteribus leniētibus paulatim stercora educi debent, hoc nimirum vel simili, quod R<sup>x</sup> malux, althææ, mercurialis, betæ, foliorum violæ añ m i. se. fœnigræci, lini añ § s. Bulliant omnia in aqua sufficiēti, donec tertia pars absumpta fuerit. R<sup>x</sup> colaturæ lb i. & dissolue in ea casia fistularis § i s. olei communis § iii. salis triti 3 i. fiat enema.
- Si ab vlcere.**
- Vnguentum.**
- Si à stercoris copia.**
- Clyster.**



Porro hoc etiam vnice cauendum erit, ne purgantia tum medicamenta bibenda dentur, quod inde summum ægrotanti exitium imineat, attractis aliunde exque toto corpore ad priorem copiam stercoreum excrementis, vt diffusè in Paradoxis docuimus.

## DE COLI DOLORIBVS. CAP. XII.

Dolor qui in laxiore intestino, quod colon appellatur, suboritur, ob multas causas Causæ. fieri solet, potissimū verò quatuor. Primum propter crassos & pituitosos humores intra coli membranulas subsidentes. Secundò, propter flatulentos spiritus, quibus nō sit exitus. Tertiò, ob inflammationem, intestinū hoc distendens ac male habens. Quartò, propter acres & erodentes humores, qui colon dictū Signa. intestinum infestant. Quibus crassus pituitosusque humor dolorem excitat, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim verò vbi coli situs est, ibi quasi tundi ac perforari intestinū sentiunt. Tormina quoque affligunt, ructus, nausea, vomitio varia, potissimū pituitæ. Alius grauitè impedita nihil reddit, ac ne spiritū quidem transmittit. Stercus autē quādoque excretū, bouino simile videtur, leue & flatus plenū. Præcedēs horū causa est, continuus ciborū quāmaximè frigidorū crassiq; succi vsus, satietas, cruditas, ocium, & iis finitima. Qui autem ex spiritu flatulento dolēt, tensionem magis experiūtur,



Quibus verò propter internū inflammatio-  
nis feruorem dolor accidit, hos febris haud  
ignaua vexat, vrinae quoq; simul & stercoris  
retentio accidit, pulsus hos etiam iuxta ven-  
trem exercet, sitis, ardor, nausea, & vomitio-  
nes potissimum bilis, quæ nihil leuant malū.  
Hæcque omnium grauissima est, quæ in ileū  
transitiōne minatur. Quibus acres rodētēsq;  
succī dolorē mouent, sicut etiam qui inflam-  
mationem experiuntur. hos ardor, sitis & vi-  
gilia torquet, immò & febriculæ, sed minus  
quàm illos. Vrina redditur acris, & biliosa  
deiciuntur. Sæpius autem alui deiectio ma-  
iorem excitat cruciatum, grauiusque irritat  
calidiores cibi potūsque assumpti. Quo verò  
pactō colī & renum affectus discernēdi sint,  
docet Galenus lib. 6. de Aff. loc. cap. 2. Vi<sup>ct</sup>  
& curādi ratio iuxta causarum diuersitatem  
variatur. Quum itaq; crassi ac lenti humores  
doloris causa existunt, victus ratio in vniuer-  
sum extenuans sit. Panis itaque quo vescitur  
coli à crassis & æger, recens ac in clibano aut furno probè  
pituitosis sit coctus. Ex carnibus conueniunt in primis  
humori- volucrum, gallinæ nimirum, perdicum, pa-  
bus. Vi- lumborum, turturum, & columbarū. Fugien-  
t<sup>o</sup> ratio da omnia volucrum genera, quæ in aquis de-  
extenuās gunt. Ex quadrupedum animantium genere  
cōueniunt carnes vitulinæ & hœdine. Legu-  
mina omnia vitanda, quòd huic passioni in-  
commoda sint. Inter olera conueniunt apiū,

Curatio  
doloris  
coli à  
crassis &  
pituitosis  
humori-  
bus. Vi-  
t<sup>o</sup> ratio  
extenuās



asparagus, & similia: allia quoque cruda, & cepas deuorare, haud nocebit. Et vt summam dicam, a limēta sint boni succi, & concoctu facilia, satietasq; ac cruditas vitetur. Bibendum vinum subadstringens, albū, tenue, pellucidum, mediocri aetate, temperatura dilutiore. bibaturque modicē. Quod verò ad curandi rationem attinet, si crassi & glutinosi humores dolores contraxerint, medēdum quidem sic vt non vehemēter calefaciamus, quippe ab huiusmodi præsidiis diffunduntur, & inflantur omnes frigidi ac crassi humores, qui intestina distendendo augēt dolores. Cōuenit itaq; ipsos diffecare & concoquere citra vehementem calorem, & per eorum quæ minimē inflant, vsum. In exacerbationibus igitur irrigationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, & anethino. Item fomenta, & sacculi ex florib<sup>9</sup> chamæmeli, anethi, meliloti, feminibus lini, fœnigræci, althææ, & milio. Mirificē autem conferunt clysteres ex oleis iam commemoratis, & decoctio prædictarū herbarū, aut cucumis syluestris radicū, adiectis cumino, vel ruta cū adipe anserino vel gallinæ, confecti ad eum modum. R<sup>x</sup> malug<sup>9</sup> althææ, chamæmeli, mercurialis, anethi añ m i. origani, calaminthæ, pulegii añ p. i. seminum lini, fœnigræci, cumini, smyrnii añ 3 iii. coquātur singula in aqua fontana, donec tertia pars absumatur. R<sup>x</sup> colaturę lb i. hieræ pi-

Curatio.

Anodyna.

Clyster.



creꝝ s. benedictæ laxatiue; v. eclegmatis in-  
 di; i s. mellis rosacei colati ꝥ s. oleorum cha-  
 mæmelini, anethini, rutacei, añ ꝥ i. vitellos  
 oui numero ii. salis communis; i s. misce, fiat  
 enæma. Gladium etiam ad motiones, illitio-  
 nesq; sedis, ex succo cyclamini cum melle &  
 nitro, vel centaurio minore cum melle & ni-  
 tro. Glandes autem sic componi debent. Rꝥ  
 mellis cocti ꝥ i s. specierum hieræ picræ; i.  
 colocyntidos ꝥ i. salis gemmæ ꝥ s. misce, fiat  
 Vomit<sup>o</sup>. glandes oblongæ. vomitus etiã ante coenam  
 si quis facile vomat, præ omnibus auxiliatur.  
 Porro vbi facta iã euacuatione dolores pro-  
 ducuntur in multas horas, in soliũ olei calidi,  
 aut si hoc fieri non potest, in hydrelæum de-  
 scendere alienum non est. Inseffus etiã utilis  
 ex decocto althææ, pulegii, foliorum lauri,  
 fœnigræci, chamæmeli, artemisiæ, anethi, &  
 Vinũ ab similibus. Conuenientissimum verò ad coli-  
 sinthites. cos medicamentum, vinum absinthites exi-  
 stit, si prælibatiõe à balneo opus habet. Estq;  
 etiam nõ sitientibus valde commodum. De-  
 coctum quoq; herbe ipsius, vbi semel tatum  
 ebullierit, pari modo ad vinũ quod aliàs pro  
 consuetudine bibunt, admixtũ, vtiliter à bal-  
 neo præbetur. Castoreum etiam assidue po-  
 Casto-  
 reum. ratum, totius affectionis malũ demolitur, o-  
 mnibusq; medicamentis præstat. Datur eis dra-  
 chma vna in trib<sup>o</sup> cyathis aque mulsæ. Quod  
 si dolor non conquieuerit, propinadum erit



medicamentum diatriōn pipereōn, vel the-  
 riaca. Quod si vero dolor est vehemens, me-  
 diocriter lenientibus ac mitigantibus vti cō-  
 uenit medicamētis ab inferioribus partibus  
 inditis, aut potis. Nam quæ valenter stupefa-  
 ciunt vitare oportet, quod paulisper quidem ciētia vi-  
 leniant, sed diuturniorem affectum efficiāt. tанда.  
 dum materiam increassant, meatūque intesti-  
 ni condensant. Anodynis itaq; propriē voca-  
 tis medicamentis, quorum aliqua initio capi-  
 tis dicta sunt, iterū vtendum. Quæ autē à to-  
 ta substantia colicis auxiliantur, multa sunt. Quæ à to-  
 ta substā-  
 Lupi autē stercus, maximē album, ex aqua tia conse-  
 aut vino albo tenui summē conuenit. Melius runt coli-  
 autem stercus censetur, quod non in terrā de-  
 lapsum reperitur, verum in fruticem aut her-  
 bam excretum. Mirum etiam in modum co-  
 licos iuuat, amuleti instar iliis ægroti alliga-  
 tum idem lupi stercus. Reliqua apud Aëtiiū  
 lib. 9. cap. 31. descripta habes. Porro si flatulē Coli do-  
 tus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui loris à  
 flatus discutiūt infundendi, qualis est qui R flatulen-  
 abrotani, origani, pulgii, calaminthæ, cha-  
 mæmeli añ m i. rutæ, mēte, parietarię añ m s. tibus cu-  
 seminū anisi, fœniculi, carei, cumini, anethi, rario.  
 smyrnii, dauci añ 3 ii. Decoquātur, donec ter Clyster.  
 tia pars absūpta fuerit. R colaturę s b i hieræ  
 picræ, benedictæ laxatiuæ añ s. castorei 3 i.  
 specierū diacumini 3 ii. oleorū rutacei, ane-  
 thini añ s. salis cōmunis 3 i. misce, fiat eng-  
 n ii



ma. Potest etiam prædictis addi eclegma de baccis lauri, quo ad discutiendos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit etiã eius eclegmatis quãritatẽ nucis auellane, in decocto aliquorũ incidetiũ medicamentorũ indies propinare. Extrinsecus autẽ abdomẽnis quæ flatus dissipant, fouendũ ac irrigandum erit.

**Flat<sup>o</sup> dissipantia.** Sunt autem præter ea quæ dicta sunt, nigella, ammi, oreoselinum, amygdalæ amaræ, piper nigrum, mentastrum, bacce lauri, absinthiũ semen vrticæ, acorus, maiorana, & cinamomũ. Ex iis itaque cataplasmata, fomenta, aut sacculos cõficies. Quod verò reliqua omnia vincit, & incantamẽti cuiusdam simile quid efficit, Galenũ lib. 12. Ther. meth. cap. vltimo teste, est cucurbita maxima leuis cũ copiosa flamma toti abdomini affixa. Aeger etiam à diluti vini, & frigidæ aquæ potu, lactis & aliorum refrigerantium, ac flatuosos spiritus gignentium alimẽtorum vsu, sibi caueat. At vini potius meracioris potu, victusque ratione reliqua calefaciente ac incidente vtatur. Prætercà inflammatione intestinum exercente, vena in cubito aperienda est. Si verò vrinæ difficultas superet ac dominetur, ex malo leolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiam vtendum remediis, exceptis acribus, & vehemẽter purgantibus. Enæmatis verò potius lenientibus, item cataplasmatibus, & irrigationibus, & in oleum descensu vtendum.

**Cucurbita magna.**

**Victus.**

**Coli doloris ab inflãmatione curatione.**



cucurbitulas etiā iis affigimus. **Viētus autē Viētus.**  
 ratio tenuis sit, & ferē febricitatiū, donec in- **Coli do-**  
 flammatio solvatur. Atqui si propter acres loris ab  
 rodentēsque humores dolitant egri, per sedē acribus  
 infundere conuenit ea quę humores eluere, & roden  
 atque citra mordacitatem purgare possunt: tibus hu  
 cuiusmodi est ptisanæ succus, aut decoctum moribus  
 fœnigręci, seminis lini, chamęmeli, & althęę curatio.  
 cum adipe recenti anseris vel gallinę, & rosa  
 ceo oleo. Conuenit autem hoc potissimum **Enęma**  
 enęma, quod R̄ foliorum violę, intybi do-  
 mestici vtriusque, foliorum althęę, chamę-  
 meli añ m i s. seminum fœnigręci, lini añ ʒ s.  
 Bulliāt in aqua sufficienti, donec tertia pars  
 absumpta fuerit. R̄ colaturę ʒ xiii. casię fistu-  
 laris ʒ i. hierę picrę ʒ vi. olei rosacei ʒ ii. olei  
 anethini ʒ i. pinguedinum anseris, gallinę añ  
 ʒ iii. vitellos oui numero ii. misce, fiat enę-  
 ma. Nō autē solūm vacuare, verū etiam tem-  
 perare infestantem humorem oportet. Qua-  
 propter balneis ex dulci aqua vtendum: ea **Balnēa.**  
 enim mitigare, & somnū conciliare possunt.  
 Exhibēdus etiā syrupus violaceus & rosa-  
 ceus, & alia eiusmodi, quę contemperare, ac  
 vim mordacium humorum obtundere va-  
 lent. Vtendum etiā cibo sorbili, ptisana ni. **Viētus.**  
 mirum, ac piscibus saxatilibus. Abstinēdum  
 acribus omnibus tum cibis, tum medicamen-  
 tis, fomētis, irrigationibus, cataplasmatibus ca-  
 lentibus, necnon vini potione, potissimū ve-



**Stupefa-**  
**cientia.** teris. Et ut rem paucis perstringam, tota vi-  
ctus ratio humidior & frigidior sit. Quum  
autem dolor nihil remiserit, sed vehemētius  
subinde saeuierit, ad stupefacientium vsum  
confugere oportet. In hac enim passione, nō  
solum quod sensum stupefaciunt, sed & quia  
humores tenues in crassant, caloremque refri-  
gerant, opitulantur. Inter ea verò potissimū  
philonium conuenit, de quo vsque ad inte-  
gram drachmam exhibere licebit. Et catapo-  
tia de cynoglossō inscripta, ex vna drachma,  
ut antea quoque dictum est, sex conficiendo  
pilulas, vnāque ante cubitum exhibendo,  
mirificè conferunt.

## DE ILEO.

## CAP. XIII.

**ἰλεος.****Conuul-**  
**uulus &**  
**voluulus.**  
**Causæ.**

Ileos, passio est intestinorum tenuiū, gra-  
uissimos & letales dolores inferens. Sic dicta  
à circumactione doloris. ἰλεὸς δὲ siquidem  
Græcis est circumuolui, & circumagi. Hinc  
est quod Latinis cōuoluulus & voluulus di-  
catur. Barbaram sectantes medicinam, Iliacā  
nominant. Contrahitur id vitii continua cī-  
borum corruptione & cruditate, maximè au-  
tem à pinguibus carnibus. oboritur etiam ex  
plagis ac ictibus quibusdam, iis locis vbi te-  
nuia intestina sita sunt, factis. ex frigore vehe-  
menti constringente, ac recremēta retinentia.  
Cōtingit & iis, quibus intestinum in scrotū  
vnā cum stercore delapsum est, indeq; violē-  
ter retrusum, ex eoque inflammatum existit.



fit etiam ob veneni potionem, & ob indura-  
 tum stercus, circa tenuia intestina impactum.  
 Familiaris est hæc passio pueris, euadunt ta-  
 mē beneficio naturalis humiditatis. Senibus  
 verò nō valde familiaris est: si tamē ipsi hāc  
 passionem incidant, ferē nunquam conuale-  
 scunt. Accedit agris dolor vehemētissimus, Signa:  
 & tumor aliquis in tenuium intestinorū par-  
 te eminet, vt videatur intestinum ad chordæ  
 similitudinem conuolutum: vnde etiam cor- Corda-  
 dapson nonnulli hanc passionem appellaue plos.  
 runt. Adest etiam stomachi nimia humecta-  
 tio, exolutio, ructus inanes nihil alleuantes,  
 murmura intestinorum, cohibitio perfecta  
 stercoris & flatuum. Si verò intendatur adfe-  
 ctus, omnia sursum ferūtur, obidque vom-  
 itus pituitę ac bilis accedunt, frigiditas totius  
 corporis, dolorq;, plurimis etiā spirandi dif-  
 ficultas. Morituris autem amplius sudor fri-  
 gidus, vrinq; difficultas, podex ita adstrictus  
 vt neque specilli extremum suscipere possit.  
 Aliquando & stercus vomitu reiicitur. Siqui Curatio.  
 dem igitur à cruditatibus, ac multis variisq; Ileici à cru-  
 cibis ingestis fit malū, potissimū vbi crudus ditatibus  
 cibus adhuc insidere ventri videatur, vomit⁹  
 cōcitandus erit. Si verò nihil crudorū ciborū  
 in ventre cōtineatur, omni conatu enitēdum  
 est, quò tū flatu, tum stercora infrā trahātur:  
 idq; per clysteres, glandes, & illitiones, ma-  
 gna diligētia in singulis adhibita perficiēdū.



- Enæma.** Fiat itaque tale enæma, quod R<sup>x</sup> mercurialis, rutæ, foliorum althææ, centaurii minoris añ m i. hyssopi, calaminthæ, absinthii añ m i s. radicis althææ § i. radicis cucumeris syluestris 3 i s. seminum lini, fœnigræci añ 3 iii. seminis cumini 3 ii. Bulliant in aqua sufficiēti, donec tertia eius pars absumpta fuerit. R<sup>x</sup> colaturæ § xiiii. benedictæ laxatiuæ § i. butyri recētis, mellis rosacei colati añ § s. oleorum rutacei, anethini añ § i s. salis 3 i. misce, fiat clyster. In fundendus est ante cibum: vrgente verò malo, etiam à cibo. Præcipiendūque vt quamdiu quidem queant ægrotantes retineāt. Glādes quemadmodum in coli doloribus parandę, adiectis semine rutæ, cumino, & brassicæ caulibus. Lōgiusculas etiam facere oportet, vt profundius penetrare possint. Cyclamini succo, aut melle cum nitro podex illinendus. Hoc denique malum cataplasmatibus, & fomentis, sicut in cap. de colicis comprehensum est, curare oportet. Conueniunt aut potissimū fomenta ex lanis oleo, in quo cuminum, anethum, ruta, & nasturtium decocta sint, madefactis. Cataplasmata autem ex semine lini, fœnogræco, farina hordeacea, loliacea, ruta, cumino, anethi semine & apii. In soliu etiam aqua & oleo confertum descendere cōuenit. In aqua verò althæa, ruta, anethū, & alia quæ dicta sunt decoquātur. Post hæc cucurbitę affigātur, primū quidem ad remotos locos, le-
- Glans.**
- Fomenta**
- Cucurbitæ.**



ues, deinde ad ipsos etiā dolore affectos: scarificationesque profundiores fiant. Purgatio Purgatio  
 nes etiam assumere conuenit, potissimū ubi nes.  
 primū per ea quę dicta sunt, stercora primū  
 ad inferiora tracta fuerint. Mirificē ipsis con-  
 ducit, si vomuerint, anethū coctum potumq;.  
 A potu autē panem in aquam feruentem cō-  
 iice, cuiusque frustra calida confestim edenda  
 prebe. Si verò à venenoso medicamēto quis Ileci à ve-  
 in ileon incidat, aquam tepidam multam bi- nenoso  
 bendam dabimus, vomerēq; cogemus. Dein medica-  
 de oleum calidum in potu dandum, aut pin mēto cu-  
 guia iura, vt rursus vomāt. Postea ita parū, ratio.  
 perquiescāt, & deinde statim theriacen cum  
 vino dissolutā accipiant. Cibi eis exhibean-  
 tur boni succi. Quod si obstructio perseuera-  
 uerit, aluus lacte scisso, cum modica aloē, aut  
 alio medicamēto purgante vacuanda erit. Si Ileci ab i-  
 ab inflammatione ileos orta fuerit, à venę se flamma-  
 ctione auspicandū erit, deinde cucurbita in- tione cu-  
 flammatis partibus per ambitum scarificatis rato.  
 affigenda, & enarmata ex decocto malue, fœ-  
 nigreci, seminis lini, cum oleo & butyro im-  
 mittenda. Extrinsecus etiam ea quę inflāma-  
 tionibus cōducunt, & dolorem leniunt, vt in  
 capite etiam de coli dolore dictum est, ap- Ileci ex  
 ponenda. Et in inedia ad tertium vsq; diem delapsu  
 seruādi. Si ex intestini in scrotū de lapsu ileos intestini  
 accidat, confestim tētandum est, vt decubitu in scrotū  
 sursum versus vergente adornato, delapsum curatio.



intestinum ad inguinum partes retrudatur,  
atque leniter citra violentiam ac compressio-  
nem, ligatura fasciæve adhibita contineatur.

## DE LUMBRICIS. CAP. XIII.

ἑλμινθες.

Peretes.

Lati.

κεῖρια.

ταινία.

ἀσκάριδες.

Lumbricorum (Helminthes Græci vocāt)  
tres sunt vniuersæ differentiæ. prima teretum  
seu rotundorū, altera latorum, tertia eorum  
quos ascaridas nūcupāt. ἑλμινθες στρογγύλαι,  
hoc est, teretes lūbrici speciē habēt omnibus  
perspicuam: nempe secundū crassitudinē ro-  
tundi sunt, longitudine verò palmares, & ali-  
quando longiores, & aliis frequentiores sunt.  
In gracilibus plerunque intestinis cōsistunt,  
& superiorem ventriculum subeunt, idēque  
frequēter per os reiciuntur: quibusdam & ē-  
narib. redduntur. Atq; hoc genus infantibus  
& pueris atque his qui ad pubertatem acce-  
dūt peculiare est. Lumbrici lati à Græcis me-  
dicis κεῖρια, hoc est instite, à similitudine quā  
ad institas habent. qua ratione etiam Tæniæ  
ab iisdem vocantur, quod instar fasciarū sint  
lati & longi. Incredibilis enim longitudinis  
sunt tæniæ, vt Plinio autore lib. 11. cap. 33. tri-  
cenum pedum aliquando visæ sint, aliquādo  
etiam plurium. Nihil autem est latus lumbrī-  
cus, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambi-  
entis intestina mēbranæ, in corpus quoddam  
vium, & animalis modo mobile. Ascarides  
tenues ac breues, vermibúsque similes lumbrī-  
ci sunt. In extremo longanone, & ani fibula



(sphincterem nominant) initio reperiuntur,  
Origo omnium generū est ex cruda, crassa. **Causæ.**

pituitosāque materia, & putredini accōmo-  
da, qualis in pueris aliisque voracibus collig-  
gitur. Sequitur eos qui rotundos lumbricos **Signa ro-**  
continēt, incredibilis morsus intestinorū & **tundorū**  
ventriculi, tussiculęq; tenues ac exigue, & fre-  
quenter irritantes, quum tamen nihil reiicia-  
tur. Nōnullos comitatur singultus, & somn<sup>o</sup>  
cum tremore: & qui his occupātur sine ratio-  
ne expergiscuntur, nonnulli & cum clamore  
exurgunt & profiliunt, & iterum sopiuntur.  
Quidā verò & linguam foras protrudunt ac  
exerunt, oculōsque claudūt, taciturniq; sunt,  
excitantibus indignātur, ob imbecillitatem  
vigilare nequeunt. Quidam autem oculos  
sanguine suffusos habent, & pulsum inequa-  
lem, obscurum, deficientem, & recurrentem.  
Quibusdam etiam appetitus perditio acce-  
dit. Pueris insuper dum dormiunt manduca-  
tio linguę, cui accedit conformatio oris in  
modum lactētium, aut accipientium cibum.  
Plerisq; verò aluus deiicit, corruptos egerēs  
cibos, & tympani modo inflatur. Reliquum  
corpus sine ratione contabescit, neque esurie  
præcedēte, neque euacuatione immodica fa-  
cta. Atqui nō in omnibus omnia quę iā com-  
memorauimus signa sunt singulatim inqui-  
renda, sed quę reliquis præpollent, & prin-  
cipatum tenent; aliquando verò & plurima.



- Signa latorum.** Latus lumbricus continuos stomachi morsus infert, & ad cibos impotentem ac incorrigibilem appetitum. Nam quod animatum eua sit intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit: & nisi assuaserit, intestina rodantur. Cōsequitur sic patietes, corporis gracilitas & imbecillitas, assiduusque famis sensus. Infallibile aut ac certissimum iudicium, si cum recrementis quedam cucurbitæ semini
- Signa ascaridum.** similia excernantur. Ascarides vehementem pruritum in ano excitant, assidueque ad egerendum irritant: & qui hoc malo afficiuntur, ut plurimum ab excretionis melius habent.
- Viſtus.** Viſtus ratio calida & sicca sit, potissimum si febre egrotantes vacauerint, cibisque utantur probi succi, & qui facile in membra digerantur, nec lumbricorum effectricem causam adaugeant. ideoque omnia quæ pituitosos humores procreare possunt, fugienda. liberalius nutriantur, famemque minime ferant: quod lumbrici nisi cibum habeant quem cōsumant, postea ipsa solida corpora arrodant. Dabitur autem cibus tum præcipue, quum non prorsus inaniti fuerint. vinum bibant aquosum.
- Curatio.** Ceterum curandi ratio non differenda: quod multi nulla lumbricorum ratione habita, corrosi ab iisdem, & cōuulsi interierint. Curatio verò tam rotundorum quam latorum in hoc cōsistit, ut hos prius occisos, expellamus. Occiduntur autem amaris potissimum medica-
- Simpli-**  
**cia me-**



mētis, inter quę simpliciora hæc sunt: Absin-  
 thium, abrotanum, calamintha, marubium, ta lūbri-  
 dictamus, hyssopus, ruta, folia persicorū, co- cos occi-  
 riandri semen, cornu ceruinum lupini, mēta, dentia.  
 pulegium, origanum, centauriū minus, filix,  
 gentiana, aristolochia rotūda, esus alliorum,  
 brasiæ semen, & helenii radix. Inter omnia  
 autem laudatissimū remediū est aloë. Quia  
 verò infātes aloē grauitèr propter suā ama-  
 titudinem admittūt, supinis fasciola ipsis de-  
 tentis ore adaperto ac diducto per fistulam  
 quādā valido munitam canali, inuitis illam  
 iniiciemus. Ex dictis itaq; medicamētis sim-  
 plicibus, varia componi medicamenta pos-  
 sunt, nimirum decocta, pulueres, cataplasma  
 ta, emplastra, & vnguenta. Cōuenit autem is  
 puluis, præter alia, qui R̄ seminis lūbricorū  
 3 ii. centaurii minoris, absinthii, cornu cerui  
 ni vsti añ 3 i. calaminthæ, pulegii, origani añ  
 3 s. abrotani, mentæ, lupinorū, foliorū aristo-  
 lochiæ rot. añ 3 i. aloës 3 ii. misce, fiat puluis,  
 de quo detur drachma vna, aut semis, pro æ-  
 tatis & habitus corporis ratione in lacte, aut  
 melle, aut syrupo de dulci radice. Nā debent  
 ea quæ lumbricos enecāt, cū dulcibus liquo-  
 ribus propinari, quò citius medicamēta dul-  
 cedine illa allecti lumbrici amplectātur. Ex-  
 trinsicus vmbilicus felle taurino, aut hoc vn-  
 guento illinēdus, quod R̄ olei amygdalarū Vnguentū  
 amararum, olei de absinthio, añ 3 i. fellis tau-  
 tum.

Compo-  
sita.

Puluis.

Vnguentū



Ceratū.

Lūbrici  
enecati  
vt expel-  
lendi.Si alui  
profluui  
um acce-  
dat.

rini ꝯ s. cētaurii minoris, absinthii lupinorū,  
 añ ꝯ ii. foliorū persicorū, cornu ceruini vsti  
 aloës, abrotani añ ꝯ i. ceræ quod satis est, fiat  
 vnguētum. vel imponatur toti vētriculo hoc  
 ceratum, quod ꝯ aloës, absinthii, farinae lu-  
 pinorum añ ꝯ ii. nigellæ, mētæ, origani, pule-  
 gii, marubii añ ꝯ i. cētaurii minoris, calamin-  
 thæ añ ꝯ s. oleorum de absinthio, amygdala-  
 rū amaranū añ ꝯ ii. olei costini ꝯ i. fellis tauri-  
 ni ꝯ s. cum cera & resina q. s. fiat ceratum. Ad  
 imaginem illorum possunt componi empla-  
 stra & cataplasmata, ita vt peculiaria horum  
 paradigmata ascribere minime sit necessa-  
 riū. Ab inferiorib. etiā partibus mulsam iniici-  
 cere copiosiorē expedit, quò lumbrici mellis  
 dulcedine illecti, deorsum descendant. Cæte-  
 rum enecatos iā per pharmaca prædicta lū-  
 bricos, citra dilationē expellere oportet. Vi-  
 tiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ  
 & appetitum & cōcōtionem lædit. Extrahū-  
 tur autem per glādulas suppositas, aut medi-  
 camenta purgātia assumpta: potissimū verò  
 per hieram picram, & pilulas cōmunes (quæ  
 alio nomine pestilentiales vocantur) quæ sa-  
 nè mirificè in educēdis lumbricis conferūt.

Porro qui lumbricis cum alui profluuiio  
 infestantur, eos fluorem inspissando, & con-  
 coctionem tum per cibos, tum per catapla-  
 smata in melius permutādo, curare oportet.  
 in quātum enim profluuium inualescit, tan-



tum etiam lūbrici interquiescūt. Quare diligenter conandum vt aluus adstringatur, firmitasque ei adiciatur. His itaque plātaginis succus propinādus, vel ipsa etiā arida plātago assumēda. Ex equo enim viriq;, & fluori ani & lūbricis efficax est. Cataplasmata etiā, cerata & vnguenta ex cruda hordeacea farina, malicorio, acatia, hypocistide, & similibus adstringentib. Concinnanda, adiectis iis quæ ad lumbricos interficiendos sunt prædicta. Conferunt autem adstringentia, & hoc etiam nomine extrinsecus admota, quod venter ex amatorum medicamentorum assumptione læsum iterum corroborent. Licebit & in hoc casu vermes terrenos exiccatos, & in puluerem redactos, cum hydromelite curatio. exhibere. Ascarides in infantibus vacuandi sunt cum glādibus ex melle & sale cōfectis. In prouectiorib<sup>9</sup>, clysteribus ex decocto absinthii, centaurii minoris, calaminthæ, lupinorum, & aliorum suprà commemoratorū, oleis adiectis, compositis. Post clysteres longan simplicibus quidem acatia, hypocistide, rhois succo, aut alio adstringēte sublinēdus est. Coacta enim ab adstringētibus caro corroboratur, aptitudinēq; ad animalculorum generationē amittit, atq; ascaridas ipsas excludit. Hoc verò & pueris, & qui perfectæ sunt ætatis conducit, efficacissimūque existit. Carnē veterē salitam, pinguedine dera-



sa, sublongam & rotundā formabimus, atq;  
ita adaptatam podici atq; sphincteri intru-  
demus: ligamentoque adhibito, quandiu su-  
stineri possint, inditam sinem<sup>9</sup>, deinde solue-  
mus, simulque ascarides illi adharētes educe-  
mus. Posthæc prædicta infundemus, atque il-  
linemus.

## DE HÆMORRHOIDIBVS SE-

DIS.

CAP. XV.

αἱμορ-  
ροΐδες.

Hæmorrhoides venarū in sede sunt expli-  
cationes dilationē sive, à sanguinis defluxu sic  
appellatæ. Harū aliæ cæcæ, quæ scilicet intum-  
escunt, & nihil aut parū admodū sanguinis

Apertæ.

excernunt. Aliæ apertæ, quæ videlicet certis  
quibusdam temporibus pāduntur, & sangui-

Causa.

nem emittunt. Fiūt autem hæmorrhoides,  
propter copiam sanguinis fœculēti & mela-

Signa.

cholici, quem iecur ad ipsas reponit. Signa  
verò per quæ affectus deprehēditur, satis ma-  
nifesta sunt. Oculis enim cōspiciuntur cæcæ,  
& dolorem vehementem, potissimum in ex-  
cernendo stercore, excitat. Apertæ sanguinē  
fundunt, qui latere sic laborātes haud potest.

Curatio  
cæcarum

Quum itaq; cæcæ apparuerint hæmorrhoi-  
des, & magnos in ano cruciatus excitauerūt,  
corpūsque plethoricum fuerit, vena poplitis  
aut malleoli incidenda erit. Aluus etiam affa-  
tim leniter subducentibus medicamētis mol-  
lienda, ne arida stercorea dū excernuntur, do-  
lorē faciant. Apponēda quoque ea sunt, quæ



dolorem, vbi vehemens fuerit, mitigare possunt. Ex quorum numero est mica panis in lacte macerata, & cū oui vitello decocta, & instar emplastri admota. Prodest etiā balneum ex decocto maluæ, foliis violæ, meliloti, fœnigræci, chamemeli, foliis althææ, semine lini, florib⁹ verbasci, & similibus apparatus. vel si eo vti non poterit, lanæ aut spongiæ in decocto illo madefactæ, dolenti loco adhibeantur. Quod si prædicta nihil contulerint, sanguinē ab iis elicere oportet. Quapropter cyclamini succum, aut cepæ, aut fel bubulum lana illitum intra anum imponere oportet. Idem etiam potest centaurii minoris succus, stercus columbinum, staphysagria, folium ficus, si cum eo fricentur, & medulla colocynthidis in oleo amygdalarum amararum macerata. Potissimum verò hoc emplastrum confert, quod R̄ stercoris columbini ꝑ s. seminis staphysagriæ, lupinorū añ 3 i s. amygdalarū amararū 3 i. medullæ colocynthidos 3 s. succi cyclamini, cepæ añ ꝑ i. misceantur singula, & ad formam emplastri reducantur, adiecto si opus erit, oleo amygdalarū amararū. Glandes etiam oblongæ ex radice cyclamini paratæ, in anum indi possunt. Hirudines etiam in harundine inclusæ, ita vt caput exerāt, hæ morrhoidibus vt adaperiātur, imponi solēt. Has vbi amouere nō poteris, cinere illarum capiti insperso decidere sua sponte facies.

Dolores  
sedantia.

Hæmor-  
rhoides  
aperien-  
tia.

Empla-  
strum.

Glandes.



Aperta-  
rum cura  
tio.

6. Epid.  
par. 3.  
ap. 29.

Vitus.

Curatio.

Ceterū si apertæ fuerint, & sanguinē modicè per certa intervalla fuderint, minimè suppressæ sunt: quòd huiuscemodi sanguinis eruptio hac passione detētos homines à multis malis immunes reddat. Id quod in primis testatur Hippocrates, qui sic scriptū reliquit: Habētes Hæmorrhoidas, neque laterū dolore, neque pulmonis inflammatione, neq; depascenti vlcere, neque furunculis, neque terminthis, pariter neque lepra, neque vitiliginibus corripuntur. Quòd si verò immodicè ac iustò largiùs sanguinem fundāt, sic quòd egri hoc malo cōtabescant, ac illorum robur dericiatur, suppressæ erunt: quòd aliàs periculum sit, ne aqua intercus, iocinore ob immodicā euacuationem refrigerato, sequatur. Cibi itaque erūt iis qui supra modū inaniantur pauci sanguinis, efficaces, & minimè recrementitii, quique siccant & adstringūt: cuius modi est alica & oryza. Ex oleribus intybus, cichoriū, portulaca, & similia. Cibis rhu obsoniorū, aut succus immaturarū vuarum admisceatur. Si vires plurimū prosternantur, carniū expresso, cui succus cotoneorū admixtus sit, alēdus æger erit. vina bibat astringentia. Ceterū si plenitudo corporis affuerit, venæ interioris in cubito dextræ manus sectio pderit. Sin minus, auersioni per cucurbitulas hypochondriis & iccori affixas studendum. In quem vsum manibus & brachiis



etiā vincula iniicere, & frictiones aperas adhibere cōuenit. Præterea intra corpus assumenda sunt ea quæ adstringūt, vt sunt syrupi rosaceus, myrthinus, cotoneorū, coralli rubei, bolus armenia, pastilli de succino, de ebore (quos de spodio hodie nomināt) de terra lēnia, & alia quæ in capite de cruēto sputo cōmemorata sunt. Extrinsecūs ea etiā apponenda, quæ sanguinem promanātem sistere possunt. Ex quorum sanè numero, Aëtio lib. 14. cap. 5. teste, aloë est, cū posca applicata. Idem etiā potest squama ferri, aut plumbū vstum. Vnicè autem confert medicamentum, quod describit li. 5. Ther. meth. Galenus. Id accipit thuris partem vnā, aloës partis vnius semisim. Hæc cum oui candido, donec ad mellis crassitudinē redeant, subiguntur, & mollissimo leporis pilo excepta vasis imponuntur, fascia ex tenui linceo forinsecūs alligata. Proderunt etiam vnguēta, balnea, infusiones, fomenta, & alia eiusmodi ex medicamētis adstringentibus: quorum multa in cap. de Diarrhœa, Lienteria, Dysenteria & Tenesmo dicta sunt, cōposita. Sacculos tamen in vino rubeo & adstringente priusquam adhibeātur, bullire, aut saltem eo irrigare cōuenit. Quapropter si qua hic desiderabis medicamēta, ea ex capitib. superiorib<sup>9</sup>, in quib. de sanguinis suppressione agitur, petes. Superuacaneū enim sæpius iisdem de reb. verba facere.



## DE PROCIDENTIA ANI. C. XVI.

- Causa.** 3 Accidit vt interdum propter resolutionem aut imbecillitatem muscutorū obliquorum sedem sursum reuellentū, anus procidat, atque adeò à duobus quidem relatis musculis non queat retrahi, sed manib. aut medicamentis auxiliatricibus egeat.
- Curatio.** Quod cū factum fuerit, cōsiderandum in primis, num anus ab inflammatione liber sit. tum enim statim impulsus, in pristinum locum protrudi ac reponi debet. vt autē intrusus ne iterum egrediat, retineri queat, adstringentia extrinsecus apponenda sunt. Primū itaq; oleo rosaceo calente circumlinendus, aut vino adstringente detergendus anus: ac deinde in suum locū repositus, deligādus erit. Idque faciendū statim vbi eger excreuit, ne cōfestim ad egerendum necessitas ipsum vrgeat, atque adeò iterum anus procidat. Linimentum ex acatia & hypocistide cū vino adhibendū. Incoquantur etiā in aqua donec rubescat, galla, ballastia, glandularum calices, malicorium, bellis minor (primulam veris nominant) rhu obsoniorum, cortices cotoneorum, & similia: & deinde ex huiusmodi decocto infusus & lotiones parentur. Possunt etiam postquā vino aut decocto adstringēti sedes abluta fuerit, arida admoueri ac inspergi medicamēta. In quem vsū confert bolus armenia, thus, sanguis draconis, galla acatia, myrrha, hypo



cistis, cornu ceruinum vstum, & similia, quæ ex superioribus sunt petēda. Porro si anus ob inflammationem tumidus imponi nequeat, vbi plenitudo fuerit, vena primū secāda erit, vomitūque ciendus. Sedi appōenda etiam quæ adstringunt & reprimunt: idque statim inter initia faciēdum. Quod si verò plenitudo nulla adsit, eger in seffione vtatur ex decocto chamemeli, maluæ, althææ, feminibus lini, scœnigræci, & similib⁹ parata. aut in aquā calidam conscendat, & ei ad tempus immoretur. Spongia etiam aut lana in decocto prædicto madesacta admoueat. Anus denique oleo chamemelino, aut anethino, quousque reponi possit, illinēdus. Postquā verò recōditus iam est, tum suprà commemoratis medicamentis adstringentibus, vtendum erit.

## DE RIMIS ANI. C. A. P. XVII.

Rimæ sedis, quas Græci Rhagades vocāt, *ῥαγάδες* sunt scissuræ quæ in musculo anum claudente, quem sphincterem nominant, aut in circulo & extrema ani corona fiūt, similes iis quæ in labiis ob Borææ flatum asperiorē accidūt. ob acrium humorum defluxum, aut inflammationem, aut condylomatū (quæ nihil aliud sunt nisi eminentiæ seu rugæ quædā, reduplicatis ani corpusculis præter naturā insurgentes) extensionē eueniunt. Si ab acris humorib. fiunt, ii primum omniū purgandi erunt. Si ob cōdylomata, itidem purgatione

Causæ.  
Condylomata.

Curatio.



Vnguentum.

inter initia vtédum. Alius denique toto curationis tempore mollienda, cibis humectantibus ac pinguibus, ne aridum stercus cōglutinationem remoretur. Ex eorum sanè numero sunt malua, spinachia, lac amygdalarum dulciū, oua sorbilia, iura pingua, & iis similia. Rhagadib. verò hoc vnguentū adhibendū, quod R̄ olei rosacei, myrthini añ § i. thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis añ ð i aloës, plumbi vsti, cerussę, balaustiorū, boli armenię añ ð s. ceræ albæ quod satis est, fiat vnguētum. Aut tale, quod accipit olei rosacei § i s. gallæ, myrrhæ, terrę lemnię añ ð i. radicis symphyti, aluminis scissilis, plumbi vsti añ ð s. oui assati vitellum, ceræ quod satis est, fiat vnguentum. Prædictis vnguētis ter die rimas circunungito, lotas prius decocto rosarum, gallarum & fidiorum, sic vocāt putamina malorum punicorum. Si patiētē partem ardor & inflammatio affligit, vnguento candido caphurato illinenda erit.

DE IMBECILLITATE IO-  
CINORIS. CAP. XVIII.

Causę.

Imbecillitas iocinoris ab intemperie ipsa producitur calida, frigida, humida, vel sicca. Calida intēperies, tum eos qui prius adsunt humores, tū etiam hos qui per venas mesenterii ad ipsum iecur deferūtur, adassat & cōburit. Frigida verò intemperies, pituitosum & crudum humorem, qui iam in ipso conti-



netur, crassum & lentum egréque mobilé red-  
dit: cum verò qui ad ipsum defertur, semico-  
ctum. Cæterum sicca intemperies, ficciores &  
densiores humores facit. Humida autem te-  
nuiiores & magis aquosos. Calida igitur iu-  
temperie circa iecur existente, colliquatiões  
fiūt, primū quidem humorū, deinde car-  
nis etiā ipsius iocinoris, & euacuatur per ven-  
trem bilis foetens ac crassa, abundēque colo-  
rata. Sitis denique infestat, appetentia deiici-  
tur, vrina rufa, pulsus celer est. Vbi verò frigi-  
da intemperies affuerit, neque assidue excre-  
tiones, neque multæ fiunt. Durat verò passio  
diutius, & per certos aliquot dies profluit  
ipsis vëter maiori copia. cæterum egesta nō  
similem foetorem habēt iis quæ per calorem  
sunt colliquata, neque colorem etiam, neque  
consistentiam, sed speciem præ se ferunt san-  
guinis putrefacti, & in grumos congelati &  
si quis diligēter consideret, neque sanguis ni-  
ger est, neq; grumus, sed veluti limus & fex  
quædam sanguinis crassi, proximè ad atram  
bilem accedēs. Quin plures & discretu iudi-  
catūve difficiles colores circa huiusmodi pas-  
sionē in excrementis apparēt. Reliqua etiam  
omnia priorib. contraria erūt. In ficcione au-  
tem intemperie, excrementa adhuc ficciora  
& pauciora videntur, egrīque magis sitiunt:  
In humida verò, humidiora & plura erūt ex-  
crementa, sitisq; minus infestabit. In huiusmo

Signa.

Curatio.



di igitur passionib. primus curationis scopus  
 fit, vt intemperiem ad contrariū reducamus.  
 Calidam enim intemperiem semper refrige-  
 rare oportet, frigidam verò calefacere, simili-  
 tēque humidam resiccare, & siccā humecta-  
 re. Ceterū omnibus iecorariis medicamen-  
 tis, tum quę per os sumuntur, tum quę forin-  
 secus imponuntur, aliquid ex adstringentib.  
 ammiscere oportet, quò firmitas ac robur vi-  
 sceris conseruetur. In calida igitur intēperie  
 quod ad victus rationem attinet, vtendū erit  
 ptisanę cremore, & aliis cibis mediocriter re-  
 frigerantibus, lactucis, intybis, cichorio, son-  
 chis, pane ex aqua. Pullis itē gallinarū, per-  
 dicibus, auibus mōtanis, carnib. vitulinis, cū  
 omphacio aut limonibus decoctis. Ex fructi-  
 bus vescātur passulis, limonibus, & amygda-  
 lis dulcibus. Vinū omnino circūciditur, nisi  
 alteram ob causam, nempē ventriculi imbe-  
 cillitatem, hoc requirant. tum enim tenue &  
 dilutum aliquod exhibendum. Bibāt autem  
 pro vino succum malorum punicorum, & sy-  
 rupum acidū, simplicem, oxysaccharāmq;,  
 cū decocto hordei, aut intybi domestici. Ar-  
 cēdi autem in summa ab omni cibo & potu  
 melle condito, & admodum calido ac inci-  
 dente. Per os denique, quod ad medicamen-  
 torum rationem attinet, sumant saccharum  
 rosaceum, diarhodōn abbatīs, & diatriasfan-  
 tali confectiōes. Aut confectiōem hanc

Calidæ  
 intempe-  
 rici.



que R<sup>x</sup> specierū diarhodōn abbatis, diatriasantalī añ 3 i s. seminum intybi domestici vtriusque, rosarum rubearum añ 3 ii. santalorum alborum, cassuthæ, floris iunci odorati añ 3 i. passularum 3 i. sacchari 6 vi. dissoluti in aquis cassuthæ & endiuia, fiat confectio rotūda. Quin & Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem aliquando calidā iccoris intēperiem mirabiliter sanauit. Extrinsecus adhibeantur fomenta ex rosaceo, chamemelino, cotoneo que oleis parata. Aut absinthium, aut palmulę prædictis oleis incoquantur, & in iis lana aut spōgia madefacta, ei loco, vbi iecur sitū est, imponatur. Potest etiam huius vnguenti esse vsus, quod R<sup>x</sup> oleorum rosacei, cotoneorum, nymphæe añ 6 i. santalorum alborum & rubeorum, rosarum rub. añ 3 i. ramentorum eboris 3 i s. seminis intybi domestici vtriusque añ 3 i. aceti 3 i s. caphuræ gr. ii. ceræ quod satis est, fiat vnguentum. Epithemata etiam in hoc affectu nō parum conducunt, quę in hunc aut similem modum parabūtur. R<sup>x</sup> succi intybi domestici latifolii, lactuce, oxalidis, rosarum, nymphæe añ 6 iii. succi semperuiui 6 i s. aceti 6 i. rosarū rub. santalorum rub. ramentorum eboris añ 3 i. specierum diarhodōn abbatis, diatriasantalī añ 3 i s. caphurę 3 s. misce, fiat epithema. Frigidæ Adhibeantur autem epithemata estate frigida actu, hyeme verò calida. Vbi autem frigidi.

Vnguentum.

Epithema.



da in iecore intemperies fuerit, calefacientibus, ac robur addentibus vtendū est. vtantur itaq; cibis concoctu facilibus & calefacientibus. Ex olerib<sup>9</sup>, satureia, hyssopo, fœniculo, oreoselino, abrotano, salua, & similibus. Cibī cōdiantur aromatis calefacientibus, cinamomo, gariophyllis, & iis similibus. vinum bibāt tenue, fuluum, & odoriferum. Fugiant esum piscium, fructuum frigidorum, ocium, & quicquid refrigerare iecur potest. Per os fumant hoc decoctum, quod R<sup>x</sup> radicū apii, fœniculi, oreoselini añ ʒ i eupatorii (quod a grimoniam hodie vocant) hyssopi, mēte, absinthii, cichorii, cassuthę, origani, calaminthę, asari añ m i. seminū ani si, fœniculi, dau-ci, cumini, carei añ 3 ii. iūci odorati 3 i s. mastiches 3 i. florū chamæmeli, rosarū rub. añ m i. cinamomi electi 3 i s. Bulliant omnia in lb i s. vini, & aquę fontanę lb i. donec tertia pars absumpta fuerit, dein colentur, & colaturę adiciatur syrupi de eupatorio ʒ iii. syrupi de absinthio ʒ i. misce, fiat potio. In hūc vsum cōferunt etiā confectiōes calefacientes, diacina momi nimirum, dianisi, conferva saluę, acorum conditum, pimpinellę radices cōditę, & huiusmodi. Extrinsecus illinēda olea calida, nempe nardinū, chamæmelinum, absinthinū, & similia. Confert hoc vti Vnguentum. quod R<sup>x</sup> oleorū absinthini, nardini añ ʒ i s. succi eupatorii 3 ii. cinamomi, ga-



riophyllorum, ligni aloës añ 3 ii. spice, iunci odorati, mastiches añ 3 i. ceræ quod satis est, fiat vnguentū. Potest etiam vsus esse eius ce-  
 Ceratum  
 rati, quod R̄ farine fœnigraci, lupinorū añ 3 ii. radice iridis, asari, añ 3 i. eupatorii, absinthii, meliloti, iunci odorati, añ 3 s. gallie moschatae i. seminū anisi, fœniculi añ 3 s. mastiches 6 ii. myrrhe, thuris añ 3 i. oleorum mastichini, nardini, rosacei, anethini 6 i. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratū. Et istius epithematis, quod R̄ se. anisi, fœniculi, ammeos añ 3 i. s. cinamomi, gariophyllorū, iunci odorati añ 3 i. Decoquatur in lb̄ i. s. aquæ vsque ad medietatis absorptionem. Coletur, & colaturæ adiciatur succorum absinthii, eupatorii añ 6 ii. specierum diacynamomi, diagalangæ añ 3 i. cassuthæ 3 ii. aceti 3 ii. misce, fiat epithema. In humida autem intemperie victus ratione deficcante vtendum, carnibus nimirum volucrum assis, vino tenui, & sudores mouentibus, laconico, balneis naturalibus. Parum verò bibendum accomedendum: pisces quoque in vniuersum omnes, ac fructus quibus humectandi vis inest, deuitādi. Per os sumendus syrupus de absinthio, diallacæ & diacurcumæ confectiones. Extrinsecus etiam quæ exiccant citra insignē calorem, adhibēda, de quib⁹ oībus infra in ca. de Anasarca copiosè dicem⁹. Sicca iccoris intēperies Sicca in-  
 Humidæ intemperiei.  
 haud secus atque hectica febris curatur, hoc tēperiei.



solo quòd suprà monuimus nō neglecto, vt  
semper humectatibus medicamentis misceā-  
tur, quæ robur visceri addere possunt. Et vt  
rem paucis perstringamus, in sicca intēperie  
balnea sufficiūt dulcium aquarum, & hume-  
ctans victus ratio, de quibus in curatione fe-  
bris hecticæ copiosissimè dicemus. Ex hoc  
itaq; loco petenda erunt, quæ hic desideran-  
tur. Ceterum inter ea quæ à proprietate toti⁹  
substantiæ, efficacia existunt, optimum est lu-  
pinū iecur: quod sanè diligenter tritum, dra-  
chmę vnus pondere cum vino dulci aquâ ca-  
lidâ diluto præbetur. Hoc em̃ multiplici ex-  
perimento cognitum, omnibus iecoris intē-  
periebus cōmodum existit: vtpote proprie-  
tate totius substantiæ hanc efficaciam habens,  
non calefaciendo, aut refrigerando.

DE OBSTRUCTIONE IOCI-  
NORIS. CAP. XIX.

**Causa.**

Iocinoris obstructio à flatibus vaporosis  
& crassis, concoctūq; difficilibus fit. Interdū  
autem & à crassis viscosisq; humoribus, in fi-  
nibus venarum ex sima iocinoris parte ena-  
tarum, per quas ex ventre & intestinis alimē-  
ti digestio ad iecur contingit.

**Signa.**

Porro quum  
vaporosi & crassi flatus multitudo coacerua-  
tur, quæ exitū nō habet, atq; adeò obstructio-  
nem efficit, nō grauitatis circa dextrum hy-  
pochondrium solū, sed & distentionis sen-  
sus oboritur. Obstructionē verò à crassis vi-



scidisq; humoribus cōsequitur grauitatis cū dolore sensus, aliquādo quidē obtusē aliquādo verò vehemētis: & quādoq; quidē absque febre, quādoq; cū febre. Crassa enim & vilcosa ac multa, omnino amplius reliquis obstruunt, & maximē quādo agri à cibo vehementiori motu vtuntur. Si verò acria sint & multa quæ in cibo sumuntur, dolor ex obstructione vehementior fit, quū obturata corpora simul & tensionem perferant, simulque punguntur. Cibi his dandi sunt calidiores, & qui aperiendi obstructiones facultatem habent: nempe porrum ex oxymelite, asparagū, fœniculum, oreoselinum, cappares, reliquæque obsonia ex condimento aliquo calefaciēte, quodq; obstructiones auferat, incocta. Vitanda sunt alimenta crassi succi, balnea, & exercitia à cibo. Vino vtatur tenui, ac veteri. VI.

Victus.

tra victus rationem attenuantiū quoq; & obstructionē tollētium medicamentorū quàm celerrimus requiritur vsus: obstructio enim inueterata nō tantū in iocinore, sed in omni corporis parte putrefactionem operatur, febremque accendit. Præclarè autem & citra molestiam ab obstructione leuant inter simplicia medicamenta lupi iecur, fumaria, eupatorium, chamæmelinum, acori radix, dracūculi radix, asarū, anisum, apiū, ablinthiū, casia, iris, glycyrrhiza, rha ponticum verū, lupini, cappares, ammi, cassutha, oreoselinum,

Curatio.

Simpli-  
cia ob-  
structio-  
nē tollen-  
tia.



pistacia, amygdalæ amaræ, spica nardi, stæ-  
 chas, gentiana, plantaginis radix, semē & fo-  
 lia sicca, anagallidis fœminę succ<sup>o</sup>, cichoriū,  
 halicacabū, intyba vtraque, asparagus, & ru-  
 scus. Ex iis varia componi medicamēta pos-  
 sunt, potissimum verò decocta, adiectis oxy-  
 melite simplici, scyllitico, syrupo acido com-  
 posito, de absinthio, hyssopo, calamintha,  
 marrubio, & similib<sup>9</sup>. In hūc vsum exhibēdi  
 etiam pastilli de eupatorio, de absinthio, de  
 rhabarbaro, & similib. Conferunt etiam con-  
 fectiones dialaccæ & diacurcumæ. Inter cæ-  
 tera autē nō solū iucundum, verumetiam  
 vtile est, vt pistacia decē aut duodecim per  
 noctem in vino Aruifio (quod corrupta voce  
 malmasinum hodie vocant) macerata, in au-  
 rora coctione iam facta sumantur. Extrinse-  
 cis etiā admouēda epithemata, vnguēta, em-  
 plastra & cerata, quæ in cap. superiore de cu-  
 ratione frigida intēperiei iecoris dicta sunt.  
 Hæc medicamenta sufficient, si malum non  
 inueteratum fuerit. Si enim in vetustatē in-  
 cidat, venæ etiam sectio, & purgatio, si nihil  
 prohibet, adhibēda erūt. In hunc vsum exhi-  
 bēda catapotia de rhabarbaro, de agarico, &  
 similia medicamēta, quæ crassos & lētos hu-  
 mores per aluum purgare possunt. Vacuato  
 iā corpore, ea quę suprā cōprehēsa sunt, pro-  
 pināda medicamēta erūt. hoc autem potissi-  
 mum eclegma, quod & radicis iridis, radicis



chamēpityos, seminū fœniculi, anisi, apii, añ  
3 ii. alari 3 ii s. cinamomi, zingiberis, carei,  
chamēmeli añ 3 i. stœchadis, gentianæ, mar-  
rubii añ 3 ii. cum oxymelite scyllitico quod  
satis est, fiat eclegma. Hoc mirificè obstru-  
ctiōnes, non solū eas quæ in cauo, verū etiam  
quæ in gibbo iocinoris hærent, quandoqui-  
dem per vrinas vehementer expurget, tollit.

## DE INFLAMMATIONE IO-

GINORIS.

CAP. XX.

In iocinore perinde atque in aliis vitæ. *Causa.*  
ribus, ob easdēq; causas, fit inflāmatio. In. *Signa.*  
flāmato aut iocinore omnib<sup>9</sup> quidē ex equo  
in dextro hypochōdrio dolor & grauitas est  
qui suprà ad iugulū vsq; , infrā aut ad spurias  
costas peruenit. Tumor quoq; dextri hypo-  
chondrii consequitur. Huic dolori accedit fe-  
bris acuta, rufsis exigua & sicca, sitis inexhau-  
sta, cibi fastidiū, difficultas spiritus. Lingua  
primò rubicūda apparet, postea nigra: bilem  
vomūt purā, atq; etiā vitellinā, post aut & e-  
ruginosam. alu<sup>9</sup> adstringitur, color corporis  
subuertitur in arquati morbi speciē permu-  
tatus, singult<sup>9</sup> quoq; cōsequitur. Accessionis  
etiā tempore quidā delirio apprehēduntur,  
& acrem vrinā excernunt. Quando verò pri-  
uatim caua iocinoris inflammationē patiun-  
tur, nausea, vomitus, cibi fastidium, & ardor  
ac sitis intenduntur. Si verò gibba ipsius in-  
flammatio exercet, præter alia superius com-



memorata, tumor manifest<sup>9</sup> quoq; in superficie oculis & tactui conspicuus est. Hęc quidem vehementem grandemq; inflammationem testantur. Sin obscura quędam fuerit, iubeamus egro magnam edat respirationem. Et si dextrū hypochondrium dolere asserat, moderata iecoris inflammatio censebitur.

Quod si iuxta situm incubentium iecori musculorum oblōgus inflammationi tumor appareat prædictorum nullo præsentē, illos ipsos inflammationē laborare agnosceamus. Porro iecore inflāmato, sanguinis detractiōne experiri oportet, si nihil id fieri impediāt. Incidenda autē in dextro cubito vena interna, ita vt substratam arteriam obseruemus: quę si non appareat, media: si verò neq; ipsa appareat, superior. Copiosus autem, & quantum satis est, si vires ferre queant, educēdus. Sanguinis missione factā, post modicum interuallū, simplici ac leui clysteri aluus eluēda, maximē si non spōte egerat. Extrinsecus cucurbitæ cum scarificatione affigendæ. Fomentis etiam vtēdum ex lanis oleo imbutis, cataplasmatibus, ceratis, & epithematis. In quibus adhibendis in summa hoc præcipiendū est, vt adstringentia emolliētibus semper admisceantur. Fomētū itaque fiat ex oleo coto-

Fomētū.

neorū, aut mastichino, aut rosaceo, aut myrthino, adiecto vino odorifero. Aut adhibeatur spongia madefacta in decocto absinthii,



meliloti, rosarum rubearū, chamæmeli, plantaginis, intybi domestici (quam endiuia vocant) & similium. Cataplasmata verò, & emplastra ex semine lini & fœnigræci, farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus, in hūc modum componēda sunt. R̄ farina hordeacea ꝯ s. carnis cotoneorum contusa 3 iii. absinthii, florum meliloti, iunci odorati añ 3 ii. feminis lini 3 i. oleorum rosacei, cotoneorum, chamæmeli absinthini añ ꝯ s. aceti ꝯ i. misce, fiat emplastrum. Cerata sic confici possunt. R̄ carnis palmularum 3 iii. myrrhæ in vino veteri adstringente macerata, styracis, mastiches añ 3 ii. florum meliloti, comæ absinthii, chamæmeli añ 3 i s. croci 3 s. oleorum cotoneorum, mastichini, rosacei añ ꝯ i. ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratum. In hūc vsum etiā epithemata ex decocto herbarum supra nominatarum, aut succis rosarum, plantaginis, absinthii, chamæmeli, & similibus componi possunt. In quibus omnibus componendis vnicè studendum, vt adstringentia vbi vehemens adhuc est inflammatio, relaxatibus & emollientibus præualeant: cōtrā verò remittenti vehementi calore, emollientia adstringētibus. Cauendū prætereā, ne prædicta actu frigida admoueantur, sed prius modicè calefacta. Porro in inflammatione iecoris vbi magni circumstent dolores, etiam medicamēta

Emplastrum.

Ceratum

Nihil actu frigidum iecori in-



flamma dolorē leuātia in potu sunt exhibenda: ita ta-  
 tione la- men, vt assiduus eorū vsus deuitetur. Simpli-  
 boranti cibus autē potionibus frequentius vtēdum.  
 adhiben Senecionis itaq; decoctum tanquā maximē  
 dum. commodū, aut succus glycyrrhizæ cum aqua  
 calida exhibendus. His nō minū cōfert inty-  
 borū succus, adiecto modico melle. Ad hoc  
 enim q̄ refrigerat, ac firmitatē visceri addit,  
 etiam ora venarum iecoris expurgat. Cate-  
 rū aluus etiā irritanda est, vrticæ vel mer-  
 curialis coctōrū esu. In declinatiōe etiā mor-  
 bi aluus per clysteres inaniri postulat. In quē  
 vsum polypodium & epithymum ex mulsā  
 porriguntur. idque potissimum, si in cauo vi-  
 sceris fuerit inflammatio. Caua enim iecoris  
 per aluum, gibba verō per vrinas expurgan-  
 da sunt. Porro in iecoris inflāmatione, ex-  
 quisitissimo victu, Galeno lib. 13. Ther. met.  
 monitore, est opus. Poscit autē iecur ipsū  
 cibos, qui obstructa recludāt. Talia verō o-  
 mnia sunt tenui consistentiā, & quæ citra ro-  
 sionē detergunt: cuiusmodi est ptisana, mul-  
 sa. Alimentū igitur optimum est sic patienti-  
 bus, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit.  
 Ius etiā pulli gallinacci, in quo oreoselinum  
 decoctum sit, dari potest. Bibat mulsam, aut  
 decoctū hordei, vel intyborū domesticorū.  
 Si inflam- Cæterū si inflāmatio, principiū permu-  
 matio tationis ad suppurationē iam suscepit, tū o-  
 ad sup- mnia prædicta augebuntur, dolores nimirū,



febres, deliriū, anxietas, cibiq; fastidiū. Adiu- puratio.  
uare igitur permutationē ac puris eruptionē nē tēdat.  
oportet, vt quā celerrime fiat, ne maiora Maturan  
inde corpora corrumpantur, per vsum vide- tia.  
licet istius cataplasmatīs, quod R<sup>x</sup> radicis al- Cataplas  
thææ § i s. seminis fœnigræci, lini añ ii. folio- ma.  
rū althææ, maluæ añ m ii. caricarum numero  
vi. Bulliant in aqua donec mollescāt, dein cō  
tundantur, & fiat cataplasma. Neq; verò in-  
conuenienter etiā emplastra, quæ puris per- Empla-  
mutationem iuuare possunt, adhibētur: qua- strum.  
le est quod R<sup>x</sup> farinæ hordeacæ, farinæ fœ-  
nigræci añ 3 iii. radicis althææ 3 iii. s. radicis  
liliorum alborū 3 i s. seminis lini 3 i. florum  
chamæmeli, meliloti añ p. i. Bulliant omnia  
in aqua, donec ad mellis crassitudinem per-  
ueniant. deinde adde olei chamæmelini § i.  
olei liliacei § i s. & bulliant iterum, fiatque  
emplastrum. Ex prædictis possunt fieri cera-  
ta adiectis butyro, ladano, resina, & cera.  
Quum autem perfecta suppuratio fuerit, do-  
lores remittēt, omnesque accessiones mitio-  
res apparebunt. Cæterum rupturæ tempore  
dolor rursus magis augeſcet: quare etiā tūc  
rupturam adiuuare oportet, per stercoris ca-  
prini & columbini, seminis vrticæ, sinapi, a-  
liorūque ad superficiem attrahentiū vsum:  
& per potiones calorigicas, vt est decoctū po-  
lii, fumariz, radicis chamædryos, & thlaspe- Abster-  
os. Facta ruptione, aqua mellis, aut ciceris gentia.



decoctum, aliâque quibus abstergerendi facultas inest, quæ infra in capite de renum exulceratione commemorabuntur, propinanda. Et si puris transmissio per venas fit, vrinam mouentia admiscenda sunt: Sin per aluum, ea quæ leniter subducunt, serum nimirum caprinum, tamarindi, cassiâque fistularis exhibenda. Dein facta absterfione, quæ conglutinare possunt, propinanda.

## DE ICTERO. CAP. XXI.

*ἰκτερος.*

*Causæ.*

Icterus est bilis, modò flauæ, modò atræ, per vniuersum corpus effusio. Latine regiam & arquatam passionem vocant. Celsus etiam auriginem appellat. Harum omnium appellationum causas alibi explicauimus. Fit interdum iecore nihil patiente bilis effusio ad cutem in morborum iudicationibus. Nonnūquam vbi citra febrem sanguis ab extranea aliqua occasione corrumpitur, ac biliosus efficitur, sicut à venenatarum bestiarum morfibus contingere consuevit. Quin & fieri potest propter inflammationem, aut naturalis temperiei iocinoris aut lienis permutationem. Fit etiam aliquando ob imbecillitatem vesicæ bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, veluti consuevit, in se se ex iocinore non attrahit, & ob id impurum sanguinē relinquit. Aliquando autem propter obstructionem, aut debilitatem vasorum, quorum ora ex ea ad iecur deferuntur, biliosum humo



rem non attrahit, atque adeò icteron efficit. Interdum etiā fit propter meatus, qui ad intestina vadit, obstructionē. Quare ad icte- Signa.  
 ri causas probè discernendas, excrementorum figura & color necessariò cōsiderantur, quum in aliquibus multum colorata per flavam bilem appareāt, quemadmodum etiam in aliis vrinae. In quibus enim ratione indicationis bonæ in febrib⁹ biliosus humor ad cutem prorumpit, iis & excrementa & vrinae naturali modo se habere videbuntur. Si autē cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio gravitas adsit, feruens iecoris inflammatio significatur, cuius vi sanguis in bilem mutatus, per vniuersum corpus defertur. Sin feruor citra gravitatem in ipso substat, ex sola calida iecoris intemperie vitium gignitur. Quibus verò citra febrem vnā cum gravitatis alicuius sensu circa dextrum hypochondriū alba excrementa deiiciuntur, in his vesicę bilis suspensæ meatus obstructionem esse factam putandum est. Si verò citra gravitatem talia deiiciantur, vires esse infirmas, aut attractricem quæ ex iecore attrahit, aut eam quæ ad intestina propellit, existimandum. Sin iis etiā vrinae biliosissimę affatim excernuntur. Porro in quibus atræ bilis humor vnā cum sanguine ad cutē est delatus, hi omnino gravius patiuntur. Consequitur enim ipsos tri-



fitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa ventrem sunt, difficultasq; spirandi: & cibos auersantur, & nigras vrinas excernunt. Stercora verò chalcanti colorem referunt, & alius iis magis resiccatur. Cæterum eos qui ex pallida bile regium morbum contrahunt, nulla mordacitas eorum quæ circa ventrem sunt cõsequitur, neque etiam in tantum auersantur cibos. Stercora alba egeruntur: vrinæ autem crocei coloris, turbatæ tamen permanēt. Cõmuniter autem omnibus ictericis pigrities ad mortū accidit, & ad dulces cibos animum habent alienatum. Pruritus etiam vniuersi corporis comitatur. Alba oculorum, & partes faciei temporibus propinque, itēque malæ pallorem ostendunt. venæ etiā sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humorem significant. Ictericus igitur, qui ratione bonę iudicationis febribus perfectè solutis fiunt, facillimè curatur, si lauacris aquarum dulcium vtantur, ac olei discussorii perfrictione, omnibûsq; quæ cutem rarefacere possunt: qualia sunt, oleum chamæmelinum, anethinum, irinum, & similia. Victus quoq; rationem vniuersam in iis humectiorem constituere oportet, & vt humorum crassitudinem attenuare possit. Qui ex virulētorum animalium moribus ictero corripuntur, curandi ferè sunt sicut ii qui à rabido cane morfi sunt: de quibus suo loco

Curatio.  
Si ratiõe  
indicatio  
nis bonæ  
accidat.

Si ex mor  
fu virulē  
torum.



diximus. His qui ob calidam iecoris intem- Si ob in-  
 perie, aut inflammationem arquati sunt, cu temperie  
 ratio superius cōprehensa, vbi de Iecore age aut inflā-  
 batur, admouenda erit, eamque integram in mationē  
 hoc caput transferre oportet, ne eadē nobis iecorie.  
 sint sæpius repetenda. At si propter obstru Si ab ob-  
 ctionem vesicę fellis susceptricis fiat icteros, stru ctio-  
 tum duo maxima remedia principatum ob- ne.  
 tinēt, sectio venę, & purgatio. In quibus igi-  
 tur multitudo sanguinis vnā cū bile in toto  
 corpore abundat, & quos circa iecur aut lie-  
 nem grauitas aut distensio infestat, in iis ni-  
 hil venę sectione commodiūs fieri potest, si  
 nulla alia re id facere præpediaris. Secāda ve Venę se-  
 rò est vena, in dextro cubito interna, iecore ctio.  
 patiente: liene autem, in sinistro. sanguisque  
 particulatim & per vices est detrahendus, ne  
 per coaceruatā euacuationē vires ægri pro-  
 sternantur. Neque verò ineptē clyster adhi-  
 betur, si à venę sectione excludimur. A venę  
 autē incisione etiam non incōmodē clyster  
 iniicitur, qui propter stercorum euacuatio-  
 nē spirādi facilitatē inducit: intestināq; irritā  
 do ac mordēdo, humores ad cutis superficiē  
 delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Sit verò ta-  
 lis, aut huic similis. R̄ intybi vtriusq;, marru-  
 bii, eupatorii, adianthi, orihani, absinthii, añ  
 m i. seminū anisi, fœniculi, oreoselini, aspara-  
 gi, añ 3 ii s. radicū glycyrrhizę, apii, fœniculi  
 añ 1 i. Bulliāt in aqua sufficiēti. dein colatu-  
 p iiii

Clyster.



re. R̄z § xiii. casia fistularis § i. hierē picra § s.  
 eclegmatis de succo rosarum 3 ii. oleorū ane  
 thini, irini añ § i s. salis 3 i. fiat clyster. Ceterū  
 purgationes huic morbo magis proprię & fa  
 miliares sunt, sic tamen vt eduliis & potioni  
 bus itēque medicamētis humores prius at  
 tenuentur. Cibis itaq; vtendum concoctu  
 facilibus & extenuantibus volucris mōta  
 nis, piscibus saxatilibus, olerib<sup>9</sup> quę vrinam  
 cient, præsertim intybis, asparagis, smyrnio,  
 foeniculo, & similibus. Carnes ferinæ māsue  
 tis magis sunt aptę. Pro liquamine seu embā  
 mate valet acetū, in quo aristolochia macera  
 ta sit. A fructibus abstinendum. Bellaria sint  
 amygdalę, sed modicē sumātur; & cicer, mo  
 dicē torrefactum. Eius etiam decoctum assi  
 duē potatum, non parum confert. Vinū con  
 venit albū & tenue, nō valde vetustū. Quod  
 ad medicamenta ipsa attinet, sumēda sunt q̄  
 in cap. de obstructione iecoris, & in lib. i. de  
 Extenuandis pituitosis humoribus cap. 8. di  
 cta sunt. Potissimū verō apii, adianthi, ca  
 laminthes, verbenacę rectę, rubię radice,  
 aristolochię, serpilli, hypericiq; decoctum.

Purga  
 tio.

Extenuatis iam & præparatis humoribus,  
 pharmacum quod flauā bilem purgat, exhi  
 bendum. Sunt autē purgationes ictericis dā  
 dæ fortiores: ob ventris enim siccitatē imbe  
 cilliores, inefficacēsq; in ipsis cognoscuntur.  
 Quę autē præ aliis cōferunt, est dilutū Rha-



barbari Li. I. cap. 7. descriptū, ac hierapicra, eclegma de succo rosaceo, de psilio, & diaphoenicōn. Quod si primo purgāte medicamēto nihil proficias, rursus ad ea quib⁹ obstructiones tollendi facultas inest, reuertendum, & post triduum rursus violentius purgandum. Si liene patiente malum oriatur, ad caput de Melancholia & obstructione lienis recurrendum. Postea quæ viscera repurgāt, Viscera exhibenda sunt medicamenta. In quē vsum vtraq; re- radix cyclamini trita potata cōfert. Hæc e- purgan- nim nō solū repurgat viscera, verum etiā ad tia. bilem in vniuersa cute excludendā per sudorem aptissima. Quare post eius potionem sudoris exclusionem per velamenta ac cōcoctionem in lecto iuuare oportet. Dātur ex ea drachmę duæ, aut tres, ex aqua mulsa. Preclare quoque facit corticis raphani succus, vino meraco dulci permixtus, aut vino mulso, ita vt succi ḡ ii vini ḡ i. contemperentur. vermes etiam terreni exiccati, & vino mulso per triduum dati ictērū per lotium eiicient. Item cassuthæ succus mirificē etiam prodest. Ceterū medicamenta quæ in potu accipiuntur, omnia, si fieri potest, in balneo exhibeātur, vbi nimirum ægri in solium calidū conscenderint. Plurimum quoq; diætæ virium refo-cillatrici hoc tempore intentum esse oportet per quā facultas excretrix reparetur, & si qua pars læsa sit, corroboretur, ac præsens coloris



corruptio repurgetur. Quapropter cōueniūt exercitia, gestationes, inunctiones ac exudationes. In hunc vsum pyriateria cōferunt, in quib. oleum, in quo serpillū aut rosmarinus herba decocta sit, corpori illinēdum. Quod color o- si verò quippiā ex ictero circa faciem & oculorum' los relinquatur, vrinæ autem appareant puræ, aluiſque consueto more egerat, narium & faciei ræ, aluiſque consueto more egerat, narium ut amo- infusis vtendum. In quem vsum cyclamini uendus: succus, item nigella cum aceto, anagallidis & betæ succus infunditur. Acetum etiam accerrimum naribus attrahat æger in folio descendens, cōtineatque pressis naribus paulisper, & mirificè vacuabitur.

## DE AQUA INTER CUTEM.

## CAP. XXII.

Aque inter cutem species. Alia enim Ascites, alia Tympanites, & tertia Anasarca, Hyposarca, Sarcites, & Leucophlegmatia dicitur. Ascites est, quum inter mēbranam peritonēum appellatam, & intestina plurimus aquosus humor coaceruatur. sic dicta, quod ἀσκή, id est vtri modo membrana ipsa repleta esse videatur. Tympanites est, vbi flatus ac spiritus superfluous plurimus in iisdē ventris locis congregatur. Anasarca est, vbi per vniuersam corporis molem humor disseminatur, vt instar spongiarum aut papyri vniuersa caro permade facta appareat. Fit hydrops, ob insignem iccoris



frigiditatē, aut ob alias partes vehemēter refrigeratas, quę iecur in eundē affectū deducere valēt. Coafficitur autē iecur lieni refrigerato, aluóq; & intestinis, maximē iis quę iuxta ieiunū intestinum sunt, pulmoniq; & renibus ac septo transuerso. Contingit etiā ex immodica hæmorrhoidū euacuatione, aut ex fluxu mēstruorum, aut eorūdet̃ retētiōe, aut ab alia quadā magna veteri affectiōe, duritiē nimirum, aut simili. Multi autem & à podagra & coxendicum dolore vexati, aquam inter cutem inciderunt. Frequentissimē autē eos qui malo corporis habitu præditi sunt, item ab ictero infestatos, hydrops consequitur, celiacam item affectiōem & dysenteriam. Cōmuniter omnis hydrops spirādi difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & vitiatum colorem inducit, ex virore nimirum albicantibus ægris. Fastidiunt etiam cibum, potum autem largiorem appetunt, maximē qui ex ascite laborant. Etenim humor qui in locis detinetur, salū est & putrefact⁹. quare febris etiā sequi vt plurimum solet. Aquā inter cutē minus fœminæ q̃ viri tētātur. Inter cōmemoratas tres species tympanites omnino periculosa, minus eā ascites, deinde hypofarca. Viātus autem omnibus hydropicis cōmunis est, vt vniuersus cib⁹ facilis cōcoct⁹, & sufficienter coact⁹, atq; aridus sit. exolutus enim & humidus, aptus est

Signa.

Signa.

Viātus.



ut in aqua sitatem commutetur. Panis itaque optimus clibanites, qui salem, ammi, & fœniculum, anisum, aut cuminum habeat admixtū. Debet is etiam probè fermentatus esse. sic enim minus adstringit, aut obstruit. Ex avibus conveniunt sicciores, velut perdices, turtures, turdi, merulae, & similes. Ex terrestribus capra sylvestris, lepus. Ex māsuetis, pulli galinacei assati, extremæ suum partes. Ex aquaticis, cancri fluviatiles. Ova etiam assata profunt. Olerum rarus sit usus: quæ verò eis exhibentur, acriora sint, & extenuandi calefaciendiq; vi prædita: velut est apium, oreoselinū, daucus, eruca, pulegiū, brassica, allia cocta, cepæ, porri capitati. A leguminibus verò abstinentum in totum. Pro liquamine utantur aceto cū pipere, cinamomo, & similibus. Sales sint ex fœniculo, hyssopo, rosmarino, apioque compositi. In potu tantū præbendum, quantum ad frangendam aliquo modo sitim sufficit: incōmodus enim est hydropicis plurimus potus. Vinum autem bibant tenue, & quod urinam ciet. Dulcia verò vina, & vinū mulsum vitāda. Acetum autem mirificè illorū sitim restinguit. Porro maximam ciborū partem in cœna accipiant. Plurimos fructus, & secundas mensas vitent. Cōcedendæ tamē nuces, amygdalæ, mala punica, pyra cocta, accaricæ: omnia moderatè, neq; omnia quotidie. Lectus non valde mollis sit, præsertim



iis qui anasarca laborat. Substernatur autem herbae resiccantes: velut est pulegiū, calamintha, origanum, & similia. Mirū est enim quantum eiusmodi resiccent per somnum, ut constet iam quosdā frumenti aceruis obuolutos & absconditos à somno surrexisse firmos. Exercitationes etiam, si sol adsit, in sole fiant: capite tamē velato: Sin frigus sit, in domib. per subiectū ignem cōcalefactis, aut iuxta ignē. Expedit verò imprimis equitatio, & huc & illuc in cathedra circūferri. Ceterum pedibus, si per vires laborantis fieri potest, deambulare multū, & quādoque currere, quā gestari satius est. obuoluendi etiā acri in pellibus sole vstis, aut in arenā calidā defodiēdi. Post exercitia sudores per lintea asperiora extergantur. optimē quoq; cōducit, si quōtidie ter quaterve frictione utatur. Hæc enim meatus conuiuentes aperit, humores desiccat, extenuat, atq; difficit. Valde itaque celeriter & sudores elicit plurimos, & carnē cogit. Perfricandi autē sunt manibus aridis, aut ex sale in aqua aut oleo calefaciēte trito. Post hæc cum aqua aluminosa, aut sulphurea, aut salsa lauari. Aliquib. enim qui hyposarca correpti fuerunt, & ad huiusmodi balnea adsueuerūt, ea ipsa tum ad deterēdum morbum, tum ad habitum valentiorē reddendum suffecerunt. **Quantū autem ad curandi rationem attinet, Curatio.** omnibus hydropicis commune remediū est



statim inter initia humoris abundantis euacuatio quę vel per venę sectionem, vel medicamēta purgātia, vel vrinam mouentia, quę admodum in sequentibus particulatim cuiusque speciei hydropis curationem tradituri dicemus, fieri potest.

## DE ANASARCA. CAP. XXIII.

**Signa.**

In anasarca totius corporis moles, & vniuersa caro (vt dictum est) instar spōgię madida ac laxa apparet, atque adeo totum corpus

**Curatio.** intumescit, ac mortuo simile euadit. Curatio à sanguinis detractiōe auspicāda, maximē si passionis origo ex hæmorrhoidib<sup>9</sup> aut mēstruis suppressis est, & virtus atque ætas permiserint. Hac enim ratione plenitudo quę infestat exhauritur, & languētis natura exonerata alacrior fit, & mali causa minuitur, & deinde necessariō minore negotio redit sanitas. Præuis humorib. per venę sectionē detractis, ad purgantium medicaminum præsidia deueniendum. Quod si tamē extenuatione ac humorū ad expulsionem præparatione opus sit, decocta & alia quę suprà in capitib. de Iecoris imbecillitate & obstructione dicta sunt, exhibeantur. In quem etiam vsus syrups de absinthio, de intybo (quā endiuia nominant) de eupatorio, & byzantiis barbaris dictus, exhibendi. Purgantia verò medicamēta simplicia sint, R habarbarum, & agaricus: Composita verò, catapotia de rhabar-

**Purgatio.**



baro, de hiera simplici, de agarico, & similia.  
 Cōuenit etiam inter initia hiera picra, quod  
 hæc obstructiones laxet, & visceribus robur  
 addat. Quapropter cauendum, ne valida, quæ-  
 que nullū iecori robur adiciunt medicamē-  
 ta exhibeamus. Infestās enim humor sensim  
 & paulatim per purgantia medicamenta va-  
 cuandus. Semel enim & confertim euacuan-  
 tes, mirificè vires deiicimus, iecurque refrige-  
 ramus. Singulis itaque septimanis aluus sub-  
 ducenda, semperque à mitiorib. ad aliquan-  
 tulum valentiora transeundum. In hunc igitur  
 vsum cōueniūt eclegmata diaphœnicōn,  
 & indi. Pulcherrima etiā purgatio cōficitur  
 ex radice sambuci in vino decocta. Prodest  
 itidem & ebuli radix: eadē nanque sambuco  
 & ebulo vis est. Porro reliquo curationis tē-  
 pore, quo purgātib. medicamentis abstinet,  
 exhibēda q̄ iecori robur addūt, quorū multa  
 suprà de imbecillitatis eiusdē & obstructio-  
 nis curatione dicta sunt: & quæ vrinā mouere  
 possūt. In quē vsum exhibebim⁹ cōfectiones  
 diarhodōn abbatis, aromatici rosacei, dialac-  
 cæ, diacurcumæ, pastillos de eupatorio, rha-  
 barbaro, & absinthio: theriacā itē, & similia.  
 proderit aut vnicè hoc medicamēto vti, quod  
 R̄ specierū diacurcumæ, dialaccæ, añ 3 i. spe-  
 cierū diatriasantali, diarhodō abbatis añ 3 s.  
 specierū aromatici rosacei 3 i. rhabarbari se-  
 lecti 3 s. seminū itybi domestici latioris, me-

Robur  
addentia  
iecori,  
& vrinā  
mouētia.

Tragea.



lonum, foeniculi añ ð ii. absinthii, chameme-  
li, cassuthę añ ð i. nucis myristicę, iunci odo-  
rati, spicę nardi añ ð s. sacchari ę i. misce, fiat  
tragea. Mirificę etiam hoc conferet, quod R<sup>x</sup>  
feminũ carei, foeniculi, anisi añ ð ii. cumini,  
feminis hyperici añ ð i. feminũ ammi, petro-  
selini, dauci, smyrnii (leuisticũ vocant) añ 3 s.  
radicum iridis, asari añ 3 i. absinthii ð i. gly-  
cyrrhizę 3 i. sacchari ę quale omnibus pōdus:  
misce fiat tragea. Animaduertendum autem,  
ficciora medicamenta magis quàm liquida  
anasarci competere. Ceterũ non prætērit-  
tendum, quin extrinsecũs ea etiam adhibeã-  
tur medicamēta, quę humores desiccare pos-  
sunt: qualia sunt cataplasmata, emplastra, &  
vnguenta, aliãque medicamēta resiccandi fa-  
cultate prędita. In quę vsum cataplasma ex  
farina hordeacea, fabaceãq; , foenogreco, ra-  
dice ebuli, baccis lauri, absinthio & origano  
in vino decoctis confectum, & toti vētris ca-  
pacitati impositum cōuenit. Item stercus bu-  
bulum conuenienter resiccatum, non ineptę  
cũ posca, aut oxymelite imponitur, infarcta  
ac superinspersa sulphuris quarta parte. Ca-  
seus quoque recens multum coaguli habens,  
optimę ad omnes tumentes partes impositus  
facit. Deniq; stercoris colũbini, stercoris ca-  
prini, buphthalmi, & chamæmeli, æquales  
partes tusę, in acerrimo aceto & melle coctę  
adhibeãtur. Emplastris etiam vtendũ ex fer-

Extrinse-  
cũs quę  
admouē-  
da medi-  
camēta.  
Catapla-  
smata.

Empla-  
stra.



mēto, caricis, nitro, iride, meliloto, salvia, pu-  
legio, cardamomo, sulphure viuo, baccis lau-  
ri, staphysagria, sale, ammoniaco, mastiche,  
thure, abrotano, aristolochia rotunda, fimo  
columbarum, cum oxymelite cōfectis. Cæte-  
rū omnia impinguantia & resinosa cerata  
vitanda sunt, veluti quæ inflent, & tumores,  
eo quod difflationē impediunt, distendant.  
Tamen debent assidue & crura & manus, a-  
liq; tumefactæ partes in sole, aut iuxta ignē  
hoc medicamento inungi, quod R̄ vnguēti Vnguen-  
agrippæ & i. pinguedinis suillæ & i s. farinarū tum.  
seminis lini, scenigræci, fabaceæ, hordeaceæ  
añ 3 i s. seminū althææ, nigellæ, dauci añ 3 i.  
sulphuris viui 3 iii. boli armenia, 3 ii. radices  
iridis 3 ii s. aluminis scissi, thuris añ 3 i s. cu-  
phorbii 3 i. oleorum irini, liliorū alborū, cha-  
mamelini añ & i s. cū cera quod satis est, fiat  
vnguetum. quo liquefacto, ex eo sæpe tumo-  
res illinendi. Iam dictis addantur ea quæ su-  
prā in victus ratione sunt exposita.

## DE ASCITE. CAP. XXIIII. Signa.

In hac vëter totūque abdomē intume-  
scit, eoque concusso talis auditur sonus, qua-  
lem vter aqua nō omnino plenus reddere so-  
let. Reliquæ verò partes corporis, superiores Viçus.  
præcipuè, minimè inflātur. Viçus ratio in  
hac aqua inter cutem specie sit ex montanis  
auiculis, & aliis cōcoctu facilibus, & bonum  
procreatibus succum, haud secus q̄ in prio-



Curatio. re. Curādi ratio á purgantiū medicamēto-  
rū vsu auspicabitur. Quapropter ea medica-  
menta quæ in cap. præcedente commemora-  
ta sunt, ægrotantibus exhibēda. Superat autē  
omnia reliqua, brassica marina (quā soldanā  
& soldanellum hodie vocant) in potu assum-  
pta. Hęc enim in euacuanda hydropicorum  
aqua mirificū ostēdit effectum, adeo vt mul-  
ti solius eius vsu sanitati sint restituit. Dantur  
ex ea drachmæ duæ, pl<sup>9</sup> aut minus, iuxta cor-  
porum diuersitatem, in vino, aut sero lactis.  
Conferunt etiam catapotia de sagapeno, &  
drachmæ duæ aut tres succi radices iridis, ad-  
iecta sacchari vncia vna. Clysteres etiam ad-  
hibēdi acres, nisi vēter sua sponte humescat:  
tunc enim exiccare ipsum magis conuenit.  
Commēdatur autem eiusmodi, qui R<sup>x</sup> florū  
daphnoidis (laureolā vocāt) 3 ii. polypodii,  
agarici añ 3 i s. cassuthæ 3 iii. decoquātur in  
vino aut aqua. R<sup>x</sup> colaturæ ꝑ xii. benedictę la-  
xatiuæ ꝑ s. eclegmatis indi 3 ii s. mellis ꝑ i. o-  
lei rutacei, chamæmelini, irini añ ꝑ i. salis gē-  
mę 3 i s. misce, fiat enēma. In eum etiā vsū  
colocynthis, cartamus seu cnic<sup>9</sup>, bacci lauri,  
semen anisi, ammi, & carei, ruta, radix cucu-  
meris syluestris, adiectis aliis decoq<sup>9</sup> pōsūt.  
Post auxilia prædicta, vētri vniuerso ex præ-  
scriptis cataplasmatibus & emplastris quædam  
imponātur. Adhibeātur etiam inunctiones,  
exercitia, urinā & sudores mouētia auxilia,

Clyste-  
res.



de quibus omnib. suprà copiosè diximus.

DE TYMPANITE CAP. XXV.

In hoc vitio venter inflatur, distenditurq; **Signa,**  
 & concussus tympani sonitū edit, reliquæ ve  
 rò corporis partes emaciantur. **Victus ra-** **Victus.**  
 tionem prioribus similem obtinet, tamen cū  
 magna ex parte è flatib<sup>9</sup> oriatur, vnicè vitā-  
 da sunt omnia flatuosa. Agrotanti autē mul-  
 ta exercitia, & sitis ingēs, strenuò auxiliatur.  
 Curatio autem ipsa à purgantibus medica- **Curatio.**  
 mentis inchoāda. Clysteres etiam, quibus **Clyster.**  
 flatus discutiēdi facultas inest, infundere o-  
 portet, qualis est qui R<sup>x</sup> radicum apii, fœni-  
 culi añ ʒ i. seminū anisi, fœniculi, dauci, smyr-  
 nii, oreoselini, cumini añ 3 ii. carei 3 iii. rutæ,  
 asari, foliorū ebuli, meliloti añ m i. Bulliant  
 in aqua sufficienti, quoad tertia pars absum-  
 pta fuerit. Colaturæ R<sup>x</sup> lb i. hieræ picræ, be-  
 nedictæ laxatiuæ añ ʒ s. eclegmatis de baccis  
 lauri 3 iii. oleorū rutacei, anethini añ ʒ i s. fa-  
 lis 3 i s. misce, fiat clyster. Danda etiā sic affe-  
 ctis ea quæ vrinam mouent: & iis quæ flatus  
 discutere & digerere possunt, tū intrinsecūs  
 tū extrinsecūs vrendū. Qualia certe multa in  
 cap. de coli dolorib. ad quod recurrēdū erit,  
 dicta sunt. Véter itaq; indies panico, milio, **Sacculi.**  
 sale, furfurib. foliis rutæ, chamemeli florib. ei-  
 nere calido, sacculis insutis, fouendus. Potest  
 etiā hoc adhiberi ceratū, quod R<sup>x</sup> florū cha- **Ceratū.**  
 mæmeli, meliloti añ 3 i s. mēta stri, satureiæ,  
 q ii



# EONHARTI FVCHSII

afari añ ð i. seminum anisi, fœniculi, rutę, ru-  
mini, dauci añ ð i. cardamomi ð s. myrrhę,  
castorei añ ð i. oleorum rutacei § iii. anethi-  
ni § i s. resinę & cerę quod satis est, fiat cera-  
tū. Cucurbitulę prætereà leues, cū multa flā-  
ma crebrò toti ventri suffixę, mirificę pro-  
sunt. venter etiam aspero linteo tantisper dū  
rubor excitetur, perfricandus. Intrinsicus v-  
tendū confectiōibus dianisi, diacumini, &  
cōfectio. ex baccis lauri: vel ista, quę R̄ speciesū dia-  
nisi, diacumini, añ ð i. speciesum eclegmatis  
de baccis lauri ð i. speciesū diagalāgę ð s. se-  
minum anisi, carei, dauci, fœniculi añ ð s. fo-  
liorū rutę, se. appii, sinyrni añ ð i. sacchari §  
vi dissoluti in succis fœniculi & apii, fiat cō-  
fectio in morsulis. Quę hic desideratur alia,  
pete ex cap. de coli doloribus.

## DE INTEMPERIE LIENIS.

### CAP. XXVI.

Quemadmodum reliquę corporis par-  
tes octo intemperierum generibus affligun-  
tur, ita & lien. Verū frequētissime frigi-  
dam & humidam sustinet intemperiem. Sin-  
gularum autem causas nō est cur referamus.  
eādem enim sunt, quę aliarum partium cor-  
poris. Petendę itaq; ex Lib. Galeni de Mor-  
borum caus. cap. primo, secūdo & tertio. Si-  
gnum autem certum & cōpendiosum intem-  
periei in liene, ea quę edūtur ac bibūtur, ex-  
hibeāt & quę forinsecus cuticulę iuxta fini-

Causę.

Signa in-  
tēperiei  
nudę  
qualita-  
tis.



frū hypochondriū accedunt. Si enim frigi-  
 da intēperies in xta ipsum fuerit oborta, om-  
 nis cibus & potus qui efficaciter refrigerare  
 potest, facile & manifestē lienē lædit. omnia  
 etiam frigida extrinsecūs admota offendūt,  
 atque adeò frigidam lienis arguūt intempe-  
 riem. Eam verò ipsam omnia calida cōsolan-  
 tur. Quòd si calida fuerit lienis intēperies,  
 à nullis quæ in cibo aut potu exhibētur, aut  
 etiam extrinsecūs accedūt, dolorem perfert.  
 Et si quidem caliditas augeſcat, nō solum ni-  
 hil tumori apponitur, sed & contractionem  
 amplius sustinet, præsertim si febris adsit. Cē-  
 terum & cibi & pot⁹ calefaciētes, & quæ ex-  
 trinsecūs corpori calorē addūt, calidas etiam  
 intemperies augēt & exacerbant. Solatio au-  
 tē sunt eis omnia refrigerātia. Similiter etiā  
 sicca intēperiei in liene signa colligere oportet,  
 maximè quū pro magnitudine propriæ  
 naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecūs  
 corpori adueniunt, atque intra ipsum deno-  
 rantur, si exiccādi facultate prædita sunt, lie-  
 nem exiccant. Porro vbi humida intemperie  
 lien laborauerit, atq; ea amplius inualuerit,  
 in tātum eius excrementum facit, vt etiā ven-  
 trē ac iecur pertingat. Species quoque dolo-  
 ris vnā cum prædictis signis infestantem in-  
 temperiē demonstrabit. In calida enim & fri-  
 gida intemperie minus dolent, aut nihil om-  
 nino, neq; quicquā etiā in humida: minimū

Frigidæ.

Calidæ.

Siccæ.

Humidæ



Signa in-  
temperiei  
cū fluore  
substan-  
tiæ.  
Biliosæ.

Atræ bi-  
lis.

Pituitosæ

Sangui-  
næ.

verò in sicca. Ex prædictis etiam coniecturâ  
facere licet compositarum in liene intempe-  
rierum. ferè enim in totum ubi calida intem-  
peries fuerit intensa sicca eam cōsequitur, &  
ad frigidam inueteratam humida cōcomita-  
tur. Quādoquidem verò & humores in lie-  
nem cōfluentes tumores producant, eorum  
quoque diligentē considerationem facere o-  
portet, qualēsnam sint tādem, ex iis quæ iam  
dicētur. Bilioso enim fluore existēte, vniuer-  
sum corpus calidius apparebit, etiā si nō ad-  
sit febris: oculique & vrinæ per bilem colora-  
te. Siccitatem semper accusabit eger, & de si-  
ti conqueretur ac bili os infestāte. Cibū fasti-  
dit, & vigiliis infestatur, frigidāque deside-  
rat, vñā cum hoc quòd linguā subflauam ha-  
bet. Si verò atræ bilis sit fluor, color tum in  
lingua, tum in reliquo toto corpore appare-  
bit, & appetentia aderit ciborum, mœstique  
ac subtristes ægri sunt. At verò ubi pituito-  
sus humor in lienem deferatur, consimilis pi-  
tuitosis aderit color, egrique minime sitient,  
& cibū appetent, nisi falsa fuerit pituita: tunc  
enim cibum fastidiunt ægri, potūsque magis  
sunt appetentes. Quin vrinæ quoque pituitosæ  
sunt, ipsique ægri secundū mores pigri sunt &  
segnes. Quidam verò ex eis qui frigidā affe-  
ctionē habēt, magnū & durū lienē acquirūt.  
Quòd si sanguineus existat in lienē cōfluens  
humor, possibile est ipsum colorē tū iuxta



linguā, tum circa cutem permutari. Inter appetentiam autem ciborum & fastidium, medio quodam modo habent ægri, reliquique magis languent, etiā si nō parem visceris tumorem habeāt. venæ verò vniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & vrinæ subfuluæ. Hęc signa fusiùs ex Aëtio narrauimus, quòd nimirū communia sint, & omnibus reliquarum partiū corporis intemperiebus adaptari queant. In vniuersum quidem lienis intemperies nudæ qualitatis ferè citra tumore sunt. **Curatio**  
 Eas itaq; tū per cibos ac potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomētorum irrigationes, quæ intemperiei cōtraria sunt, corrigere oportet. **Calidæ.**  
 Calidam igitur curabis, sicut iecoris, per cibos ac potus frigidos, inunctiones ex rosaceo & melino, atque per alia quæ **Frigidæ.**  
 cap. 18. huius libri sunt dicta. Frigidā lienis intemperiem haud secūs atq; iecoris, per ea quæ moderata calefaciēdi vi prædita existūt. **Humidæ.**  
 In humida lienis intemperie, præter ea quæ paulò antè citato cōmemorata sunt, proderit quinquæfolii radix, plātago sicca, spuma & flos salis, ammoniacū, succus salicis, & similia, si ex iis affuso sufficiēti aceto vnguentum aut ceratū cōficiatur, qualia paulò post describemus. Cōueniētissimæ etiā huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatē obtinēt. **Siccæ.**  
 Siccam lienis intemperiem balneū dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item



**Curateo** ex oleo dulci. cibi citra refrigerationem hu-  
**intempe-** medietates, velut est ptisanę succ<sup>o</sup>. Porro si in-  
**riei cum** temperie cum substantiæ fluore lien afficitur,  
**fluore** tū vbi sanguinea fuerit, ex vena cubiti inter-  
**substan-** na sinistri brachii (quam lienarem vocāt) san-  
**tia.** guis mittendus erit. Aut, si ea inueniri haud  
 possit, ex ea quæ inter annularem & auricu-

**Lienem** larē vocatos digitos sita est. Dein adhibēda  
**corrobo-** intrinsecus & extrinsecus, quæ lienī robur  
**rantia.** adficere possūt medicamēta: qualia sunt cor-  
 tex radices capparis, scolopendrum, hæmio-  
 nitis, ammoniacū, scylla, tamarix, absinthiū,  
 adianthos, iris, calamintha, & similia, quę ie-  
 coris quoque firmitatem & robur cōseruare  
 valēt. De quibus omnibus copiosius in cap.  
 de Lienis inflāmatione dicemus. Si reliquo-  
 rum humorum substantiæ confluerint, pri-  
 mū redundans humor purganti medicamen-  
 to vacuandus erit dein reliquo tempore quę  
 intemperie relictā corrigere, & lienem etiā  
 corroborare possunt, adhibenda.

DE LIENIS INFLAMMATIO-  
 NE. CAP. XXVII.

**Causa.** Lien vt reliquę corporis partes inflāma-  
 tione corripitur, quoties sanguis præter natu-  
**Signa.** ram ad eum confluit. Cognoscitur gravita-  
 te & tumore sinistri hypochondrii, qui ad ta-  
 ctū nō cedit, dolore & distēsiōe loci, febre,  
 & estu. Irruentis verò humoris copia, ex ma-  
 gnitudine & velocitate generationis ipsi<sup>o</sup> in-



flāmationis. Viſtus ratio eorū qui inflāma- Viſtus.  
tione lienis laborant: ſimplex ſit: eāque quæ  
facile concoquātur, in cibo exhibeantur, ve-  
lut ex alica lota, ptifanę ſuccus, panis made-  
factus, & eiufmodi. Si verò inflāmatio diu-  
tius remoretur, etiam auicularum carnes eis  
cōcedendæ, & piſces petroſis aquis degētes.  
Bibat eger decoctum cinamomi, aut vinum  
aquofum. Curatio ipſa à venæ lienaris, aut Curatio.  
eius quæ inter minorem & annularem digi- venæ ſe-  
tum eſt, incifione auſpicetur, ſi nihil ſit quod ctio.  
eam fieri vetet. venter etiam per clyſterem  
aſſiduè eluatur, potiffimum ſi venę inciden-  
dæ medela relinquantur. Deinde imponantur  
lieni medicamēta adſtringētia, quæ id quod Quæ im-  
inſluit, reprimere, & lienis firmitatem cōſer ponenda  
uare poſſunt. Non ſunt verò ſola adſtringen- lien.  
tia adhibenda, ſed admiscenda erunt ea quæ  
citra euidentem calorem extenuant, ſecant,  
atque relaxāt, ne ſcilicet craſſus in eo ſuccus  
obturatus vehemētius incrāſſeſcat, quemad-  
modū Galenus lib. 13. Ther. meth. diligenter  
monuit. Itaque ſi moderata fuerit inflāmatio Fomētā.  
tio lienis, vinum vetus ac auſterū tenuiūm-  
que partium oleo dulci permixtum, & lana  
ſuccida exceptū imponemus. Si verò maior  
ſit caliditas, roſaceum ſit oleum, aut melinū,  
& chamæmelinum cum aceto. verbi gratiā,  
℞ olei roſacci, cotoneorum añ ꝑ ii. olei cha-  
mæmelini ꝑ i. aceti optimi ꝑ s. miſce. Quod



## Cataplasma.

Curatio  
lienis in-  
durati.

si olea prædicta nō adsint, folia rubi, aut mā  
la cotonea in oleo decoquantur, & quædam  
etiam tenuium partium addantur, velut est  
abfinthium & pulegium. Cauendum etiam,  
ne actu frigida lieni imponamus, ea quæ ex-  
trinsecus admouentur medicamēta. Post irri-  
gationes ac fomēta ad cataplasmata, in quo-  
rum compositionem hordeacea farina, & lo-  
liacea, caricæ, & lini semen assumantur. Cæ-  
terum cauendum, ne post irrigationes & ca-  
taplasmata locus denudetur: sed vbi hæc fue-  
rint sublata, mox emplastrum aut ceratum,  
qualia in cap. de Iecoris inflammatione de-  
scripsimus, imponatur. Siquidem similia ge-  
nere medicamenta, ambo viscera postulant:  
tanto autem valētiora lienis sint, quāto cras-  
siorē vitur alimento. Quare ex iis quæ de io-  
cinore diximus, ad lienis curationem exem-  
pla transsumes: quibus semper ferē acetum,  
& quippiam quod lieni gratum sit, ciūsque ro-  
bur peculiariter tueri possit, adicias. verū  
vbi inflammatio in scirrhum degenerat, nō  
solum extrinsecus, sed etiam intrinsecus va-  
lentioribus medicamentis vti conuenit. In-  
trinsecus itaq; validissimæ potiōes (nam eas  
sine molestia tolerāt) exhibendæ. Ex quarū  
numero primas partes sibi vendicant corti-  
ces radicum capparis, hēmionitis, myricæ ra-  
dix atq; germina in aceto vel oxymelite co-  
cta. item centaurei minoris succus epotus, &



lupinorum amarorū decoctum, cū ruta & pi-  
 pere assumptū. Anagallidis fœminæ scrupu-  
 lus cū posca, aut oxymelite pot<sup>o</sup>, mirificè cō-  
 fert. Extrinsecus fomentum tale adhibeatur, **Fomentū.**  
 quod R<sup>x</sup> centaurii minoris, hæmionitidis, ru-  
 tæ añ m i. radicis corticis capparis § i. Deco-  
 quatur in aceto: & postquā decocta fuerint,  
 spongia in decocto irrigata lieni calida im-  
 ponatur. vel potest esse huius vnguenti vsus, **vnguen-**  
 quod R<sup>x</sup> oleorum de capparibus, liliorum li- **tum.**  
 borum, irini añ § i. medullæ osiū cruris bu-  
 bulini 3 i s. mucositatis radicis althææ, fœni-  
 græci, se. lini añ 3 i pinguedinis taxi, gallinæ,  
 anserinæ añ 3 ii. corticum radicum capparis,  
 tamaricis, costi, centaurii minoris añ 3 i. am-  
 moniaci, bdellii, galbani añ 3 s. gūmi prius  
 in aceto dissolutis, cum cera quod satis est,  
 fiat vnguentum. Emplastra denique & cerata  
 multum cōferre solent. Componatur itaque  
 tale, vel simile, quod R<sup>x</sup> oleorum liliacei, iri **Ceratum**  
 ni, de capparibus añ § i. farinæ hordei, fœni-  
 græci, seminis lini añ 3 i. corticū radicis cap-  
 paris, hæmionitidis añ 3 i s. radicis althææ 3 s.  
 bdellii, ammoniaci, galbani añ 3 i s. opopa-  
 naxis, myrrhæ, thuris añ 3 s. cum resina tere-  
 binthina & cera quod satis est, fiat ceratum.  
 Cæterum oportet medicum diligēter ad af-  
 fectum respicere, & pro eius ratione tum ad-  
 dere, tum adimere aut emollientia, aut atte-  
 nuantia & discutiētia, aut quæ robur addūt.



**Viſus.**

Viſus etiã ratio vbi durities perfecta fuerit, attenuatoria ſit. Acrium etiam rerũ comeſtio per interualla, & potus exiguus conuenit. Vinũ ſit non valde vetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum ſepe ignitum extinctum ſit. Conuenientiſſimum enim lieni indurato remedium exiſtit, candens ferrum in aqua, aut vino, aut poſca ſubinde extinctũ. Plurimum etiam fidutię in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum vti cõuenit, corpore ſuperuacuis non abundante. Maniſteſtum autem eſt, quod vociferationes quoque oportuna, & in tempore aſſumpta, eis ſummẽ opitulantur. Cucurbitula etiam cũ ſcarificatione affigenda.

## DE LIENIS OBSTRUCTIONE.

## CAP. XXVIII.

**Cauſa.****Signa.**

Accidit, interdum non ſolum propter attractricis facultatis imbecillitatẽ, verum etiam meatus, per quem atra bilis ſeculentus humor ex iecore ad lienem deriuatur, obſtructionem, vt impurus ac vitioſus humor in totum corpus diſtribuat. Quod vbi contigerit, color corporis vitiatus ad nigredinẽ vergit, & nõnunquã immedicabilia vlcera hoc modo patientes habent. Cauſa obſtructionis lienis ex iis quæ in cap. de Iecoris obſtructione dicta ſunt, innotescẽt. Cognoscitur ex grauitate, quę eſt circa dextrũ hypochondriũ, vitiato corporis totius, præſertim verò



faciei, colore spirit<sup>9</sup> difficultate, & aliis quæ  
 ex prædictis suprà innotescunt. Curatur is af **Curatio.**  
 fectus victus ratione extenuatoria, & medi-  
 camentis obstructionem tollētibus, de qui-  
 bus abunde dictum est in cap. de iecoris ob-  
 structione. vtraque enim viscera similib<sup>9</sup> ge-  
 nere medicamentis indigent: lien tamē tāto  
 fortioribus indiget, quanto crassiore vtitur  
 alimento. Quapropter quatenus ad humo **Præparā**  
 rum crassorū vt vacuationi promptius obe- **tio hu-**  
 dian præparationē attinet, iisdem certe me- **morum.**  
 dicamentis opus erit. hoc dūtaxat obseruato  
 vt sint validiora, & commixta habeant quæ  
 robur visceri addere queāt. Post præparatio-  
 nem vacuandi sunt humores per ea medica-  
 menta, quæ crassos & feculētos humores pur-  
 gare possunt, de quibus iam sæpe dictū est.  
 Posthæc intrinsecūs adhibenda sunt, quæ su-  
 præ de Iecoris affectibus, potissimū eius ob- **Purgatio**  
 structione cōmemorata sunt. Forinsecūs au-  
 tem vnguenta & cerata, quæ in capite præce-  
 denti produximus, admouenda erunt.

DE RENIBVS CRVENTAM  
 VRINAM EXCERNENTI-  
 BVS. CAP. XXIX.

Renum fit nonnunquam passio, in qua  
 tenue sanguinis serum mingitur. Accidit au-  
 tem propter renum imbecillitatem, vrinam **Causæ.**  
 subinde secernere à sanguine nequeuntium.  
 Aut propter amplitudinem osculorum, ex



vena cana urinā ad renes excolantium. Quā enim ampliōres ac patētiōres meat<sup>9</sup> fuerint, quiddam etiam ex sanguine venæ emittunt, aliāq; item crassa. Sepe renes etiam iuxta circuitus quosdā sanguinē excernūt, simili modo vt ex hæmorrhoidibus in sede fieri cōsuevit. Quidam etiam sanguinē ex renibus excernunt, propter venæ rupturam in renibus factam, veluti contingit iis qui graue onus leuarunt, aut valde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale violētum, vt est exercitium, aut coitus nimius, pertulerunt. Aliquando autem ob acres ex supernis defluentes humores, erosio venarū cōtingit.

**Signa.**

Cæterū si passio propter renū imbecillitatem contingat, sanguis qui excernitur, ferus admodū est. Sin ob osculorū amplitudinem, tunc nihil dolitant. Si certis circuitibus excretio fiat, tum vel plenitudo est totius corporis, aut cōsuetorum exercitiorum neglectus, aut membri cuiusdā abscissio præcessit. Si propter venæ rupturam tūc, copiosissimē sanguis excernitur. Si verò ab erosione, tum sensim & paulatim excernitur, do-

**Curatio** lōrq; renes excruciat. Curabis itaque eam urinę cru cruentę urinę excretionem, quę propter re-  
entę ab num debilitatem, aut amplitudinem osculo  
imbecilli rum urinas ad renes excolātū accidit, quie-  
tate re - te, cibis adstringentibus, potione vini nigri,  
num, & aliis quę in cap. de cruēto sputo compre-



hensa sunt. Ab iis autē potissimum quæ vri- aut vaso-  
nam cient, & à coitu omnino abstinendum. rum eius  
In potu autem, præter ea quæ in cap. iam ci amplitu-  
tato dicta sunt, exhibenda symphyti radice dine.  
decoctum, & tragacantha in vino nigro ma-  
cerata. Siftit etiam sanguinis ex renibus eru-  
ptiones cornu ceruini vsti drachma vna ex vi-  
no. Folia item salicis cū vino, lapidis hæma-  
tidis drachma vna. Mirificè quoque confert  
polygoni decoctum. Bolus denique Arme-  
nia drachmæ pondere sumpta. Syrupus ro-  
facens. myrthinus, pastilli de succino, de ter-  
ra lemnia, & de spodio nominati. Quillum  
præterea lac vnicè commendatur, si ieiuno §  
iiii. quibus drachma vna boli armenia com-  
mixta sit, exhibeantur. Forinsecus renibus &  
lumbis imponantur ea quæ ad sanguinis per-  
sputum reiectionem, & in ca. de Dysenteria,  
aliisq; sanguinis eruptionib<sup>9</sup> descripta sunt,  
& quæcunq; vnà cum eo quod adstringūt &  
resiccant, etiam robur addere possunt. qua-  
lia sunt rubi folia, & quercus, glâdes, itémq;  
myrrihæ bacca, malicoriū & balauſtia, & si-  
milis. Post hæc habitus corporis cibus, lacte,  
ac auicularum carnib<sup>9</sup>, suillis etiam macris,  
reficiendus est, quò vniuersum corpus ad pri-  
stinas vires reducatur, & renes corroborati  
propriū munus obeāt, & seorsum humorē à  
sanguine secernāt & excolēt. Porro si renes Curatio  
secundū circuitum sanguinem excernūt, aut si per cir-



cuit<sup>9</sup>, aut propter rupturā venæ, aut acres ex supernis  
 propter defluentes humores: tunc statim vena quę in  
 venæ ru- cubito est, secanda erit. his quidem qui per  
 rupturā, circuitus sanguinem excernunt, paulò ante  
 aut ero- circuitum, reliquis verò statim à principio.  
 fionē ac- Cæterum sanguinis detractiōne partiri me-  
 cidat. lius erit, vt paulatim eis reuulsio & auersio  
 fiat. Loci autem circa renes spongiis posca  
 imbutis cooperiātur, aut lanis succidis cum  
 rosaceo & aceto. Post hæc emplastra, vngue-  
 ta, & cerata locis paulò antè citatis descri-  
 pta, imponenda. Commodè etiam cucurbi-  
 ta adhibetur, præsertim si suspicio sit inflam-  
 mationem adesse in his, qui ob venæ ruptu-  
 ram sanguinem mingunt. conueniunt etiam  
 potiones suprā, & in cap. de Sputo cruento  
 commemoratæ. Aeger inter ea etiam à falsis  
 & acribus omnibus arcendus. Vbi verò iam  
 sanguinis excretio cessauerit, victus ratione  
 vtendum est, vnde nō multus sanguis gigna-  
 tur, maximè in iis qui per circuitum excre-  
 uerunt: & supernæ corporis partes assiduè  
 exercendæ. In iis autem qui ob venam ruptā  
 sanguinem mingunt, si exulceratio in locis  
 relinquatur, ipsam post sanguinis suppressio-  
 nem curabimus, per ea quæ in capite de Re-  
 num exulceratione dicentur.

## DE INFLAMMATIONE RE-

NUM.

CAP. XXX.

Causæ.

Renes ob plurimas causas inflammatio-



ne corripuntur. Nam & humores corrupti,  
 & plagæ, & attritiones, & medicamentorum  
 potiones inflammationem procreât, & præ-  
 fertim equitationes continuæ & vehemêtes.  
 Accedit agris dolor pulsatilis retro iuxta pri-  
 mam dorsi vertebam, paululùm supra spu-  
 rias costas. Distêdit autem dolor sursum vsq;  
 ad iecur, præsertim dextro rene affecto. De-  
 orsum verò vsque ad vesicam & pudendum,  
 lumbósque & coxendices, pectinem item &  
 fœmora. Consequitur etiam stupor propin-  
 qui cruris, & neque rectâ erigi possunt, neq;  
 pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue ali-  
 qua alia concussio irruat, vehementi dolore  
 lancinantur. Frigent eorum extrema, & ma-  
 gis suræ ac pedes. Adest vrine emittendæ dif-  
 ficultas, minguntque assiduè ac laboriosè: in  
 principio quidem tenuia & aquosa, in quib⁹  
 nihil subsidet: inflammatione verò in peius  
 proficiente, rubicundiora: deinde etiam cras-  
 sa & mucosa: adsuntque febres vehementes.  
 Quòd si adhuc ampliùs inflammatio auge-  
 scat, hæc omnia fiunt vehementiora. His ac-  
 cedit nausea, & stomachi morsus, & vomitus  
 bilis. Quidam autem ipsorum vsq; ad animi  
 deliquium anguntur & exudant. Sistitur ipsis  
 venter adeò vt inflentur, & assiduè ructus e-  
 mittant. Sequitur fastidium vehemēs: & qui-  
 busdam continuè fiunt exacerbationes: qui-  
 busdam verò per interualla. In vniuersum au-



- Victus.** tem ventris egestio, & urina multa excretio dolores ipsos præcedunt. Aegrum in mol-  
lissimo lecto decumbere oportet, ac primo  
die cibo abstinere, non tamen in multos dies  
inediam extendere. Urina enim acriores per  
inediam redditæ, vehementissimos morsus  
infligunt. Itaque in principio sorbitionibus  
tenuibus morsus lenitibus nutrire oportet,  
ut est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua  
etiam inter holera summè confert. Potus sit  
decoctum cinamomi. Et in summa victus ra-  
tio sit talis, qualis in aliis inflammationibus.
- Curatio.** Inter initia, quod ad curandi rationem attinet,  
sanguis statim detrahendus est. Secunda autem  
vena quæ in poplite est, secundum rectitudi-  
nem renis patientis. Post venæ sectionem ad  
ea quæ extrinsecus admouetur procedendum,  
cataplasmata nimirum, fomenta, linimenta,  
emplastra, & similia quæ mediocrem refri-  
gerandi ac leniendi vim obtinent, ex oleis ro-  
faceo, cotoneorū, chamæmelino: farinis hor-  
deacea, fabacea, fœnigræci, & similibus quæ  
in capitibus de inflammationibus iecoris &  
lienis dicta sunt, composita. Cauendum hoc te-  
pore, ne ea medicamenta quæ urinam ciunt, bi-  
benda dentur, Galeno sic monente lib. 13. The-  
meth. oblectant enim, mordaces humores in-  
flammati partibus inducendo. Clysteribus  
autem mollibus, potissimum si veter nihil deiece-  
rit, utendum: ex maluæ decocto, aut seminis li-
- Vrinam  
prouocā-  
tia nō ex-  
hibenda.  
Clyste-  
res.**



ni & fœnigræci, aut succo ptisanæ confectis, cum oleo violaceo, aut chamæmelino. Cate-  
rùm copia non multa infundatur, ne repleta  
intestina comprimant renes. Quòd si dolor  
per ea quæ extrinsecùs imponūtur, non leua-  
bitur, cucurbita lumbis ac iliis est adhibēda,  
& fissuris impactis plurim⁹ sanguis est attra-  
hēdus. deinde iterum spongiarum fotu vten-  
dum, & aliis quæ dolorem leuare possunt.  
Vbi perfectè iam sedata ac cōsumpta fuerit  
inflāmatio ( id quod cognoscitur doloris o-  
mnimoda remissiōe ) tūc etiā per vrinā pro-  
uocantia purgandū erit. à cōcoctis enim in-  
flammationibus vrinæ prodeunt multæ &  
crassæ, & in iis bonum est quod subsidet, atq; Suppura-  
adeò morbum prorsus indicant. Porro si per tionis si-  
prædicta medicamenta affectus non propel gna.  
latur, & neq; dolor, neq; febris, neq; grauitas  
horū vñ conquieuerint, vrineque difficultas  
ac frequēs stillicidium ægrum molestauerit,  
pus hac in parte colligi indicatiū est. Tūc itaq;  
quàm celerrimè suppurationem, ac puris eru-  
ptionē adiuuare oportet. Qua in re spongiæ  
aquā & oleo assiduè imbutæ proderūt, fotus  
gratiā admotæ. Eundē etiā vñum cataplasma  
præbēt, quæ ex farina hordeacea, fursuri-  
bus, ficubus, althæa, & similib⁹ suprà in ca. de  
iecoris inflāmatione dicta sunt, cōstāt. In soliū  
quoq; ex emolliētibus herbis, malua, althæa,  
chamæmelo, lini semine, fœnogræco, para-



tum descendere summe confert. Quòd si verò perfecta iam suppuratione (id quod cognoscitur, si febres & dolores minores fuerint, grauitatis autem sensus circa renem affectum remāserit) ruptura moretur, in potu exhibenda quę vrinam ducunt: vt est sceniculi, pulegii, origani, & similium decoctum. Hęc enim rumpunt interdum suppurationem, & pus per vrinam expurgant. Quòd si autem vsus illorum nihil contulerit, actioribus clysteribus aluus subluenda erit, velut est alliorū, raphani sylvestris, ac radicis cucumeris sylvestris decoctum. Oportet verò admiscere oleum, quo infusa lubrica reddantur. Hęc itaque per clysterem infundenda, iubendiq; ægri, quò plurimo tēpore apud se detineant. Consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationem rumpere, vnā cum hoc quòd ventrē emollire solent. Rupturā verò factā, caruncula parua, oblonga, cum vrina excernuntur. Et siquidē vlcera fuerint maligna, humores foetidi, linidi, & mucosi: si verò benigna, pus ipsum album, & æquale, & leue, absq; odore graui, excernitur. Quę verò deinceps sint adhibenda medicamenta, in capite de Renū vlceribus dicemus.

Rupture  
factæ in-  
dicia.

## DE CALCULO RENVM. C. XXXI.

Causæ. Renū calculis prouectæ ætatis homines frequētiùs quàm pueri apprehēduntur. Causæ autē generationis horū calculorū existūt,



assiduæ cruditates, vnde humoris crassi & terrei multitudo cōgregatur, & ardor igneæ ve circa renes caliditas, q̄ humores adassans, eos cogit & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quæ in æreis præsertim balnearum vasis coquuntur.

Accedit agris grauis in renibus dolor, aculei infixi sensum præbens: tumor tamē nusquam foris apparente. spina ægrè flecti potest: crus quod è directo est renis affecti, stupet: adest fastidium, & vomitus. Vrina circa obturationis principium pauca, aquosa mingitur. Postea verò perfecta eius suppressio cōtingit, aluūsq; nihil excernit: verū cupitates multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis, propter violentiam calculorum. Vrina etiam arenosam subsidentiam habet, potissimum vbi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas ferè notat Hippocrates etiā iis verbis cōplexus est: In renem dolor grauis, quando cibo replentur, inuadit, pituitamq; vomūt. Quum verò dolores intentiores fuerint, æruginosa, atque tum leuiore quidem fiunt. Doloꝛe autem leuatur, quando cibo vacui fuerint. Arenæ rursū subsidēt, cruentāq; mingunt. Stupor crucis, quod è directo est. Hæc ille. Porro leues & rotundi facillè excernuntur: non item, qui alia quacūq; forma præditi sunt: maximè tamen oblongi & asperi difficulter excernuntur.

Signa.

6. Epid.

Par. 1.

Aph. 5.

”

”

”

”



- Curatio.** Cæterum quum lapis in renibus obturatus  
vehementissimos dolores intulerit, ne scilicet  
sanguinis multitudo ad tésione & dolore af-  
fectam particulam procubat, in corpore ple-  
nitudine laborante & robusto, confestim po-  
**Venæ se-** plitis vena, iuxta Hippocratis loco iam cita-  
**ctio.** to consilium, incidenda erit, eius nimirum cru-  
ris quod stupet, & è directo renis patiétis est.
- Purgatio.** Qui verò vitioso humore seu cacochymia la-  
borât, iis purgatio redundantis humoris cõ-  
uenit. neq; omittenda hæc est, nisi aliud quip-  
piam id fieri prohibeat. Id quod etiã Hippo-  
crates iussit, dũ iuuenes elleboro esse purgã-  
dos ait. Verum si venæ sectionem, aut purga-  
tionẽ adhibere minimè licebit, aluũ per cly-  
steris infusionem eluere oportet. Quod tũ  
potissimum faciendũ erit, vbi multa in intẽ-  
stinis excrementorũ copia fuerit. Cauẽdum  
tamẽ vnicè erit, ne sint validiores, atq; adeò  
ne aliunde humorũ copiam ad intestina tra-  
hant, ne meatus vrinarii angantur & compri-  
mãtur: sed sint tales, quæ dũtaxat excremen-  
ta in intestinis detenta vacuare possint. vt est
- Clyster.** huiusmodi, qui R̄ maluæ, althææ, mercuria-  
lis, trichomanes (polytrichũ nominant) hel-  
xines, hoc est parietarię añ m i. sisymbrii, car-  
damines, id est nasturtii aquatici m i s. semi-  
num oreoselini, apii, fœniculi, lini añ 3. iii. ra-  
dicis acori veri § i s. furfuris § i. Bulliãt in a-  
qua iustæ quantitatis, & colentur. Colaturę §



xi. casie fistularis § i. hierę picre § s. mellis ro-  
 facei colati § i s. oleorum anethini, rutacei,  
 chamęmelini añ § i. s. lis 3 ii. misce, fiat enę-  
 ma. Neq; clysteribus asidue, aliis ferę omni-  
 bus neglectis remediis (vt facere pleriq; ho-  
 die solent) vtendum, sed bis aut ter: sic tamen  
 ne vltra consuetum tempus retineantur. Re-  
 tenti enim compressionem atq; angustia re-  
 num, & meatum vrinariorum efficiunt, vt  
 copiose lib 2. Paradox. cap. 15. diximus. Ex. **Laxantia**  
 crementis alui expurgatis, quę laxare mea-  
 tus possunt medicamenta adhibenda erūt. In  
 quem vsum hoc vnguęto renes & lumbi in-  
 ungendi, quod R. oleorū anethini, amygda-  
 larum dulcium añ 3 ii. olei chamęmelini 3 i  
 s. adipis gallinacei, anserini añ 3 ii butyri sa-  
 lis experti 3 i. cere quod satis est, fiat vnguen-  
 tum molle. In fessionibus item vtendū ex de-  
 cocto calaminthes, origani, parietarię, sisym-  
 brij, cardamines, brassicę, foliorū althęę, mal-  
 uę, & similibus. Aut eger in solū tepidū fre-  
 quenter demittendus. Fomenta etiā locis ad-  
 mota cōmodant ex furfuribus, cum foliis al-  
 thęę decoctis. Itē cataplasmata ex farina tri-  
 tici, seminibus lini & scenigręci, lupinorum,  
 peucedani radice quā tenuissimę trita, &  
 chamęmelo. oportet aut coaceruatim alia su-  
 per alia cataplasmata adferre, priusquā pri-  
 mū frigescat. Aut si nō libeat, calefactorio a-  
 lio extrā cōtegere ne refrigeretur. Id quod cō-  
 r. iiii

Vnguētū



Vrinam  
mouen-  
tia.

Deducen-  
tia ad re-  
nes.

modè fieri potest per facellos, aut alia vapo-  
raria cataplasmati imposita. Hæc interdū ad  
lapidis per vrinę eiectionem sufficiunt. Quod  
si verò non contulerint, ea etiam quę vrinam  
cient, bibēda dabis. Vrinam autem multam  
hec ducunt, acorū, hypericum, oreoselinum,  
fernē lithospermi, hoc est, milii solis, ammii,  
dauci & fceniculi, asarum, radix bryonię, ru-  
bię tinctorum, cortex capparis, asparagus, &  
similia. Deducunt autem ad renes, ea quę  
calculos confringūt, peucedini radix, apium  
& radícula. Lapidēs autē in ipsis renibus cō-  
fringunt & atterunt, sion, adianthum, bdel-  
lium, viticis seu agni semē, rusci radix, saxi-  
fraga, betonica, ciceris insculum, lithosper-  
mon, tecolithos (qui lapis Iudaicus dicitur)  
xanthium, althę semen & radix, & eiusmo-  
di. Horum singula partim decocta, partim  
tenuissimē trita, præbeto bibenda. Porro ea  
quę vrinam cient, ac lapidem frangunt, tunc  
exhibere conuenit, quum vehementes dolo-  
res remittunt: id quod accidit, lapidē iā trās-  
moto, & ex sede sua agitato. Quod si obfir-  
mati ac vehementer impacti sint lapides, plu-  
rimus potus vitādus, itemque ea quę vrinam  
ducunt. cum enim secum excrementorū co-  
piam ad renes deducāt, meatūs etiam vrina-  
rios plus obstruunt, atque calculi ex renibus  
transitum impediunt. Fomentis autem ac  
cataplasmatibus, & infussionibus membra



vt diximus) relaxāda, & venter per leuia infusa ac infessus euacuandus, ne vrinarii meatus comprimātur. Post hæc autem doloribus aliquantulū lenitis, etiam cucurbitulæ vtiliter ipsis adhibētur, & præsertim pressius affixæ, inflammatione videlicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim trāsmouent sæpè cucurbitæ ipsos lapides, vt repētè dolores supprimant, lapide nimirū in vesicæ amplitudinē transuecto. Quapropter in principio supernè à rene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina attrahendæ obliquè secūdum meatuum vrinariorum situm. Cæterū delati ex renibus in vesicam lapides, & præ magnitudine circa collum vesicæ detēti, sæpè in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumē, tum quod vrinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri opottet, ita vt supini situentur, & longè altiores coxarum vertebrae habeant. Deinde multiformiter eos commouere, quò omnibus machinamentis adhibitis, lapidem ex ipso vesicæ meatu excidere faciamus. Quòd si hac ratione nihil profecerimus, catheter instrumentū proliciendæ vrinæ aptum immittēdum, eoque lapis à collo vesicæ amouēdus, & vrina educenda. Si verò ex vesica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatum ipsius pudēdi obfirmetur, & vulnerando exulcerationis periculum

Cucurbitæ.



inducat, aqua calida paulatim ab alto pudē-  
dorū partibus donec rubore suffundatur, in-  
stillanda aut pudendum in oleum calidum,  
quod relaxandi vim obtinet, demittendum.  
decoctum etiam quoddā ex iis quæ urinam  
ducunt, plurimum exhibendū est, iubendū-  
que æger ut multam urinam cōgreget, eam-  
que postea emingat, ac diligentius expellat:  
ita enim detractus lapis, celeriter excidere cō-  
suevit. Quum verò neq; hoc modo eum ex-  
trahere possemus, secandum erit pudēdum,  
vulnuscūlo supernè iuxta glandis magnitu-  
dinem incusso. Infernè enim secare nō expe-  
dit: quādoquidem ferè semper in fistulā pro-  
ficit, ac postea per ipsam fissurā urina excer-  
nitur. Lapide amoto præseruare hominem o-

**Præserua-** portet, ne rursus renes lapide infestētur. Tuo  
**tio à lapi-** tur autē à calculis ne fiant, cibis boni succi,  
**de.** cōcoctū facilis, & moderatus: dein exercitia  
mediocria, rarūsq; leguminum omnis gene-  
ris, frumentaceorūque vsus, itē casei, lactis,  
& quæ ex ipso præparātur obsoniorum, vi-  
ni nigri, copię carniū, & omnium summa-  
tim crassi succi, ac nimis calidorum & acriū.  
Aegros etiam admonere oportet, ut à cœna  
sepe vomant, & absinthium assiduè bibant,  
& per tempus certum venam secēt, si quidem  
sanguis abundare videatur: aut conuenienti  
temperaturæ ipsorum purganti medicamēto  
utāur, si vitiosi humores coaceruētur. Opor



tet etiam ipsam aquam per omnē victum purissimam esse, & percolatā. Vinū item tenue, album, vrināque ciens, neque valde vetus. vtantur quoque per interualla medicamētis vrinam mouentibus, hōc potissimum, quod multē est efficacē. R̄ radicum fœniculi, asparagi, cenanthes, id est filipendulæ añ 3 i. radicis rubiæ tinctorū 3 i. radicis aristolochiæ rotundæ vocatæ, althææ añ 3 i. liquiritiæ rasæ 3 ii. lapidū ex spongiis marinis, recolithi seu iudaici añ 3 i. seminum ammii, dauci, oreoselini, saxifragæ albæ, fœniculi, anisi, lithospermi añ 3 s. seminum melonū, citrulli, excorticorum añ 3 i. s. seminis halicacabi, hoc est alchechengi 3 s. helxines seu parietariæ, maluæ añ 3 i. polii mōtani, adiāchii, pulegi, asari añ 3 s. sanguinis hircini arefacti & præparati 3 i. bdellii, ammoniaci añ 3 s. lapidum seu oculorum cancri, cinamomi selecti, iunci odorati (squinantū nomināt) añ 3 ii. s. ingula redacta in puluerē minutissimū, misceatur. Detur de hoc drachma vna quarto quoque die, aut singulis hebdomadis matutino tēpore in vino tenui. Alia remedia pete ex cap. de vesicæ calculo.

Puluis ad  
calculos  
renes.

## DE RENVM VLCERIBVS.

## CAP. XXXII.

Vlcera renum accidunt propter venarum Causæ. quæ in iis sunt, rupturam. Item suppurationem inflammationis, & acres ac mordaces hu-



Signa.

mores huc delatos. Deprehenduntur renes exulcerati dolore in lūbis cum gravitate, & sine impedimēto vrina redditur, id quod in vesicæ vlceribus non fit. vrinæ pus mixtū reperitur, carnosus particulis, aut pilis innatātibus, iuxta Hippocraticam sententiā, quæ sic habet. Si sanguinem, aut pus mingant, aut re

4. Aph.

7s.

„ nū aut vesicæ exulcerationē significat. Et statim posthæc. Quibus in vrina crassa existēte  
 „ carūculæ parvæ, aut veluti capilli vnā exeūt,  
 „ his à renibus excernuntur. Vitet æger cruditates, & suprā quā cōuenit satietatem. Ne

Victus.

quid crudū in cibo accipiat, & neque quod ægrè cōcoquitur, aut facilè corrumpitur, aut inflationes parit. Maximè tamē vitet quæ facile acefcunt. Itē omnia acria & feruentia, & quæcunque bilem gignere possunt, vt est longa sitis, inedia, & immodica condimenta. vitanda etiam omnis delassatio & immodica equitatio, maximè verò quæ fit in equo, vigiliæque & omnem vehementē concitacionē, & è conuerso perpetuum otium, & balneorū assiduitatē. Utatur pane recenti decenter apparato. Carnibus volucrum montanarū, hœdis, & similibus carnem teneram habentibus Piscibus saxatilib⁹, squamosis, in craticula assis. Cācer fluuiialis mirificè, sorbitio ex ptisana, amyllum cum lactæ coctum confert. Dandum & lac ouis permixtum, & insculum gallinæ pingue. oua etiam sorbilia per se conue



niunt. Ex olerib. autē malua, intyba, rumex,  
 portulaca, lactuca omnia tamē cocta, neque  
 quicquam crudū (vt diximus) voret ager. Ex  
 fructibus vua passa non incōmoda est, & nu-  
 ces pineæ, & amygdalæ, decorticatę tamē &  
 probē mundatę. Multus potus, & meracior  
 vitandus. à frigida etiā potu in totum absti-  
 nēdum. Frigidum enim, vt ait Hippocrates, 5. Aph.  
 vlceribus inimicum. Pro potu vtatur vino di 20.  
 luto, ac parum adstringētē: aut lac caprinum  
 aut ouillum, aut amygdalinum bibat. Coit<sup>o</sup>  
 nō solū vlceribus, verum etiam omnib. aliis  
 renum passionibus infensissimus est, & maxi-  
 mē senib. & naturā imbecillioribus. Vrinam  
 cientia vitet. Balnei sit rarus vsus. Naturales  
 verò aquas experiri non inutile fuerit, alumi-  
 nosas videlicet, sulphurulentas, & cōsimiles.  
 Frigida lauare cōmodissimum est: supra mo-  
 dū enim vlcerationes egrē sanabiles, tum ex-  
 ternas tū internas destruit. Cōferēt etiā natu-  
 rales aque, post matutinā deambulationē po-  
 tatę. Curādi ratio, si ob acres humores acci-  
 dant renum vlcera, ab humorum vitiosorū vomitus.  
 ac erodentiū purgatione aspicietur. Qui au-  
 tem sic afficiuntur, eos vomitu etiam vacuare  
 oportet. Non solū verò ad vitiosos humores  
 vacuādos cōfert vomitus, verum etiam si quis  
 omni mense audacter vomuerit, is renum vl-  
 c<sup>o</sup>, & quicquid inde mali accidere potest, dis-  
 soluet, quod humorum motum planē in cō-



Glutinā-  
tia.  
pulis.

trarium auertat. Sunt etiam interea deuoran-  
da quę morsus obtundunt, vt malua, intybū,  
rumex, portulaca, semina melonū, cucume-  
ris, cucurbite: syrui, violace<sup>9</sup>, rosace<sup>9</sup>, nym-  
phææ, & eorundem cōseruæ hodie nomina-  
tæ. vacuatis humoribus, aqua malsa bibēda,  
aut scēnigræci decoctū cum melle: aut cucu-  
meris, aut maluæ, aut melonū semen cum hy-  
dromelite. lac etiā cum melle præbēdum, re-  
cens multum & calidū. ad vlcera enim pur-  
ganda cōducit. Serum item caprinum, deco-  
ctum hordei & vuarum passerū, & glycyrrhi-  
zæ, quæ mirificè cōfert, perinde atq; eius suc-  
cus. Quum verò munda fuerint vlcera (quod  
inde tibi palām fiet, si neque tectoriū etiam  
vlceri obductū cum vrinis excretū appareat,  
neque etiam pus excretum sit feculētum, sed  
subalbum, & leue, & æquale, & paucum) tūc  
ea quæ resiccant, adstringunt, & glutinātia  
medicamenta erunt adhibēda. In quem sanē  
vsum datur bolus armenia, gummi arabicū,  
tragacantha, amylū, terra Lemnia, & similia.  
Præter cætera autem is puluis mirificè cōdu-  
cit, qui ex terræ Lemniæ, boli armeniæ añ 3 i  
s. tragacanthę, spodii, hoc est eboris vsti añ 3  
i. amyli, nucum pinearū tostarū añ 3 s. semi-  
num lini, cucumeris repurgati, melonū, sin-  
gulorum 3 ii. seminis apii 3 ii. sanguinis dra-  
conis 3 i. conterantur singula, & redigātur in  
puluerem tenuissimū, de quo dētur quotidie



ieiuno ægrotanti 3 ii. cū lacte recens multo.  
 Extrinsecus etiā quæ renes exiccare ac robo-  
 rare possunt admoueantur emplastra, cerata  
 & vnguenta ex oleis, rosaceo, myrthino, fari-  
 na hordei, thure, mastiche, rosis rubeis, & si-  
 milibus composita, quorum copiam in præ-  
 cedentibus quibusdam capitibus habes. Plu-  
 ra etiam ad institutum facientia dicemus in  
 cap. de vesicæ vlceribus.

## DE DIABETE. CAP. XXXIII.

Diabetes diuturna est passio circa renes  
 consistens, multum potum inducēs, vñ cum  
 hoc quod quicquid bibitur, simul vt & quale  
 assumptum est, per vrinā redditur. Quidam  
 verò hanc passionem aquā inter cutē ad ma-  
 tulam, Galeno cap. ultimo libri de Sympto-  
 matum differētia teste, & vrinæ fluorem seu  
 leuitatem, atque ab inexplibili siti dipsacon  
 vocant. Origo ipsius ex retentricis renū fa-  
 cultatis imbecillitate cōtrahitur: attracticis  
 verò tanto robore, vt totū corpus ob im-  
 modicum calorem exhauriat. Renū itaq; pro-  
 pria passio diabetes existit, qua videlicet im-  
 modicè humorē appetūt, ipsūque propter  
 debilitatē retentricis in eis facultatis contine-  
 re nō possunt, sed cum aceruatim in vesicam  
 excernūt. Cōcomitatur egros pertinax sitis,  
 neque vlla satietas ex alicuius liquoris exhi-  
 bitione contingit: adeoque assidue potū assu-  
 mere cogūtur, propterea quod citissimè per

Diabetes  
quid.

Causa.

Signa.



yrinam expellatur potatum. viscera ipsis vri  
 videtur, vniuersum habitum fragile habent,  
 Curatio. & tabes totius corporis accedit. Scopus cura  
 tionis in eo consistit, vt humorum acredinem  
 deleamus, sanguinemque ac cum eo permix  
 tum serosum humorem ad motum tardiozem  
 reddamus, & renum intemperie corrigamus.  
 Mox itaque vbi coeperit malum, nondum ad  
 perfectionem progressum, optimum est cubiti  
 venam secare, & moderate sanguinem aufer  
 re. Utendum etiam mediocriter vrinam cien  
 tibus, quæ vitiatum in renes imbibitum humo  
 rem repurgare possunt. Quod si verò inuete  
 ratum sit malum, neque venæ sectio assuma  
 tur, neq; quicquam quod vrinam cit, exhibea  
 tur. Hæc enim corporis tabe & colliquatio  
 nem, quæ sponte sua in hoc malo sit, accele  
 rant. Concidunt enim in inueteratis vires, &  
 & ex venæ sectione totum corpus acrius reddi  
 tur, & vrinam cientia in ipsis multiplicat ma  
 lum. Maximum autem remedium huic passio  
 ni, vt statim potatū reuomatur. Sit autem per  
 quam frigidus ipse potus: reliquaq; victus ra  
 tione cōuenit vti frigidior. Cibi itaq; exhi  
 beantur boni succi, quique difficulter cōmuta  
 ri possint, & mordacitate careant, & qui mor  
 dacitatem obtundere valeant, vt sunt oua sor  
 bilia, halica ad sorbitionis formam appara  
 ta, carnes porcinae macrae coctæ. Neque verò  
 incommodè exhibetur eis caseus recens com

Victus.



pactus, salis expers, & lac per filices aut ferrū  
 ignitum scissum, seroso humore adēpto. Pro  
 forbitione etiā ptisanæ succus frigidus pro-  
 batur. Ex oleribus autem intybum, lactuca,  
 portulaca. Ex fructibus pyra, poma, mala pu-  
 nica. Inter pisces, saxatiles conueniunt. Bibat  
 vinum rufum, crassum, aquā ampli<sup>9</sup> dilutū,  
 ad falguginosorum humorū proluōnē, qui  
 sitim inducunt. vinum enim corporis tempe-  
 raturam ad dulcorem permutat. Conuenit  
 etiam in potu exhibere succum malorū gra-  
 natorū, rob de ribes, aut oxyacantha, & simi-  
 lia. Quod ad medicamenta ipsa attinet, po-  
 lygoni seu sanguinariæ succus rectē ipsis ex  
 vino nigro propinatur. Symphytū item, pal-  
 mularūmq; & baccarum myrthi, pyrorū-  
 que decoctum: Sirupi, rosaceus, myrthin<sup>9</sup>, &  
 similes. Pastilli quoque de spodio hodie no-  
 minati, ex succo polygoni, aut vino nigro  
 præbendi. Extrinsecus hypochondriis, lum-  
 bis, & pectini illitiones, cataplasmata & cerā-  
 ta refrigerantia adhihenda, qualia sunt quæ  
 ex aceto rosaceo, polēta, lactuca, lēticula pa-  
 lustri, parietaria, foliis vitis, portulaca, & si-  
 milibus apparātur. In hūc vsum proderit in-  
 unctio ex oleis rosaceo & myrthino, aut illi-  
 tio ex succo solani, aut pāpinorū vitis facta.  
 Farina etiā hordei, aceto & rosaceo subacta,  
 cataplasmatibus modo hypochondriis im-  
 pōnda. Aut vtendū hoc emplastro, quod R<sup>x</sup> fa strum.



rinæ hordeaceę ꝑ s. pampinorū vitis, extre-  
mitatum salicum, bursæ pastoriæ añ p. i. cor-  
ticū granatorū 3 iis. portulacæ m i. s. feminum  
cotoneorū 3 i. rosarū rub. m i s. Bulliāt singu-  
la in aqua, donec ad mellis crassitudinē per-  
ueniant: deinde addātur olei rosacei ꝑ ii. olei  
myrthini ꝑ i. & denuo bulliant, & fiat empla-  
strum. Ex prædictis potest fieri ceratū, adie-  
ctis hypocistide, acatia, bolo armenia, resina  
Sudores & cera. Cæterum sudores quoque excitandi  
vt excitā erunt, vt nimirum vitiosi humores ad exuda-  
di. tionem vertantur. Optima verò est in dolio  
facta ex herbis aut aliis rebus calidis euapo-  
ratio ad sudandum, eo modo vt caput extra  
dolum promineat. vel vas aqua calida ple-  
num pedibus ægrotātis in lectulo decumbē-  
tis admoveatur, & sudor eliciatur.

## DE VESICAE CALCULO.

## CAP. XXXIIII.

Pueri la- Generantur in vesica lapides pueris fre-  
pide vesi quētius q̄ ætate prouectis. voraces enim sunt  
cę magis pueri, & perpetui motus, & cibus vtcūq; obla-  
laborāt. tis & nociuis vtuntur, & neq; horā cibum ca-  
piēdi seruāt ordinatā: quinetiam priusquam  
prior assumptus cibus concoquatur, aliū in-  
gerunt: & quum vehemētius à cibo mouean-  
tur, crudus & incoctus in venas cibus distri-  
buitur. Mollia autē sunt ipsorum corpora, &  
quæ facilē cedāt, eiūsq; rei gratiā obturatio-  
nem circa renes nō perferunt. Quum autē  
Causæ.



crassissima lotia in vesicæ amplitudinē perfe-  
rantur, ibidem velut fex & limus aquæ subfi-  
stūt, ac postea ex loci caliditate desiccata la-  
pidescūt. Cæterum aquæ impuræ, & multo li-  
mo refertæ, itémq; duriores & vehemēter fri-  
gidæ, lapidū generationē adiuuāt. Pruriūt Sina.  
laborantes crebrò, & contrectāt pudenda in-  
tenduntq;, & cōtinuò ad mingendū vrgētur,  
ac stillicidio vrinæ vexātur. Curatio huius Curatio.  
mali eadē ferè est, quæ renū, cū calculo af-  
ficiuntur. in hoc tamē diuersa, quòd validio-  
ra medicamenta exigāt vesicæ calculi: & q̃  
vesicæ adhibenda sunt, quæ tū renibus admo-  
uebantur. Lapides autem in vesica oborti, iis Medica-  
potissimum medicamentis atteruntur: semi- mēta la-  
ne fœniculi, smyrnii, granis pæoniæ nigris, pides at-  
radice fœniculi, artemisia, chamæmelo, al- terentia.  
thææ radice & semine, sio quod circa aquas  
nascitur, adiantho, rumicis radice, lapidibus  
spongiarum, tecolitho, lithospermo, lapide  
qui ab ægris lotium eiectus est trito & pota-  
ro, semine xanthii, cortice capparis, abrota-  
ni semine, hyacinthi, & similibus, quæ ī cap.  
de calculo renum sunt commemorata. His  
accedit laudatissimum remedium, passer tro-  
glodytes, qui minimus passerculus est, iuxta  
sepes & muros victū quæritans, vt Paulus &  
Aëtius tradūt, caudam semper subrectā, & al-  
bo colore retro interpunctam habens, & iux-  
ta summum alæ lineamētum cinerei coloris.



Hic, inquam, totus sale cōditus, & crudus in cibo acceptus, morbū perfectē sanat. Calculos enim iam creatos per vrinam expellit, in posterūque generari prohibet. Sanguis denique hircinus ad calculos cū renū, tum vesicæ præsens remediū est. Nam præexistētes soluit, atque ita per lotiū excernit, vt etiā alii ampliū nō gignantur: præterea & dolorem sedat. Quomodo autem is sanguis colligēdus sit, docet Aëtius libro vndecimo capite duodecimo. Porro si vesicę lapides per lotium excerni nō queāt, sed in meatu sint obturati, & vrinæ suppressionē inducāt, egrum supinū decumbere oportet, ita vt coxarū partes magis sursum vergāt, indeq; huc atq; illuc multiformiter cōmouere, quò ex meatu excider lapis: post verò ita adhuc supinū & positū sursum vergentē mingere iubere. Sin verò neq; sic excernere possit, per catheterē instrumentum vrinā proleſtare. Deinde ea quæ lapidē in vesica atterere valent, medicamēta adhibēda. Quòd si neq; per hęc curatio procedat, ad sectionē transeundū erit. Post exactum lapidem victus ratio constituenda est, ne eos renasci contingat, quam in capite de calculo renū memorauimus.

DE SANGVINIS EX VESICAE  
ERUPTIONE, ET GRVMIS  
EIVSDEM CAP. XXXV.

Rumpitur interdū vena in vesica: & par.



tim quidem sanguinē foras mittit, partim ve-  
 rò intus condensatur. Sanguine autē conden- **Signa.**  
 sato, & grumis coactis, eger animo linquitur  
 & pallefcit: pulsusq; paruos, obscuros, & den-  
 fos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac  
 viribus destituitur. Quū verò grumus aliquā  
 do in vrinarum meatum inciderit, is etiam  
 vrinæ excretionē supprimit. Porro sangui- **curatio**  
 nis eruptionis celerrimè auxiliū ferre oportet. **eruptio-**  
 Quapropter si nihil prohibeat, venā in **nis san-**  
 cubito secare, partita sanguinis detractiōe **guinis.**  
 cōuenit, vt hac ratione sæpe & paulatim san-  
 guis detractus reuellatur. Aegri verò in decū-  
 bendo sursum versus collocentur, & coxendi-  
 cibus ipsorum leuandis & simul refrigeran-  
 dis spongiæ posca imbutæ subdantur. Extre-  
 mæ etiam partes constringendæ, & pectē ex  
 spongiis posca imbutis irrigandus. Vrgente  
 malo, summè profunt cucurbitulæ iliis ac lū-  
 bis affixæ. Utendum post irrigationes cata-  
 plasmatis ex polygono, rubo, plantagine, ba-  
 laustiis. Itē cerata ex hypocistide, acatia, bo-  
 lo armenia, & similibus, in capitibus de San-  
 guinis sputo, & Dysenteria commemoratis.  
 Vesicæ etiam infundendus polygoni, plāta-  
 ginis aut millefolii succus, adiectis acatia, bo-  
 lo armenia, pastillis de spodio, & similibus.  
 Infessus etiam ex consimili materia constru-  
 cti conueniunt. Dāda quoque in potu medi-  
 camēta eductiōi sanguinis apta, vt sunt pēo.



niæ grana rubra duodecim tenuissimè trita,  
 terra Lemnia, hippuris, centaurii magni (rha-  
 pōticum hodie vocant) radix, thuris cortex,  
 Grumos & similia. Porro quibus sanguis in vesica in  
 sangui- grumos cogitur, primū tētandū est, vt per  
 ni dissol- medicamēta cōuenientia diffundatur ac dis-  
 uentia. soluatur. In potu itaque prēbenda est artemi-  
 sia, elichrysum (sticada citrinam nominant)  
 absinthium, abrotanum, ramēta vitis, rapha-  
 ni semē, leporis coagulum aut hœdi, vnum-  
 quodq; cum oxymelite. oxymeli etiam per  
 se exhibitum, mirificè prodest. grumos enim  
 dissoluit, vt paulatim subinde per vrinā pro-  
 deāt. Extrinsecūs etiam balnea, vnguenta, ir-  
 rigationes, & alia quę relaxādi vim obtinēt,  
 adhibēda: quę sanè singula ex capite de Re-  
 ceratum. num calculo petenda sunt. Præter alia verò  
 hoc ceratum confert, quod R̄ oleorum lilio-  
 rum alborū, chamæmelini añ ꝑ i s. calamin-  
 thæ, cumini, foliorum sambuci añ 3 iiii. bitu-  
 minis iudaici, ammoniaci añ 3 ii. coaguli le-  
 poris 3 iiii. abrotani, farinae seminis scēnigræ  
 ci añ ꝑ s. ambari subalbidi (sperma cœti vo-  
 cāt) ꝑ i. cū resina & cera quod satis est, fiat ce-  
 ratū, quod pectini imponatur. Quod si hoc  
 modo nihil proficias, sed vrina supprimatur  
 necessitatē inducet catheteris adhibēdi. Per  
 quem ubi vrinas eduxerim⁹, rursus prēdicta  
 in potu exhibenda, ac extrinsecūs admouen-  
 da quę ad grumorum dissolutionem condu-



cunt. Si verò neque sic grumi dissoluātur, ad sectionē haud secūs quā in vesica calculo laborante veniendum.

DE INFLAMMATIONE VESICAE. CAP. XXXVI.

Morborū qui circa vesicam oboriuntur, grauissimus & maximè mortalis inflammatio existit. Cōsequuntur ægros hæc signa. **Signa.** Febri acuta infestantur, & vigilāt, & delirantes aliena loquuntur, & vomūt biliosa pura, & urinam reddere non possunt. Durus fit pectus & pubes cum vehementi dolore & egerendi appetētia, veluti in tenesmo fieri solet. Quod verò egeritur, tenue est, & subsidentiam nō habet. Aliquando & inflationes sequūtur, & aluus adstricta est, intestino recto ab inflammatione vesicæ cōpresso. His itaque si nihil aliud prohibeat, sanguis citra cūctationē ex poplitis vena detrahendus. **curatio.** Viētus quoque ratio, quæ in aliis inflammationibus ac febribus conuenit, adhibenda. **viētus.** Extrinsecūs ijs vtendum, quibus leniendi potestas inest. oleo itaq; vesicæ regio, in quo anethum, semen lini, aliquando etiam ruta & althæa incocta sint, irrigāda. Neque enim frigida & reprimētia medicamenta sunt adhibenda. Primū quidem, quòd vesica nervosa admodum sit. Frigidū enim, vt Hippocrates **Quæ extrinsecūs adhibenda.** ait, inimicum neruis. Dein, q̄ frigida occludant ac stringāt, atq; ad cō urinae suppressio- **5. Aph. 18.**



nē, quæ hoc malū sua spōte sequitur augeāt.  
 & quòd ne humores inflammationē efficien-  
 tes discutiantur aut maturentur, prohibeāt.  
 calida igitur mediocriter admouēda potiūs,  
 quæ quidem dolorem leuant, vrinæ fistulam  
 & meatū laxāt, atque inflammationē ipsam  
 clysteres. discutunt. Clysterib. etiam lenibus aluus  
 subluatur, & post stercorū educationē, oleum  
 anethinū in intestinum leniendi doloris gra-  
 tiā iniiciatur. Præstat autem & papaueris ca-  
 licem simul cum oleo incoquere, & adipem  
 anserinum aut gallinaceum recētem in ipso  
 oleo eliquatum simul infundere. In vehemē-  
 tioribus doloribus cum oleo anethino 3 i pi-  
 lularū de cynoglossa infundere oportet: aut  
 Glans. opium cum myrrha & croco lanæ illitum in  
 podicem indere. In decoctum itē seminis li-  
 ni, fœnigræci, radicis althææ, seminis dauci,  
 & similiū, infideat æger: admoueatúrque, quò  
 in aqua decocti desidēs mingat. vesica enim  
 non satis robusta est ad amplectendā & ex-  
 pellendam vrinā. igitur ipsum ægrū aut ali-  
 quē ex adstantibus scitē ac placidē pectinē  
 premere oportet: neq; id vltra modū, ne do-  
 lor inde intēdatur. Cæterū post clysteres  
 & infusus, fomentis etiā per aquam calidam  
 & oleū in vesicis semiplenis admotis vtendū  
 aut sacculis, quemadmodū in capite de Pleu-  
 ritide ostensum est. Quòd si neq; sic malum  
 cesset, cucurbita vnā cum scarificatione locis



affigēda. Porro abstinendum ab iis erit, quę  
 vrinam vehemēter citant, ac potio multa vi-  
 tanda, vbi euidentis declinatio apparuerit, ad  
 ea quibus discutiendi & emolliēdi vis inest,  
 de quibus suprà sępe dictū est, transeūdum.  
 Chateteris immissione ad inflamatam ve-  
 sicam non temerē vtendum, nisi vrinę sup-  
 pressę periculum admodum vrgeat. tū enim  
 necessariō ad eius vsum confugiendum: non  
 sanē quod mali molestiam tollat, sed vt vrge-  
 tem vrinę suppressionem corrigat, & à pre-  
 cipiti periculo liberet. Post vrinę prolecta-  
 tionē, rursus ad eadem auxilia quę mitigant  
 dolorem veniendum, vsque quō inflamma-  
 tio soluatur aut suppuretur. Solet autē sępe  
 repente inflammatio solui, erysipelate iuxta  
 cutis superficiem oborto, & permanēte, ne-  
 que rursus intrō recurrente. Imō & vrina mul-  
 ta eiecta, sępe iudicatum est malum. Quod  
 si hęc appareant, nihilominus tamē iisdem  
 remediis insistere oportet.

## DE STILLICIDIO VRINAE.

## CAP. XXXVII.

Strāguria græce, stillicidium vrinę lati-  
 nē dicitur: & est, quum paulatim & guttatim *σπαρρυ-  
 ρία*  
 vrina destillat, ac assiduam ad mingendū ir-  
 ritationem facit. Hęc fit, aut ob acrimoniā,  
 vel (vt hodie loquuntur) ardorem vrinę, aut  
 ob exulcerationem vesicę. Acrimoniam ef- *causa.*  
 se causam iudicabis, si vrinę biliosiores sint, *Signa.*



totiusq; corporis habitus, vel etiā reliqua signa bilem testantur, & mordacitas circa vesicam contingat. Vesicæ autē exulcerationem ex iis quæ suo dicetur loco, deprehendes. Si  
**curatio .** itaq; ob acrimoniā vrine stillicidiū accidat, tum sanè exuperantem vitiosum humorem q̄ celerrimè purgare oportet. In quem vsum præterea quæ iam sæpe dicta sunt, mirificè confert serum lactis caprini cum casia fistulari. Cibis etiam contemperantibus, & acrimoniam obtundentibus vtendum: vt est pti sanæ cremor, malua, portulaca, viola, & huiusmodi. Ab omnibus etiam acribus & salsis abstinendū, vino, exercitiis, ira, & tarda comestione. hæc enim omnia bilem in corpore aceruāt. Piscibus vtendum saxatilibus, & balneo aquæ dulcis, quod mirificè humores vitiosos cōtemperare potest. In potu plurima aqua calida dulcis exhibēda, aut hordei decoctum cum syrupis violaceo & rosaceo. vinum non præbendū, nisi dulcius, & dilutum. optimū est & ipsum lac calidum potatum. In summa, quod ad victus rationē attinet, vtendū cibis humectantibus ac aluum emollientibus iusculis. ceterū æger assiduè ad mictionem cogendus. Si enim acre recrementū diutius in vesica moretur, partes ipsas corrodit, & exulcerat. Quinetiā ad obtundendā humo  
**Eolegma** rū acrimoniā subsequens medicamentū porrigendū, quod R̄ cōseruē violacæ ꝯ iii. ma-



luæ 3 ii. seminũ melonũ, cucumeris, cucurbi-  
 tẽ, excorticatorum añ 3 i. gummi arabici no-  
 minati 3 ii. cũ syrupo de liquiritia, fiat ecleg-  
 ma. In hunc etiam vsum præbendum deco-  
 ctũ dulcis radice, aut iste puluis, qui R̃x semi-  
 nis melonis excorticati, citrulli, cucumeris  
 añ 3 iii. seminum cucurbitẽ, portulacẽ, lactu-  
 cæ, añ 3 ii. rosarũ rub. 3 i. succi dulcis radice,  
 glandiũ añ 3 i s. Teratur singula, & fiat pul-  
 uis subtilissimus. de quo 3 i s. quotidie mane  
 in syrupo de dulci radice, aut zulapio viola-  
 ceo, aut rosaceo dentur. Supra modũ etiam  
 cõducit terebinthina resina, lota in aqua stil-  
 laticia rosarum, aut intybi, nucis ponticẽ ma-  
 gnitudine, aliquãdo duarũ triũve accepta.  
 hæc enim Galeno lib. 5. de Tuend. val. teste,  
 nõ solum aluum citra noxam solvere, atque  
 adeo acres humores à meatibus vrinariis a-  
 uertere potest, verũ etiam viscera, renes potis-  
 simum abstergere. Et fuerunt, qui solo huius  
 vsum curati sunt. clysteres etiã nõ parũ prodes-  
 se cõstat ex decocto maluæ, violarũ, althẽe,  
 foliorum salicis, nymphææ, & aliis suprã cõ-  
 memoratis apparati, adiecta casia fistulari,  
 saccharo & oleo violaceo. Quod si verò acri-  
 monia adhuc augeatur, etiã per penẽ lac ip-  
 sum cũ amylo in vesicã iniiciendum. In cum  
 etiã vsum decoctum papaueris albi inũcere  
 oportet. Extrinsecus pubes oleis violacæo,  
 nymphææ, cũ modico caphuræ inungendus.

Puluis.

clysteres



Si autem stillicidium vrinae ob vesicae exulcerationem accadat, curatio ex proprio capite petenda erit.

## DE DIFFICULTATE VRINAE.

## CAP. XXXVIII.

*ὀνίξις.* Dysuria Graecis difficultas vrinae Latinis appellatur. Est malum, in quo vrina aegre & difficulter excernitur. Fit ob vesicae imbecillitatem, atque adeo frigidam eiusdem intemperiem, quae actionem illius laedit. Causa facile ex victus ratione praecedente, & ex aegri sermonibus deprehenditur: vrina item alba, & aliis quae frigidam intemperiem ostendere iam saepe diximus. Curatio per ea quae calefaciunt, fieri solet. Pectinem itaque oleis calidis, rutaceo nimirum, anethino, liliaceo, scorpionum, & de castoreo fouere oportet. Admonenda etiam fomenta, & sacculi ex chamemelo, abrotano, betonica, artemisia, ruta, calamintha, sabina, & similibus herbis confecti. Aegrum etiam oportet in praedictarum herbarum decoctum desidere, ac inuenterem contegere ac calefacere. Interdum etiam proderit per sedem earundem herbarum decoctum, adiectis oleis calidis infundere. cibis praeterea utendum calefacientibus, & vrinam ducentibus: velut est pastinaca probe cocta, feniculum, apium, asparagus, hipposelinum, & quicunque eius generis existunt. vrinam etiam commode cient cancri, & herinacei terreni. car-



nem enim illorum exiccare oportet, & drachmæ pondus in potu accipere. Aromatum denique decocta in potu exhibenda, aut eorundem confectioes dandæ. Præter alias verò summè conferunt, cōfectio diacalaminthæ, dialaccæ, & diacurcumæ. Theriaca etiā in potu data, mirificè confert. Multa alia in hunc vsum facientia ex superioribus capitibus petenda erunt.

## DE SUPPRESSIONE VRINAE.

## CAP. XXXIX.

Ischuria, hoc est vrinæ suppressio, malum *ισχυρία* est, in quo ægris in totum vrina suppressitur & cohibetur. Hęc aliquādo accidit ob im causa. becillitatem, vesicā ea quæ in ipsa continetur, arctè completi ac exprimere nō potente. Interdum autē eius ceruicis meatu à crassis humoribus, aut lapide obturato. Quādoque verò propter inflammationem, aut scirrhum, aut alium quempīā tumorem meatū angustum reddentē, & perfectè obturātem. Interdum etiam ob carunculam, aut callum in meatu natū. Sanguis etiam in grumos cōcret<sup>9</sup> in vesica, suppressæ vrinæ causa existit. Pus itē crassum per ipsam vesicam à renibus aut iocinore, aut alia quapiām superiore parte excretum, vrinæ supressionem efficit. Accidit & sanis sēpe vrinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis



Signa.

si diutius continuerint mictionē. afficitur enim in iis comprehensua & vrinam obuolvens vesicæ vis, ex immodica videlicet repletionē & tensione. Imò quantum amplitudo ipsius vesicæ expleta circū tenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Si propter imbecillitatem fit, ex iis quæ frigidam intemperie monstrant deprehenditur. Si à crassis humoribus, ex victus ratione quæ præcessit. in ocio enī educatus, multis cibis crassos viscososque humores generare potētibus vsus est. Si à lapide, eius notæ, quæ suprā dictæ sunt, præcesserunt. Si ab inflammatione aut alio tumore, dolore, febre, ac visu facile dignoscitur. Quòd si ob carunculam aliquam aut callum suppressio vrinæ orta fuerit, ex præcedētibz vlcēis notis, & ex eo quòd traiecto cathetere vrina vacuatur, intelligere possum⁹. Immissus etiam catheter in ea parte vbi antea vlcus esse coniiciebatur, dolorem mouet. fracta sub cathetere carne, sequuntur cū vrinæ excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si grumi obturationem fecerint, sanguinis præcedit excretio & effluxus. vbi verò pus obstruxit, ex præcedentium notitia sciri licebit. Nam vel vesica vel renes antea malo aliquo laborauerunt, aut in parte aliqua renibus superiore præcessit abscessus: quo rupto, pus in renes, & subinde in vesicam transumptum est. Reliqua causa de sermonibus



ægrotātis cognoscetur. Curādi ratio iuxta Curatio.  
 causarum diuersitatem alia atque alia erit. Si  
 enim propter imbecillitatem & ægrum ve. Si pro-  
 ficæ sensum, vrinæ suppressio contigit, irri- pter im-  
 tando submouere, ac excitare eius actionem becillita-  
 oportet, & per infusus, fomenta, & alia quæ tem.  
 in cap. de Difficultate vrinæ dicta sunt, auxi-  
 liari. vitanda tamen sunt ea quæ vrinam du-  
 cunt, ne scilicet multitudine eius vesica distē-  
 datur. AEger prætereā sic figurandus, vt de-  
 cliuis sit ceruicis vesicæ positus, ac subinde  
 manibus supra pubē admotis, vrina sensim,  
 comprimendo tumorem, expellenda. Nitro  
 etiā, aut pediculo viuo, aut alio quod excre-  
 toriam actionē vesicæ irritare potest admo-  
 to, citius vrina procedet. Si verò à crassis hu-  
 moribus vrinæ retentio oriatur, fomētis, in- Si ob cras-  
 fessionibus ac cataplasmatibus ex herbis cali- sos hu-  
 dis compositis inchoāda. Hæc enim crassos mores.  
 humores dissoluere, ac incidere possunt. Pre-  
 terea quæ in cap. de Difficultate vrinæ com-  
 memorata sunt, valet hoc vnguentū quod R̄  
 oleorum scorpionis, nardini, liliacei añ 3 iiii.  
 sagapeni, bdellii, opopanacis añ 3 ii. pingue  
 dinis anseris, anatis añ 3 s. radicis helenii, pu-  
 legii, calaminthæ añ 3 ii. gummi dissoluatur  
 in vino, & cum cera quod satis est, fiat vnguē-  
 tum. vesicæ etiā iniiciendū oleum scorpionū,  
 aut liliaceū, aut aliud quod crassos humores Si ob in-  
 dissoluere potest. Quod si verò propter inflā flamma-



tionem, aut aliū tumore. Si ob lapidē aut sanguinis grumos. Si ob carunculam aut callū. Si ob negotiorū importunitatem. mationem, aut aliū tumorem vrina supprimatur, curatio ex propriis capitib<sup>9</sup> petēda. Itidem faciendū, si à lapide aut grumis vrina suppressa fuerit. Lapis siquidē ex loco excutiendus & dimouendus, quemadmodum cap. 34. est prædictum. Sanguinis verò grumi dissoluēdi, eo modo sicut cap. 35. dictum est. Quod si ob carunculam aut callum suppressa fuerit vrina, balnea & alia remedia relaxantia, ac vrinariam fistulā dilatantia sunt adhibenda, de quibus in cap. de calculo renum abunde diximus. In sanis autem quum ob negotiorum importunitatem vrina diutius retēta vesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, manibus supra pubem admotis ac vrinā sensim expressa: veluti in curatione suppressionis vrinæ ex imbecillitate vesicæ factæ, fusiùs ostensum est.

DE VLCERIBVS VESICAE, ET  
EIVS CERVICIS. CAP. XL.

causæ.

Signa.

Exulceratur vesica aut propter abscessū, aut ob tuberculum quod præcessit, aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosione, aut aliam similem causam. Aegros dolor acutus vesicæ omni quidem tempore comitatur, maxime verò tempore mictionis, & excretionis puris. Et siquidem sordida fuerint vlcera, feculēta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentiam ad modum farinæ habent. Aliquando autem pelliculæ tenues ad



modum foliorum & lanarum cum vrina ex-  
cernuntur. Si verò serpendo depascent vlce-  
ra, subcruenta excernuntur, & saniosa, ac foe-  
tentia. Ad hæc accedunt difficultas emittende  
vrinæ, & pudédi arrectio, ac petulantia. Do-  
lor autem non solum cum vrinæ meatus fue-  
rit exulceratus, sed & quum in profundo ex-  
ulceratio consistit. Cognoscetur autem num  
in profundo, siue iuxta vrinæ fistulam sit ex-  
ulceratio, ex eo, quòd si in amplitudine vesi-  
cæ fuerit, dolor circa pubem consequatur. Si  
verò iuxta ceruicem vesicæ vlcera existant,  
tempore mictionis tantum, & maximè vbi  
mingere inceperint ac cessauerint, dolor sen-  
titur: atq; id amplius contingit, si vrinæ sint  
acriores. Insanabilia verò, aut saltem curatu  
difficillima sunt vesicæ vlcera: tum quia ipsa  
neruosa est: tū etiam quia vlcera eius vrina,  
quæ acris est natura, assiduè contingit, ero-  
ditque, nec vt glutinentur, permittit. Verum  
quū sæpe etiam præter expectationē quædā  
eueniant, cura aggredienda est, per quam si  
nihil aliud, certè accessorii dolores minuen-  
tur. Primum igitur persuadendū est ægro vt  
decumbat, & in lecto quietem toleret: idque  
maximè, si febres simul adsint. Deinde reme-  
dia febribus intermittentibus adhibēda. Ma-  
ximū verò hic fuerit lactis potus, neq; post  
vllum aliud remediū secundo loco id habē-  
dum. nam & asperitates lenit, & vlcerationes

Insanabi-  
lia, aut  
saltē dif-  
ficillima  
curatu  
cur vesi-  
cæ vlce-  
ra.  
curatio.

Lactis  
potus.



eluit, malumque abstergit. Reliqua verò virtus ratio talis sit, qualis ea est quæ in renum exulceratione adhibetur. Per medicamenta etiam ægrum cōsolari oportet, quæ pubi imponuntur. Etsi quidem cum inflammatione exulceratio cōsistat, cataplasmata ex lini semine & fœnogreco, aliâq; quæ suprà in cap. de vesicæ inflammatione dicta sunt, apta erūt. Porro si exulceratio pascendo serpat, subadstringētia extrinsecus apponēda sunt: atque hæc quidē calida, vt ob calorem quidē partes circūdolitantes leniendo iuuent, ob potestatem autem ipsorū vicinos locos depascere prohibeant. Utendum etiā iis quæ per cathetrem infunduntur medicamentis. Infundendum itaq; inflammatis locis lac recens multum, aut rosaceum optimū tepesactū. Si verò nihil horū adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, mordacitatis tēpore instante. Per sedem quoq; ptisanæ succus, aut decoctum ex semine lini, cucumeris decorticati, fœnigræci, malua, aut lac cū rosaceo infundendum. Frequenter autem & in aquam calidam desideat æger, & indecocta relaxantia: nam hæc dolores mitigant. Atqui vbi vlcera iam pascendo serpunt, per catheterē in vesicam iniiciēda sunt, quæ depastionem sistere possunt. vt sunt acacia, hypocistis, alumen, malicoriū, gallæ, terra lemnia, bolus armenia, & similia. Quod si verò sordida sint



vlcera, medicamēta infundēda sunt, quæ re-  
 purgandi & abstergendi facultatē obtinent:  
 velut est mulsa dilutissima, vel lac cum pau-  
 lulo mellis, vel cū cucumeris semine decorti-  
 cato. Si verò acrimonia consequatur & mor-  
 dacitas, lac recēns mulctū cum optimo amy  
 lo infundatur, aut Pompolyx, hoc est thu-  
 tia, pluribus aquis elota & exiccata, atq; de-  
 inde cum lacte diluta. Quū verò repurgata  
 fuerint vlcera, adiuuare oportet quō ad cica-  
 tricē perducātur, atq; id per insecus adstrin-  
 gentes, & eiusdē facultatis emplastra, fomen-  
 ta, & irrigationes. Ceterū si ad multum tem-  
 pus exulceratio duret, tūc sanè & exacerba-  
 tiones & interualla siue remissiones agros  
 apprehendunt. Quapropter in exacerbatio-  
 nibus quidem cataplasmata, fomenta, & irri-  
 gationes, leniēdi vim habentia adhibeātur.  
 Remissionis verò tempore iis quæ malū de-  
 struere possunt, vtendum. Pectini itaq; rube-  
 faciētia ac sinapismi imponātur, ac victus ra-  
 tione viribus reparandis apta vtendū. Quōd  
 si nō mansuescat malum, crustas circa pubē  
 infligere oportet, aut per medicamenta aut  
 per ferrum, sinerēque vt per multū tempus  
 vlcera se per effluxionem repurgēt. Nō ine-  
 ptē verò medicamenta dolorem leuantia in  
 potu exhibueris, si vehementes instēt dolo-  
 res. In hūc sanè vsum cōueniūt pastilli de ha-  
 licacabo, seu trochisci de alchichengi hodie



LEONHARTI FUCHSII

nominati, cum opio. In vesicam quoq; iniicienda, quæ dolores mitigare possunt.

DE HIS QUI RE VENEREA  
VTI NON POSSVNT.

CAP. XLI.

viſtus.

vnguētū.

Simpli-  
cia me-

Qui mariti existunt, at re venerea vti cūpiūt & debēt, ignaua autē & impotentia mēbra ob frigidā eorundem intēperie aut aliud malum habent, infernas partes exerceant, & cibis vtantur calefacientibus & bonum succum generantibus carnibus gallinarū, caponū, perdicum, phasianorum, iuuenū colūbarū, auicularū montanarū, passerum potiss. testiculis gallorū, & similibus. Edulia verò nō solū bene nutriētia, sed etiā flatuosa ipsis cōueniunt: veluti cicer, fabę, alica, bulbi, porri, pastinacę radix & semen, nuces pineę, amygdalę dulces, & similia. oua itē perdicis ad coitū excitant. Dormiant in mollibus lectis, legāntq; quæ ad coitum cohortātur, lectiōnibus itē assideāt. Naturalia continuē ex oleis, vnguētis, aliisq; calefacientibus medicamētis confricent. In quē vsū hoc vnguētū vti licebit, quod ℞ oleorū liliorū alborū ℥ i s. de castoreo ℥ s. piperis, nigellę, pyrethri añ ʒ i. myrrhę ʒ s. euphorbi gr. iiii. cerę quod satis est, fiat vnguētū. Medicamētis etiā quæ seminis multitudinē augere, & calefacere possunt, vtātur: qualia inter simplicia sunt cruce, sinapi, nasturtiū hortense, semen rapi,



vrtice, ari radix, piper, satyriū, horminū, ani- dicamen  
 sum, scylla, orchis: cuius quidem maior bul- ta coitū  
 bus cū lacte potatus, tentiginē cit: minor ve- concitan  
 rō cū aqua potatus, tentiginem remittit. Te- tia.  
 ftes vulpis ficci triti bibiti, innocuā & mini-  
 mē vanam membri tentiginem faciunt. Par-  
 tes etiam scinci renes amplectentes, ad tenti-  
 ginem pudendorum excidendam bibūtur.  
 Pudendum cerui aridum vrito, & 3 i cū vino  
 meraciore prabe. Inter composita isto vti li-  
 cebit, quod R<sup>x</sup> confectionū dianthos, pliri- Eclegma  
 sarcoticō, diagalangæ añ 3 iii. diasatyriō 3  
 vi. nucum pinearum, amygdalarū dulciū, pi-  
 staceorum añ 3 ii. satyrii 3 i. radice ari 3 i. se-  
 minum cruce, vrticæ, nasturtii hortēsis añ 3  
 i s. caudæ scinci 3 s. nucis Indicæ 3 i. piperis  
 longi, zingiberis añ 3 i s. scobis pudendi cer-  
 uini 3 i. cum saccharo, & syrupo de menta  
 quod satis est, fiat eclegma. de quo ante cœ-  
 nam, aut ieiunis, per se, aut cum vino detur  
 drachma vna, aut duæ.

## DE SEMINIS PROFLUVIO.

## CAP. XLII.

Gonorrhœa Græcè, seminis profluuiū La-  
 tinè dicitur. Et est excretio seminis præter vo- γονορ-  
 luntatem, citra pudendi tentiginē. Fit ob re- ροία.  
 centricis in vasis seminariis facultatis imbe- causæ.  
 cillitatem, aut ob aliud malū, quod semina-  
 riorum vasorum partes eodē modo, quo ex-  
 pultrix secundum naturam facultas mouet:

t iii



veluti in comitialibus & aliis violentioribus  
 cōuulsionibus contingit. oboritur autē ali-  
 quando etiā ex seminariorū vasorū fluxio-  
 ne. Semen quod profluit, aquosum, tenue,  
 citra appetentiā coeundi, & ut plurimū qui-  
 dem citra sensum, quandōq; verò cum volu-  
 ptate quadam promanans. Corruptur sic  
 patientibus sensim vniuersum corpus, ac gra-  
 cilescit, præsertim circa lūbos. consequitur &  
 debilitas multa. Et si pudendo nō intēto eue-  
 nerit, retentricis in seminariis vasis imbecil-  
 litatē sequitur. Si verò intēto pudendo conti-  
 gerit, cōuulsionī quodāmodo similis erit af-  
 fectus. Nō solūm viris, sed & mulieribus ac-  
 cidit, & in fœminis sanē egrē tollitur. Cura  
 cōmunis est cū ea quæ in omni fluxione ad-  
 hibetur. Primū igitur in quiete, paucō cibo,  
 ac aquæ potu egros adseruare oportet. Dein-  
 de etiā lūbos & pubē cōtegere lanis rosaceo,  
 aut melino madefactis. Neque verò ineptæ  
 sunt spōgię poscā imbutæ. Sequentibus vero  
 diebus cataplasmatibus, emplastris, & vnguen-  
 tis ex palmis, coronis, acacia, hypocistide,  
 rhoë, & similibus suprā sæpe cōmemoratis,  
 vtendū est. In fœsibus quoq; adstringentibus  
 ex rubi, plantaginis, myrthi, & similiū deco-  
 cto, vel etiā aquis. Cibis autē vtendū qui ægrē  
 corrūpuntur, & difficulter permutātor, & re-  
 siccādi vim habēt. Dandū etiam cū potu ac  
 cibis, agni seu viticis ac canabis semē, præ-

*o. parte  
 hanc*



sertim tostū, rutæ itē semē & folia, lactucę se-  
 mē & caules, ac nymphęæ (nenuphar hodie  
 appellant) radix. In potu verò quotidie pro  
 aqua cōmuni, aqua in qua ferrū sæpe extin-  
 ctū est, prębeatur. Quid multa? omnē acritū-  
 rerū esum, & multi vini potu, & olerū exhi-  
 bitionē vitare oportet. victus verò ratio vni-  
 uersa resiccatoria & adstringēs constituēda  
 est. Ea etiam medicamēta quę semen extin-  
 gunt, propināda, veluti est agni seu viticis  
 semen, tostū & perfrictū. folia itē eius, & flo-  
 res, venerē cohibere credūtur, nō comesta-  
 tantum, sed in potu sumpta, & substrata. Por-  
 tulaca comesta, & lactucę semē potatum, &  
 nymphęæ radix & semē in cibo accepta, se-  
 men refrigerando extinguunt. Ruta verò co-  
 mesta calore suo semen corrumpit. calamin-  
 tham autem assidue edentes generandi po-  
 tentia priuātur. Ex iis atque aliis eius farinę  
 medicamētis varia componi possunt reme-  
 dia, hoc potissimum, quod R̄ specierū diacu-  
 mini, diacalaminthę añ 3 i s. seminis agni,  
 rutæ añ 3 i. calaminthę 3 ii. seminis lactucę,  
 portulacę 3 i. sacchari equali omniū pōdere,  
 misce, fiat tragea, de qua detur 3 i. aut 3 i s. in  
 vino austero diluto. Optimū etiā cēsetur, la-  
 minā plumbeam lumbis supponere: multū  
 enī refrigerare cōsuevit. In his verò qui plū-  
 bi duriciē ferre nō possunt, cōsulere oportet  
 vt ex prædictis herbis qđā arefactę subster-

t iiii

*water lib  
 2 water  
 100*

Semen  
 extingue  
 tia.

*prædictis*

Tragea.



nantur. Potissimum verò ad hunc vsum con-  
ferūt viticis folia, & modica ruta ac calamin-  
tha: maximè verò ipsæ rosæ. Profunt enim  
hæc citra renū læsionem. vehementes nanq;  
refrigerationes eorū quæ lumbis subduntur,  
renes iniuria afficiunt. Ipsum etiā stratū non  
valde molle sit. Decubitus porrò vt plurimū  
in latus fiat, vitatā formā decubit⁹ supinā, ne  
lumborum arteriæ inde calefiāt. Post prima  
autē morbi tēpora exercitiis egrū cōmittere  
oportet, quib⁹ totū corpus, & præsertim par-  
tes patientes cōfirmentur. Bonū fuerit etiā si  
nihil prohibuerit, ad frigidā lauationē defu-  
gere, quæ omnē morbū ex fluxione obortū  
depellere consuevit, maximè si medicamen-  
taria qualitate aqua sit prædita. conuenit itē  
per interualla quædā iis quæ rubefacere, atq;  
ea quæ in profundo sunt ad superficiē trāsfer-  
re possunt, vti. Ceterū omnē de rebus vene-  
reis cogitationem excludere oportet.

DE EXVLGERATIONE PV-  
DENDI. CAP. XLIII.

Naturaliū ac pudendorū vlcera citra in-  
flammationē oborta, medicamētis indigēt,  
quæ vehemēter resiccant: cuiusmodi sunt ex  
charta combusta, anethū vstum aridū, aloë  
arida in puluerē redacta, præsens sanè reme-  
diū: & pistolochiæ (quam aristolochiā rotun-  
dam vocant) radix. Inter composita is puluis  
potissimum conuenit, qui R̄ aloës 3 ii. gallæ

Puluis.



3. i. sanguinis draconis, boli armenia, pom-  
pholygis, id est thutia añ 3 i. radices pistolo-  
chia 3 s. myrrhē 3 i. gummi arabici nomina-  
ti 3 ii. aluminis vsti 3 s. misce, fiat pulvis. At si  
humidiora ac sordidiora ulcera euenerint,  
primum dilutiore mulsā, mox lacte caprino  
vltus abstergēdum. Dein pulvere iam dicto  
vtēdum, aut lapide hæmatite, aut thure, aut  
malicorio, aut lemnia terra, in puluerem re-  
dactis vtendum. Quod si simul inflammatio  
affuerit, hæc ipsa primum remouenda erit,  
linteis in aqua stillaticea rosarum, aut sola-  
ni, aut portulacæ, albo oui adiecto, madefa-  
ctis, & loco patienti admotis.

## DE RAMICE. CAP. XLIIII.

Cele Græcis, ramex & hernia Latinis, ru-  
ptura Barbaris scriptorib<sup>9</sup> dicta, variis fit mo-  
dis, & per adiectionē varias accipit appella-  
tiones. Si enim peritonæo rupto intestina in  
scrotum deuoluuntur, Enteroccele græcè, lati-  
nè autem ramex intestinorum dicitur. Quan-  
do verò intestina suprà in inguinibus hæret,  
Bubonoccele Græcis, Latinis autē ramex in-  
guinis vocatur. Quod si humor aliquis lētus  
in scroti parte colligitur, Hydrocele Græcis,  
aquosus verò ramex latinis appellatur. Quū  
autem caro dura intra testium tunicas incre-  
scit, Sarcoccele græcè, carnosus verò ramex la-  
tinè dicitur. Quid multa? nomē semper à re-  
bus opplentibus, ramicis genera accipiunt.

κῆλη.

Ramex.

εντερο

κῆλη.

βυβωνο

κῆλη.

ὑδροκή-

λη.

σαρκοκή-

λη.



ἐπιπλο-  
κήλη.  
κυρσοκή-  
λη.  
causæ.

*carinosus*

Signa.

Hinc si omentum in scrotum descendat, Epiplocele, id est ramex omenti nūcupatur: Sic ubi venę ultra modum repletę glomerantur ac dilatantur, Cyrsocele, hoc est varicosus ramex nominatur. Ramices intestinorum & inguinis generantur, vel quod peritonęū plus æquo extenditur, vel quod frangitur, utrūq; verò ex violēta quadā occasione præcedēte, nempe ictu, aut saltu, aut clamore, aut ingentis molis sublatione accidit. Aquosus verò ramex quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa cōtingit. Ex occulta quidē quando adauctis vasis in scroto contextis, aquosa materia propulsa, & sanguini admixta, ad eas partes decubuerit. Ex manifesta autē causa, quādo propter percussione collisis aut fractis vasis, sanguis subinde defluēs ad aquosam substantiā trāsmutatur. Carnosus ramex itidē ex latente causa nascitur, testiculo fluxione experto, induratōque, aut ex ictu, aut imperita post ramicis succisione curatione. Notę utriq; ramici & intestinorū & inguinū communes. cōspicius enim in scroto aut inguine tumor, qui in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisq; occasionibus maior quā prius euadit, cōpressus tardē quidē recurrit, celeriter autē rursus deuoluitur. Peculiaria ramicis ad extensionē relati indicia sunt, quod non vniuersim, sed particulatim tēporis spatio, & ob causas quaslibet intestinū deuolua-



tur, tumor equabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutū est peritonæo constricto. Ex ruptura facti ramici signum est propriū, q̄ vniuersim ab initio intestinum deuoluatur, idque ob causas violentas durat: tumor immēse magnitudinis, inēqualis, & per summa protinus in cute emineat. q̄ scilicet intestina extra peritonæum elabantur. Aquosus ramex ita dignoscitur, q̄ tumor sit dolore vacans, firmus, ac stabilis in scroto, quacunque tandē occasione non euanesces, sed in iis qui modicum continent humorem cedens: in illis qui copiosum habēt, nō item. Et cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: quum feculentus, aut sanguineus, aut rubicūdus, aut liuidus apparet. Carnosum ramicem color vbiq̄ sui similis cū duritia cōsequitur. si autem tumor in scirrū coalescat, nullus nec color nec sensus adest: si maligni referat naturā, dolor vrget punctorius. Cæterum ramicem intestinorū & inguinum curamus hūc in modum. Aegro re-supinato diductis cruribus, intestina sensim reducere, ac reducta deinceps idoneis ligamētis retinere oportet. si verō reductioni minus obtemperēt intestina, emolliētia, ac inflammationē dolorēque leuantia & flatus dissoluētia fomēta, linimēta, balneāq; adhibēda: qualia sunt quæ ex malua, chamæmelo, anetho, seminibus lini, fœnigræci, carci,

*aquosus*

*carnosus*

Ramicis  
intestino  
rū & in-  
guinū cu-  
ratio.



## Ceratū.

## victus.

Decoctū  
glutinās

anisi, cumini & similibus componūtur. lana etiam succida, vino & oleo madefacta, loca dolentia fouenda sunt. reductis intestinis, conandum vt intestina idoneis ligamentis retineātur. In quē vsum cerata & emplastra sunt adhibenda: potissimū verò hoc, quod R<sup>x</sup> picis naualis, mastiches añ 3 iii. thuris 3 ii. hypocistidis, sarcocollæ, acaciæ añ 3 i s. lapidis hematitis, sanguinis draconis, aloës añ 3 ii s. boli armenię, symphyti radicis, gallarū, mallicorii añ 3 iii. vi<sup>c</sup>i quercini 3 i s. aristolochię vtriusque 3 ii. rhois, balaustiorū añ 3 i. sepi hircini § ii. terebinthę & ceræ quod satis est, gummi antea in aceto aut vino dissolutis, formetur ceratum, quod in pelle arietis impositum alligetur, nec ante septimum aut nonū diem solvatur. Interea eger in lecto maneat diebus triginta, & à cibis inflatibus abstineat, vino copioso, vehemēti motu, nepe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis: bibatq; decoctū, quod R<sup>x</sup> pedis leonis, saniculę, herbę fortis, (quam cōsolidam sarracenicam vocāt) eupatorii añ m i. cynoglossi officinarum, polygoni, clematidis daphnoidis, plantaginis añ m s. radicis symphyti § s. radicis symphyti petræi 3 v. seminis myrthi 3 iii. balaustiorū 3 ii. foliorum lauri 3 i s. bulliant in vino & aqua iustę quantitatis, quo ad tertia pars absumpta fuerit: dein colentur, & cū saccharo fiat potio delectabilis, de qua singu



lis diebus matutino tempore dētur ꝯ iiii. Cæ-  
 terū maximè etiam annitēdū, ne aluus in-  
 dure scat: ne scilicet si nimio conatu stercora  
 excernantur, simul intestina iterū deuoluan-  
 tur. vtendum quoque cōuenienti, vt antea di-  
 ximus, deligatura, præcipuè si occasio motū  
 præciperet. Porro aquosus ramex per ea que  
 calefaciunt & exiccant medicamenta curan-  
 dus, vt est farina fabarum, baccæ lauri, semē  
 lini, dauci, althææ, & id genus alia, de quibus  
 in cap. de Ascite, & reliquis aque inter cutem  
 generibus abundè dictū est. Chirurgicā præ-  
 dictarum, omniumq; aliarum ramicum spe-  
 cierum curādi rationem lib. 6. cap. 62. & se-  
 quentibus copiossimè tradit Paulus: quā vt  
 hic tractemus, non est nostri instituti. quare  
 ad vteri pathemata progrediemur.

Ramicis  
 aquosi cu-  
 ratio.

## DE SUPPRESSIS MENSIBVS.

## CAP. XLV.

Mulieribus quibusdā menses supprimun-  
 tur, vel naturaliter, vel præter naturam. Si na-  
 turaliter, hinc colligere licebit, quòd mulier  
 nulla inde molestia vel totius corporis, vel  
 vteri afficiatur, ætatis itaq; ratione plurimis  
 menses quartodecimo anno fluere incipiūt,  
 paucissimis ante tertium decimum aut duo-  
 decimum: plerisque autem post quartum de-  
 cimum erumpunt. desinunt verò aliis anno  
 quinquagesimo, paucis autem vsque ad sexa-  
 gesimum durāt: steriles etiā mulieres, in vte-

Causæ.  
 Quibus  
 naturali-  
 ter mēses  
 suppri-  
 mantur.



Quibus  
præter  
naturam  
menses  
detinen-  
tur.

ro habentes & saltrices, naturaliter non pur-  
gantur. Nā quicquid in eis recrementi est, ni-  
mia exercitationis vehemētiā absumitur. &  
vt summatim dicā, mulieres calidioris tem-  
peraturæ, validisq; exercitiis vtētes, & agre-  
stes, parum aut nihil per mēstrua purgātur.  
Nonnunquā autem præter naturā menses ni-  
mia vel pinguedine vel gracilitate supprimi  
solent. Pingues enim exanguiores reliquis  
sunt, minimasque venulas habēt: quique illis  
inest paucissimus sanguis, ferē in pinguedi-  
nē trāsit. Graciliores verò ob diuturnū aliqūe  
morbū extenuatæ, nihil prorsus superuacui  
sanguinis cōtinent. præterea mēses non de-  
fluūt, quibus sanguis vel crassius, vel lētus, vel  
per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares,  
aut sedē, aliis etiā, q̄ thorace sanguinē cie-  
ctauerint, aliis q̄ dissecta vena ultimā san-  
guinis inanitionē tolerauerint, menses sup-  
pressi sunt. sed & reliqua excretionū genera  
idē sæpe effecerūt, vt sudoris multitudo, affi-  
dui vomitus, alui p̄fluvia ac pustularū omne  
genus quæ in cute efflorescunt. sic præter has  
omnes causas menses supprimūtur ob acutos  
maximósq; morbos, & ob alimenta, quæ vel  
paucitate, vel multitudine sua excesserint.  
A paucio enim alimento paululū quidpiam  
confestim expirat: à multo verò meatus ob-  
struuntur, & excretio intercipitur, sæpe etiā  
in ore yteri calli oborti, aut carnis excrescē-



tia, aut pinguedinis copia purgationē men-  
 struam impediūt. Quibusdā etiam cicatrices  
 vlcerū, quæ in vtero præcesserūt vasorū ora, à  
 quibus sanguis in vterū ferebatur, obstruxe-  
 runt. Nōnullis post abortū vteri ore exulce-  
 rato, ac deinceps ad cicatricē ducto, obstru-  
 ctio ac cōpactio superuenit, quæ sanguinis  
 per vterū excretionē aufert. curæ quoq; per-  
 tinaces, formidōq; immodica, & ingēs mœ-  
 ror mēses intercipiunt. Frigida denique aut  
 alia vteri intemperies mēses remoratur. Sup-  
 pressa mēstrua totius corporis grauitas, nau-  
 seæ, fastidia, & horror inequalis cōsequūtur.  
 dolores præterea circa lumbos, femora, col-  
 lū, sinciput, & fundamenta oculorū existūt.  
 Itē febres ardētes, & vrinæ nigricātes, cū ru-  
 bra quadā sanie: perinde ac aquæ, ex qua nu-  
 per mactatæ carnes ablutæ fuerūt, fuliginem  
 quis miscuisset, quibusdā etiā vrina aut diffi-  
 culter reddit, aut omnino supprimitur: cau-  
 sarum verò diuersitas magna ex parte de ser-  
 monib<sup>9</sup> egri cognosci potest. Frigidioris au-  
 tem tēperature fœminas ex iis potissimū di-  
 gnoscemus, q̃ somnolētiores, ad omnēmq;  
 motū segniores sunt, ac colore candidiores,  
 seu plūbeæ, vrina aquosa, & aliis quæ iam sæ-  
 pe dicta sunt. pituitam quoque iugiter ex-  
 creant, & interdum etiā pituitosos humores  
 euomunt. Calidioris autem temperaturæ  
 notæ, iam commemoratis prorsus contrariæ

Signa.

Frigidio-  
ris tēpera-  
turæ no-  
tæ.Calidio-  
ris.



Plenitudinis. - sunt. Plenitudinis verò, quam obstructio cōsequitur, notæ ex aliis capitib. colligēde. quæ enim hac ipsa laborant mulieres, menstruorum tempore magis grauātur, dolorēsque circa lumbos & pubem percipiunt, venæque illis

Frigidioris temperaturæ curatio. in tumorem insignem eleuantur. ceterū si à frigidis ac crassis humoribus menses supprimuntur, cibos calidos & extenuātes, de quibus iam sæpe est dictū, exhibebimus. Vinū etiam fuluum, odoratum, & antiquum vt bibant præcipiemus. exercitia quoque, & alia quæ corpus calefacere, crassosque ac lētos humores incidere & extenuare possunt, præscribemus. Si plenitudine laborauerit mulier, & nihil aliud prohibeat, à sanguinis missione curandi ratio inchoanda erit. Secāda verò vena malleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus. neque inutile erit, cruribus cucurbitulas affigere. Sin plenitudo nulla fuerit, purgatione vtendū, humoribus tamē antea ad expulsionē preparatis. In quē vsum

Decoctū hoc decoctum exhibeatur, quod Radicum acori, iridis, oreolini, asparagi añ ʒ i. seminū apii, fœniculi, rusci, anisi, dauci, ammi, vrticæ añ ʒ i. calaminthæ, absinthii añ m s. organi, abrotani, artemisiæ, pulegii, asari añ m i. hyssopi m i s. cinamomi electi ʒ i s. bulliāt singula in aqua iustæ quātitatis, quoad tertia pars absumpta fuerit. dein excolētur. & saccharo sufficienti adhibito, adiiciātur syrupi de ca.



amintha, de hyssopo, de marrubio añ 3 i s.  
 misce, fiat potio: qua hausta, purgatoriū su-  
 matur medicamentū aliquod nimirū hiera-  
 picra, eclegma diaphœnicôn, indi, catapo-  
 tia de agarico, de benedicta, aut similia. à  
 purgatione exerceā mulieres, potissimum  
 obambulationibus, & inferiorū frictionib⁹.  
 Fomentationes denique, inunctiones, & bal-  
 nea ex chamæmelo, artemisia tenuifolia, mē-  
 tastro, & aliis quę in decocto paulō antè me-  
 morata sunt, oleis de lilio, rutaceo, & simili-  
 bus parata, adhibenda. Post hæc medicamē-  
 ta, quæ suppressos mēses euocāt, protinus, ut  
 scilicet adhuc calido & soluto corpori occur-  
 rentia vires suas ostēdant, exhibenda. In quę  
 vsum conferunt myrrha, castoriū, baccæ lau-  
 ri, rubea tinctorum, piper, salvia, ruta, sabi-  
 na, casia, & alia quę suprà cōmemorata sunt.  
 vnicē autem hoc cōfert, quod R<sup>x</sup> castorii 3 i. *Mēses cō-*  
 mēstari in puluerē redacti 3 s. vini antiq aut *nocātia.*  
 mulsę 3 iii. misce, & à balneo calidum propi-  
 nato. Benefacit etiam decoctum pulegii, arte-  
 misię, rute, cumini, dauci, saluie, anethi, am-  
 meos, fœniculi, inulæ, & similibus. calamin-  
 thæ etiam in puluerē redactæ 3 ii. aut sabinæ  
 3 i. in vino aut mulsā pota. mirificē conducūt  
 pastilli de myrrha. Absinthites autem vinum  
 per totius curationis decursum bibendū. *Pes.*  
 sis etiam in vterū demissis, necessitate sic exi-  
 gente, vtendū: ex quorū numero hic est, qui



R<sup>x</sup> triphere magnę citra opiū 3 i. farinae erui,  
 nigellæ, rubeæ tinctorum, artemisię, pulgii  
 añ. 3 i s. succi rutę 3 ii. misce, fiat pessus, qui  
 cū lana vel cespito supponatur. Et hic, qui R<sup>x</sup>  
 myrrhæ, bdellii, styracis añ 3 i. calaminthæ,  
 abrotani, absinthii añ 3 i s. radicum acori, ru-  
 beæ tinctorum añ 3 i. feminis nigellæ, rutæ  
 aridæ, baccharum lauri añ 3 ii. sabinæ 3 i. a-  
 storei 3 s. Redigantur singula in pulcrē, &  
 cum melle, aut triphera, aut mithridati anti-  
 doto quod satis est, formētur pessi. Metre-  
 chytis etiam vtendū. in quem vsum vtero in-  
 fundimus olea calida: irinū nimirū, liliaceū,  
 Suffitus. laurinū, & similia. Suffitis etiam ex styrace,  
 galbano, thure, bdellio, radice aristolochiæ,  
 artemisia, nigella, gariophyllis, cinamomo,  
 Fomēta. & similibus paratis vtendum erit. Fouendus  
 quoque vterus odoratis fomētis, maiorana,  
 serpillio, calamintha, chamæmelo, pulegio,  
 artemisia, radice iridis, & similibus in olla  
 decoctis: quā operculo perforato operire o-  
 portet, arūdinēq; aut aliū canalē foraminī  
 insertum vndique circumlinere, vt deinde se-  
 Infessus. des mulier excepto canali foueatur. Prode-  
 rit etiam, vt mulier huic decocto vsq; ad vm-  
 bilicū infideat, & īde pessos paulò ante me-  
 Calidio- moratos sibi admoueat. Caterū calidiores  
 ris tempe & plurimū exiccate mulieres curantur, si q̄  
 raturę cu maximē humectetur vberiore humidiorēq;  
 ratio. cibo ac potu: quales sunt qui ē carnib<sup>9</sup> agni,



hœdi, è piscibus teneras carnes habentibus, auibus altilibus, & similibus parantur. vino vtendum cādido, non admodum antiquo & diluto: balneis item dulcium aquarū. & vt in pauca rem contraham, victus ratione ea vtendum, quæ hecticis adhibetur. Reliquæ curationes ex suis petantur capitibus.

## DE REDVNDANTIBVS MENSIBVS. CAP. XLVI.

Redūdare mēses in mulieribus dicimus, quando vltra cōsuetum tempus purgationis magnā copiā effluerint. Tempus autē vnicuique purgationi statum & ordinatum nō est. multis enī ad duos trēsve dies, haud paucis vsque ad quintum profluit, aliis etiam ad septimum vsq; , rarō ad duodecimum purgatæ sunt. Fit ob fracta aut aperta vasa, vel magna, vel parua. Amplioribus vasis ruptis aut apertis, cōfertim sanguis profluit. minorib⁹ verò apertis, sensim, nec magnā copiā promanat. Ab erosione si accidit, tū non solum paulatim, verū etiam cum maximo dolore effluit. Porro quū immodicē promanāt menses, color fœdus consequitur, pedes molli tumore attollūtur, corporis robur prosternitur viciatur ciborū tum appetitus, tū concoctio: atque in totum omnia, quæ immoderatā sanguinis vacuationē siue ex hemorrhoidē, siue alio quopiā sanguinis fluore euenientem sequi consueverunt. In primis igitur artus &

Causæ.  
Signa.

Curatio



5. Aph.

Medica-  
menta  
mens  
constrin-  
gentia.

Pilulæ.

extrema corporis ab alis & inguinibus, vin-  
culis excipere oportet. cucurbitulas etiam le-  
ues magnas subter mammillas, iuxta Hippo-  
cratis sententiam, affigere conuenit. cibus &  
potionibus austeris & adstringentibus uten-  
dū. Aſis autem potius quàm elixis veſcatur  
ēgra: carnibus potiſſimum, quibus ſua pte na-  
tura deſiccandi facultas ineſt, vt auium mon-  
tanarū, & agreſtium animalium. motu & vi-  
no abſtinēdum, & pro eo adſtringēti potio-  
ne utendum. Medicamenta adſtringētia ſim-  
plicia in potu propinanda, hæc ſunt. balau-  
ſtium, hypociftis, acacia, coralli, lyciū, terra  
lemnia, galla, polygonum, ſymphytū vtrum-  
que hæmatites, calices glandium, plantago,  
oxyacātha, & ſimilia. Compoſita, ſyrupi ro-  
ſaceus, myrthinus, paſtilli de ſuccino, & terra  
lemnia. Itē hæc catapotia, quæ & terræ lem-  
niæ, boli armeniæ, thuris, maſticheſ, gallarū  
añ 3 ii. ſanguinis draconis, hæmatitis añ 3 i.  
cornu cerui vſti 3 i. hypociftidis, acaciæ, co-  
rallorum rub. añ 3 s. balauſtiorum, roſarum  
rub. añ 3 ii ſuccini 3 i. cum ſyrupo myrthino  
formētur catapotia, de quib⁹ 3 i aut 3 is. pro-  
pinabimus. Extrinſecū vnguēta, emplaſtra  
cerata, & epithemata adſtringētia, vtero ad-  
hibeantur: qualia multa ſuprà in capitib. de  
Dyſenteria, diarrhœa, & lienteria dicta ſunt.  
Infeſſus etiam ex decocto prædictorum me-  
dicamentorum parati conueniunt. item quæ



vtero iniiciuntur: in quem vsum plantaginis  
 succus mirificè confert. Succus item polygo-  
 ni, aut solani, aut hypocistidis, aut acaciæ, &  
 similes. pessi quoq; vtilis sunt, qualis est qui Pessulus.  
 & thuris, balaustrorum, gallarum añ 3 i. gū-  
 mi arabici, acaciæ, succini cornu cerui vsti  
 añ 3 ii. boli armenii 3 ii. singula redigantur in  
 pollinē tenuissimū, & lana rosaceo intincta  
 excepta, in mulieris pudendum immittantur.  
 Porro fluores alii vteri diuturni, rheumatif- **Curatio**  
 mos vocāt Græci, qui interdum rubri, inter- **floris**  
 dum albi, interdū pallidi, sæpe etiam aquosi **mulie-**  
 sunt, eodem ferè modo curantur: nisi quod in **bris.**  
 rubro fluore primum, si ætas & alia permise- **Rubri.**  
 rint, ad sanguinis missionem vertimur. Nā &  
 multa sequeretur incōmoda, si cōfestim san-  
 guinis impetum localibus remediis reprime-  
 re conaremur: nempe hydrops, neruorū aut  
 oris vētriculi, vel capitis pathemata. Ablatio  
 nem verò sicut in iis qui sanguinem excreāt,  
 partiri oportet, vt paulatim prolixiori tēpo-  
 re auersio fiat. Secunda verò erit in cubito ve-  
 na: dein iis quæ antea cōmemorauimus, vtē-  
 dum. Fluore autem albo infestāte in princi- **Albi.**  
 pio quidem resistendum non est, vt aliena è  
 corpore excernantur. neque præter rationem  
 erit, si quod pituitam purgat medicamētum  
 adhibeas. toti etiā corpori auxilia quæ citra  
 manifestum calorem exiccant, admouenda,  
 vt frictiones, vntionésq; ex melle. superio-



rū verò præcipuè partiū exercitationes, vt vo-  
cis, cōueniunt. medicamēta quoq; crassos &  
pituitosos humores extenuātia, vrināque du-  
centia, vt asarum, fœniculum, apium, & simi-  
lia danda. vtero autē moderatē adstringentia  
applicanda, abstergentibus etiā vtendum, ne  
scilicet ab humore trāseunte vlcus inferatur.  
Aqua igitur calida iugiter sanies abluenda;  
dein rosaceum, aut myrthinū, aut melinum  
oleū, & alia quæ prædicta sunt, admouenda.

## DE VTERI SUFFOCATIONE

## CAP. XLVII.

- Suffoca-** Strangulatus seu suffocatio vteri, ad supe-  
**catio.** riora eiusdem recursus est. Græcis *ὕστερική*  
*πνίξις* dicitur. superiores ac principatum obti-  
**Causæ.** nentes partes in passionis consensum perdu-  
cit, nempe carotidas, cor, cerebrique mēbra-  
nas. Fit ob retenta menstrua, cohibitum se-  
men, vt copiosè Galenus lib. 6. de patiētibus  
locis cap. 5. ostendit. Hæc enim flatuosam  
quandā refrigerationem, vt inquit Aëtius, in  
vtero excitant, quæ subinde cordi & cerebro  
communicatur. contingit etiam refrigerato  
vtero, quo tempore menstruæ purgationes  
effluunt, vel ob difficilem quempiam obor-  
tum, vel vbi quis sanguinis eruptionē ab vte-  
ro repētē sistere properauerit. Accidit patiē-  
**Signa.** tibus, cum accessio propinqua est, torpor  
mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei  
pallor, aspectus mœstus. Quum verò iam



instat strangulatus, inclinatio ad somnum, desipientia, detentio instrumētorum sensus, vox obmutescit, crurāque contrahuntur, pulsusque parui & debiles fiunt, sæpe & penitus abolentur. Cū remittit, mox illæ rubescere incipiunt, oculi attolli & aperiri. Humiditas etiam quedā à locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac intestina immurmurant, ipsēque vterus paulatim laxatur, atque sic ipsis mens, sensus, & motus redit. Cæterum passio iuxta circuitum mouetur, sicuti comitiales: idque vtero, vt diximus, repleto, aut seminali, aut alia quæ in eo putrefit materia. Multæ rursus se à morbo recolligunt, nonnullæ vero in ipsis accessionibus subito pereunt. id quod accidit, vbi pulsus crebriores & inordinati fiunt, ac subinde in totum abolētur. Postremò frigidus & modicus humor superficiē irrorat. porrò malū hoc hyeme & autumno magis infestat iuniores, ad venerem procliuēs, steriles, præsertim si vi medicamentorum tales factæ fuerint. In accessionibus igitur extrema deligare oportet, cūmq; deligationibus crura tota, totūq; corpus perfricare & veluti animo deficientes recuperare. Naribus foetida admouēda: verbi gratiā, funiculus luccernæ extinctus, castoriū, galbanū, pix liquida, lanę lacinięq; cōbustæ, & alia eiusmodi. cucurbitulas quoq; inguinibus, & imo ventri cū multa flamma & leues affigere conue-

Curatio.  
Quæ in  
accessio-  
ne faciē-  
de.



nit. Quòd si accessio prológetur, etiam quæ  
 flatibus educēdis vtilia sunt, sedī supponere  
 oportet. Hæc autē ex cap. de coli doloribus  
 petenda veniunt. In vterum vnguēta & olea  
 odoratissima infundere oportet, vt est ama-  
 ricinū, & quod spicaceū hodie appellatur, iri-  
 num & similia. Hęc etiā obstetrix digitis ca-  
 piēs, vsq; ad os vteri immittat, leniter ac mul-  
 tum defricans, vt eo irritamento crassus hu-  
 mor excernatur. Præter hæc omnia mulier  
 maximis vocibus excitetur, propriūmq; no-  
 men inclametur. Hoc tēpore ea etiā sunt ad-  
 mouēda, quæ sternutationes excitant: vt ca-  
 storiū, struthiū (condisi barbari vocāt) & pi-  
 per. Neq; inutile erit, si infesiones ex deco-  
 cto baccarum foliotūmq; lauri, pulegii, cala-  
 minthę, artemisię, marrubii, sabinaę, althęę,  
 chamęmeli, serpilli, iridis, aristolochię, & fœ-  
 nigreci parētur. Infesionū tamē tēpore cere-  
 bri curā non omitemus, sed rosaceo & aceto

Quepost caput irrigabimus. vbi accessio quieuerit, ad  
 accessio - vomitū cogātur. omnes enim vomitus leuat,  
 nem agē- sed eas præsertim quæ à cibo infestantur. In  
 da. tertio die lumbis & iliis cucurbitulæ cū scari-  
 ficatiōe applicētur. A septimo die purgatio-  
 ne vtendū ex hiera de colocynthide, aut cata-  
 potiis de agarico. Mox ad castorii potionē  
 veniemus, quod iugiter potum ab hoc malo  
 protinus liberat. dādum autem singulis die-  
 bus ad drachmæ pōdus, interdum cū mulsā,



interdū cum artemisię decocto, nunc cum vi  
no tenui. hoc etiam tempore infusionsibus &  
pessis mollientibus ex adipe anserino, styra  
ce, mastiche, amoniaco, & similibus cōfectis  
viti licebit. vterus etiam iis quæ calefaciendi,  
flatūque educendi vim obtinent, sufficien  
dus. vtēdum autem hoc potissimum, qui R<sup>x</sup> Suffitus.  
pastillorum gallię & aliptæ moschatae añ 3 i  
s. styracis 3 iii. gariophyllorum, maceris añ 3  
i. ligni aloës 3 ii. cinamomi electi, foliorum  
lauri añ 3 ii. ladani 3 ii s. reductis singulis in  
pollinem subtilissimum cum stacte, quā sto  
racem liquidum appellāt, fiunt trochisci. Ci  
bo interea & potu paucis admodum conten  
ta sit mulier, totaque victus ratio exiccatoria  
sit. atque hæc ad accessiones proficiunt. In  
totius verò corporis curatione, potissimū si  
malum diuturnum fuerit, plerunq; à sangui  
nis missione, præcipuè si mēstruæ purgatio  
nes detineantur, auspicandū. deinde ad pur  
gationem ex hiera picra transeundum. per  
acta euacuatione cucurbitulę leues quidem,  
sed cum multa flamma affigendę. Nec inuti  
liter sinapismi, & dropacismi, ex euphorbio  
pyrethro, pipere, & sinapi confecti applican  
tur. Non parum etiam recta victus ratio opi  
tulabitur, nēpe deambulationes matutinæ,  
gestationesque vel in curru, vel naui, vel iu  
mento. A gestationis motu vociferatio, & lē  
ctio clara, modulata, concinna utilis est: vn-

victus.

Totius  
corporis  
curatio.

Victus.



Etio præterea, frictio, & exercitatio ex congruis interuallis repetita, eisdem conueniet. Balneum aquæ dulcis rariùs, & non nisi fordidum abstergendarum gratiâ adhibendum. Balneis verò naturalib. vti, optimum est.

## DE VTERI PROVIDENTIA.

## CAP. XLVIII.

**Procidē-  
tia.**

Procidere vterum dicimus, quando ita e-  
uertitur, vt exteriùs emineat. neq; enim vte-  
rus, vt imperiti suspiciātur, à suis solutus pro-  
paginibus totus decumbit. nā si ita procide-  
ret, restaurari minime posset. Sūt verò procide-  
ndi vteri causæ multæ. Ab alto enim dela-

**Causæ.**

p̄sa mulier, si in coxas deciderit, membran̄is  
quæ vterum continent & vicin̄is partib. con-  
nectunt, ruptis, hoc malo corripitur. accidit  
etiā vt procidat vterus in difficili partu, pro-  
pter secundæ extractionem, quam vterus illi  
adhærescens sequitur. item ob inertem & im-  
peritam fœtus extractionem, vel istum, vel  
immensi ponderis eleuationē, vel animi af-  
fectus, puta filiorum amissionem nūciatam,  
aut hostiū accessum, vel ob periculosam na-  
uigationem, aut eiusmodi aliquam causam,  
omni eo quod concretum est soluto, vtero  
etiā simul collapsō. Aut ob resolutionē, aut  
partium (membranarum nim̄ irum & muscu-  
lorum) imbecillitatem, vt in senescētibus ma-  
xime accidit. Procidit sæpe ob humoris plu-  
rimi ac tenacis defluxū, partūmq; frequen-



tiā laxatis ac solutis appēdicib⁹. procidit ve-  
rō potissimum secundū os eius, & quod pro-  
cidit ouo struthiocameli simile est, maioris  
tātū & minoris ratione differens. Signa satis  
manifesta sunt, & causarū diuersitas facillē de  
ægotātis aut assidentū sermonibus cogno-  
scetur. Quū itaq; recēs adhuc malum est, stu-  
dere oportet, vt vterus inseratur, ac in suū re-  
ponatur locum. In principio siquidē facile  
repositioni paret, & rectē locat⁹ perseuerat,  
prēcipuē si ætas conuenerit. nā in prouectio-  
ribus vterus quidē reponitur, sed rursus qua-  
libet leui causa relabitur. Cōuenit igitur, du-  
ris stercorebus primū euacuatis, urināq; in  
vesica collecta excreta, quo vter⁹ vndiquaq;  
sit liber, & neq; ab intestino recto neq; à ve-  
sica cōprimatur, ægrā supinā figurare, vt co-  
xas habeat sublimiores, poplites flexos, cru-  
ribus inuicē dilatatis ac diuaticatis. deinde  
prolapsam vteri partē oleo tepido, vel buty-  
ro, vel malua, althææ, fœnigræci, seminis li-  
ni, aut similiū decocto fouētes, conuolutam  
lanā preparabimus, figura & crassitudine si-  
nui muliebri proportionalem, tenui & puro  
linteo exterius circundatam: ac deinceps in  
succum acaciæ, vel hypocistidis vino dilutis  
mersam vtero inferemus, & citra violentiam  
ac sensim totū quod procidit sursum torquebi-  
mus, quoad integer in sinu tumor excitetur,  
& vter⁹ in propriū reponatur locū. Extrinse-

Signa.

Curatio.



cùs autem pubem spongia in posca expressa operiemus. mulier iacebit extēsis adaptatissimè inuicem cruribus, vt alterum alteri incubat. tutius tamen erit, pedes simul vinciri, fasciā vsque ad genua deducendo. Deinde cucurbitę cum flamma copiosiore, vmbilico & vtrisque ilibus affigendæ. Naribus odorata iugiter admouenda. Tertio die lana adhuc in sinu persistēte, mulier in vino nigro austero modicè tepido, aut in decocto myrthi, rubi, malicorii, & similium insidebit. his peractis sursus supina, accliuib<sup>9</sup> coxis, locabitur: sublataq; è sinu priori lana, altera in vicem prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasinata & emplastra à foris imo ventri imponantur ex palmulis, polētia, malicorio, lenticula, & similibus. Cerata etiā ex mastiche, ligno aloës, ladano, thure, iūco odorato, acoro, nuce moschata, gummi arabico, tragacantha, & eiusmodi medicamētis parata cōueniūt. singulis verò tribus diebus hæc vsque ad perfectam curationem permuentur. Toto etiam curationis tēpore mulier motum, & ea quæ sternutamenta excitant, euitet. vt autē naribus odoratissima sunt adhibenda, sic vterus ab infernis fœtidis rebus suffiendus est. Cibi boni succi, & vina odorata offerenda, venter quoque leniendus. ne si cū difficultate sit egerēdū, simul vterus procidat. obseruandum tamen, ne nimium ven-

Victus.



ter subducatur, exoluitur enim, relaxanturq;  
propinque partes, & vteri loca procidunt. Por-  
rò si pars prolapsa diurnitate tēporis pro-  
pter incuriā putruerit, ob assiduāmq; vrinæ  
irrigationē & sordē inhærentem exulcerata  
fuerit, amputandū aut inurēdū quod inutile  
fuerit, nullius metu periculi, erit. cōstat enim  
totū vterū putrefactum quandōq; amputatū  
& ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

## DE MOLA.

## CAP. LIX.

Myle, hoc est mola, induratus est tumor,  
interim in vuluæ ostiolo, interim in toto vte μύλη  
ro ipso prominēs, ad tactum ferē lapidosus.  
vel vt Galenus lib. 14. Ther. meth. definit, est  
caro informis. nomē à motus difficultate &  
grauitate assumpsit, quam sentiūt quæ malo  
hoc afficiuntur mulieres. Fit à seminis mulie Causa.  
bris, & plurimi sanguinis menstrui in vtero  
retentione & affluxu, quem calor immodi-  
cus cogit, ac in carnis forma transmutat. Cō- Signa.  
sequitur hoc malum tumor durus cum hypo-  
chondriorum contractione, corporis gracili-  
tate, decoloratione, appetentiæ deiectione,  
mensiumque suppressione. item mammillæ  
intumescunt, vt cōceptionis quibusdam per-  
initia suspicio suboriatur. Tēporis verò pro-  
gressu discernuntur. molam enim pūctionis  
sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea  
motus vllus, sicut in cōceptione, percipitur.  
Nonnullæ verò præbent aquæ inter cutem



- suspicionem: à qua tamē distinguitur, quòd tumor durus sit, nec sicut in hydropē manus aut digitorum impulsui cedat, aut tympani modo sonum edat. Nonnunquam tamē tempore procedēte iecur refrigeratur, & hydrops superuenit.
- Victus.** Primū omniū alimenta boni succi offerenda, ac vini potioni vtēdum moderata. mulier motu non vtatur vehemēti, is enim fluxionem commouet: sed gestationibus & deambulationibus, pedes etiā decubēdo elatiores habeat. Quòd verò ad curā dirationē attinet, principio in plenitudine vena cubiti incidenda, ac subinde purgatione per cataportia foetida vtendū. corpore vacuato cataplasmata, fomenta, infusions, pessi, vnguēta & cerata quę relaxandi vires habēt, adhibēda: qualia sunt quę ex althæa, malua, chamæmelo, meliloto, fœnogræco, semine lini, & similibus parantur. conueniet in hūc vsum vnguentum dialthææ, aut emplastrum de meliloto, diachylōn simplex admouere: vel hoc quod R̄. oleorum amygd. dulcium 3 iiii. liliacei 3 ii s. pinguedinis anseris, gallinæ añ 3 i s. mucositatis feminis lini, fœnigræci añ 3 i. amoniaci, bdellii añ 3 ii. radicis althææ, seminum nigellæ, dauci añ 3 ii. ceræ quod satis est. fiat vnguentum, gummi dissolutis prius in vino. Pessi quoque subiiciendi ex butyro, adipe porcino, medulla ceruina, passulis, caricis pinguibus, seminibus lini &
- Curatio.**
- Vnguentum.**
- Pessi.**



scenigræci confecti. Post hæc quæ menses euo-  
care possunt, propinanda medicamenta. in  
quem usum præter ea quæ in cap. de Suppres-  
sis mensibus commemorauimus, conuenit **coñfectio.**  
hæc confectio, quæ R̄ specierum diacina-  
mi, diagalangæ, diacumini añ 3 s. specierum  
diambæ ð i. dialaccæ ð s. cinamomi electi,  
hyperici, calami odorati, asari, radicis acori,  
seminis anisi añ ð i. seminis rutæ, zingiberis,  
artemisiæ, marrubii, dictamni, saluiæ añ ð s.  
sacchari § vi. dissoluti in succis artemisiæ &  
hyperici, fiat confectio in morsulis. de qua  
quoridie dentur 3 ii. aut 3 iii. Proderit & hunc  
pessum subiicere, qui R̄ radicis asari, acori,  
rubeæ tinctorum añ 3 ii. seminum rutæ, ni- **Pessus.**  
gellæ añ 3 s. maioranæ, nucis myristicæ, ga-  
riophyllorum, baccarum lauri añ 3 irfabinæ  
ð i. castorei, euphorbii, añ ð s. Redigantur  
singula in puluerem, & cū terebinthina resi-  
na formentur pessi. Mirificè etiam cōfert vti  
balneis naturalibus, potissimùm si malum  
diuturnum fuerit.

## DE INFLAMMATIONE VTERI.

## CAP. L.

Vterus plurimis de causis inflammatur,  
nempe ex ictu, mensium retentione, abor- **Causæ.**  
tu, vlceratione, concubitu metas rationis  
excedente, sellæ nimis duræ infessione, lon-  
gissima intentissimâque deambulatione, sæ-  
pe & transpiratione ob frigus prohibita.



## Signa.

Hanc monstrant vteri, pubis & lumborū dolores, febris acuta, dolor capitis & radici oculorum, brachialis, digitorum & colli cōuulsio, & in aduersum declinatio, stomachi ex consortio dolor, oris vuluæ conuiuentia, pulsus exigui crebrique. Si lāguida fuerit inflammatio, haud valido vteri dolore afficiuntur. Sin vehemens, & ipse totus pulsatilem dolorem percipit. Vniuerso sanē inflammatione laborāte, vndiquaq; parte aut eius inflammatione obsessa, in ea dolor magis intēditur. Nā si posteriora ipsius solūm laborēt inflammatione, dolor lūbos magis vexabit: durūmq; sterqus detinetur, quoniam intestinum rectū comprimitur. Si priora, dolor pubem occupat, & vrine stillicidium, aut difficultas, vesicā pressā, excitatur. Lateribus autem inflammatione correptis, inguina tenduntur, & crura grauantur. Posteriore verò vteri parte inflammata, in vmbilico dolor potissimum cū

Curatio.  
venæ sectione.

tumore infestat. Quum autem os vteri inflammatione affigit, in abdomine dolor est, digitōq; immisso os occurrit durum rigidūque. In principio itaque curationem aggressi, si neque ætas, neque habitus corporis, neque anni tempus obstitit, neque inflammatio post abortum, aut immensam sanguinis euacuationem superuenerit, venam poplitis secabimus ex Galeni decreto, qui in lib. de curandi ratione per venæ sectionem inflammationem



nē vteri à venis in crure sectis iuuari scribit.  
 A Egram in domicilio obscuro, & moderatè  
 tepido collocabimus, quietem imperantes,  
 ac crura eius ab omni motione prohibētes.  
 deinde artus & extrema perfricabimus. In  
 cibo, qui quantitate modicus sit, vtatur agra  
 ptisanæ cremore, & ouis sorbilibus. Potus sit  
 decoctū cinamomi aut hordei. Extrinsecus  
 lana ex oxyrhodino madefacta, pubi & lum  
 bis imponatur. Palmulæ etiam, aut mala co  
 ronea, in vino decocta, & rosaceo admixta,  
 applicanda. cataplasmata quoque ex farina  
 seminis fœnigræci, lini, meliloto, plâtagine,  
 lentibus polygoni, portulacæ, sedo, & simi  
 libus cōfecta adhibenda. idque potissimum  
 si erysipelatis naturam inflammatio sortita  
 sit. Lana cū rosaceo aut melino oleo, aut suc  
 co portulacæ aut sedi madefacta, in signum  
 vteri immittenda. At vbi inflammatio decli  
 nare cœperit, ad ea veniemus, quæ quadan  
 tenus remittendi discutiendique vires habe  
 ant. A Egrotam igitur in fœnigræci, althææ,  
 se. lini, maluæ, interdū artemisiæ, marrubii,  
 & saluiæ decocto vsque ad lumbos sedere iu  
 bebimus. Pubi etiam & lumbis hordeaceam  
 farinam cum fœnogræco & semine lini in  
 mulsâ elixatam, aut caricarum decoctum il  
 linemus. Pessi quoque subiiciendi ex bu  
 tyro, medulla ceruina, adipe anserino, galli  
 næ, & similibus confecti. Reliqua denique,

Pessi.



quibus emolliendi facultas inest, adhibenda:  
de quibus iam sæpe dictum est.

DE STERILITATE REMO-  
VENDA. CAP. LI.

Causæ.

5. Aph.  
62.

Sterilitas aut viri, aut mulieris ratione  
accidit. A viro est, cum semen eius vel ferui-  
dum, & veluti torrefactum: vel frigidum, te-  
nue, aquosum, languidum, quale decrepito-  
rum est: vel crassius quàm oportet emittitur  
vel quòd viri semispadones sint, penèque  
breuissimum habeant, vt in vuluæ recessum  
semen iaculari nequeant. Quod etiam inter-  
dum nimia obœsitate contingit. obœsi enim  
tam ventricosi euadunt, vt semen ad profun-  
diores vteri partes iaculari non possint. Mu-  
lier verò sua ipsius ratione non concipit, q̃  
vterum habeat vel calidum & igneum, vel  
frigidum & humidū, vel squalentem & ari-  
dum. Nam vt Hipp. ait, Quæcunq; frigidos  
& densos vteros habent, non concipiunt. &  
quæcunq; præhumidos obtinēt vteros, nō  
„ concipiunt: extinguitur enim in eis genitu-  
„ ra. Et quæcunq; siccos magis & torrefactos  
„ nam ex defectu alimenti corrumpitur semē.  
„ Cæterum crassæ admodum & obœsæ, haud  
concupiunt, quod item etiam Hippoc. iis te-  
statur verbis, Quæcunq; præter naturam  
5. Aph. 46. non concipiunt vtero, iis omentum os vteri  
„ comprimit, & priusquam extenuentur, non  
„ concipiunt. Graciles denique & macilentæ



nō concipiunt: aut si concipiūt, statim abortiūt, eodē Hippocrate teste, qui sic scriptum reliquit, Quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerūt, abortiunt priusquam crassescant. Quædam etiam non concipiūt, eo quod vterus earum debilis est, vel angustus, vel brevis, aut quod vasa eius obstructa clausaque sint, aut cicatricis superuentu excacata, aut quod vteri cervix in obliquū ductatur, aut quod os eius vel nimis angustum, vel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt: calidius siquidem temperamentum viri facilè apprehenditur ex pilorum copia, potissimum verò nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circūstant, suprâ quidem vsque ad media femora. Petulca etiam est hæc temperatura, & ad libidinem etiam prona: statim verò satiatur. Frigidius temperamentum monstrât partes circūpositæ testibus glabræ. Neque etiam hoc temperamento præditi ad libidinem proni sunt. Vteri verò caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, & cum dolore deferuntur, vt genitalia interdum mulieris exulcerentur. sed & quæ educūtur, nigriora sunt. Hæc etiam temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorē vteri temperaturā mōstrat menstruorū suppressio, stupor in pube, lumbis & cruribus.



bus abortus. veneris etiam vsum aspernātur,  
 & os vteri contractum habent, hoc tempera-  
 mento præditæ. Humiditatis verò vitio fœ-  
 cunditatem frustrari indicat, si in coitu hu-  
 more admodū perfunduntur, & si iis fuerint  
 tenuia copiosaque menstrua. Siccitas vteri  
 contrariis planè deprehenditur notis. Cō-  
 munitur quidem ambobus congruit, & viro  
 & mulieri, vniuersum corpus cōseruare pro-  
 bē temperatum, laboris, cibi, balnei, & reli-  
 quorum omnium mediocritate. Viri igitur,  
 qui ob deprauatam viuendi rationem semen  
 corrūpunt, ad magis compositum salubrio-  
 rēque victum conuersi, geniturę fœcundi-  
 tatem acquirunt. Mulier autem neque ingen-  
 ti labore defatigetur, neq; prorsus ociosa sit.  
 hoc enim superuacuis excrementis molē cor-  
 poris replet: illud sanguinem deficcāt, & pur-  
 gationes absūmit. Potu & cibo concoctu fa-  
 cilibus vtatur, & quos ventriculus probē su-  
 peret, atque conficiat. Illud verò potissimū  
 circa rectam viuendi rationem est obseruan-  
 dum, vt nec vir, nec mulier obcēsi reddantur.  
 Qui enim tales fuerint, liberis procreandis  
 inepti sunt, eo q̄ genitalib<sup>9</sup> mutuò se cōtin-  
 gere nō possunt, & paucum semen emittāt.  
 Porro conuenit etiā, vt iis qui liberis pro-  
 creandis operam dare cupiunt, quædam cō-  
 sueta, esuq; aut potu grata ante cibū offeran-  
 tur, quæ veneri excitadæ & semini generan-

Curatio  
 commu-  
 nis.



do aptissima sint: qualia existunt quæ calefa-  
 ciunt, & moderatè inflant. vinum itaque in  
 hunc vsum modicè sumptum, aquæ præfer-  
 tur. Sine enī Cerere & Baccho (vt ille ait) fri-  
 get venus. Ex oleribus vtendum cruce, hor-  
 minio, erisyno, & aliis quæ in cap. de iis qui  
 re venerea vti non possunt, commemoravi-  
 mus. Ruta, calamintha & mentha omnino  
 vitanda. calamintha enim & mētha etsi plu-  
 rimum semen, imbecillum tamen & langui-  
 dum gignunt, ruta verò prorsus corrumpit.  
 Cæterum si mulier vitio quodam humorum  
 non cōcipiat, eas purgantem medicamento va-  
 cuare, & proba victus ratione emendare ex-  
 pedit. Priuatim verò mulieribus conueniet, **Curatio**  
 curam eorum quæ sunt circa vterum, quàm **mulieris.**  
 fieri potest maximam habere, & vt iis men-  
 ses sine omni impedimento promanent.  
 Quum igitur propinqua est per menses pur-  
 gatio, cibi potusque quantū fieri potest, me-  
 diocritatem curæ habebunt, & quippiam ex  
 iis quæ purgationē irritare ac stimulare pos-  
 sunt, assument: quorum copiam ex cap. 45.  
 huius Libri petes. A purgatione menstrua,  
 optimum ac opportunissimum concipiendi  
 tempus est. Quoniā (vt Hippocrates inquit) **6. Epid.**  
 post menstruam purgationem iam dextra, **Par. 7.**  
 iam verò sinistra vteri pars aperta est. Porro **Aph. 24.**  
 vteri intemperiem frigidā per fomenta, sus- **Curatio**  
 citus, & alia quibus calefaciēdi vis inest, cor. **frigidæ**



intempe rigere oportet, vt sunt quæ ex artemisia, pu-  
rici vteri. legio, salvia, ruta, aniso, cumino, acoro, & si-  
milibus parantur. castorium etiã bibere pro-

Curatio derit, & alia adhibere quæ in cap. de Men-  
calidio - sibus suppressis dicta sunt. Calidiorem verò  
ris intem vteri intemperiem per ea quæ refrigerant &  
perici. humectant emendabimus: cuiusmodi sunt

Humi-  
dioris.

oleræ quidem, lactuca, malua, cucurbita, por-  
tulaca, atriplex, aliique cibi similes. vinum  
album & dilutum, somnus, & dulcium aqua-  
rum balnea. Lumbis etiã ac pubi refrige-  
rantia adhibenda sunt: vt solani succus rosa-  
ceo admixtus, qui etiã lana exceptus in v-  
teri sinum vtiliter imponetur. Quæ ob vteri  
humiditatem non concipiunt, aridioribus  
alimentis vti oportet, plurimum exerceri, ac  
in superioribus perfricari, & euacuationis  
auersionisq; gratiã interdum pransas, inter-  
dũ ieiunas euomere, & cibi parsimonia de-  
ficari, carnēsque potius tostas vigentium e-  
tate animalium comedere, vinumque potēs  
meraciũsq; sed parcius bibere. Arida præter-  
eà fomenta crebro adhibenda. Profuerit &  
vulvæ adstringentia apponere: qualia sunt,  
rosarum, foliorum rubi, gallarum, rhois ob-  
soniorum, myrthi, polygoni, malicorii, & si-  
milium decocta. Id autem nisi totum corpus  
antea purgatum sit, faciendum haud erit. Sic-  
ciore vteri contrariis curare oportet, bal-  
neis aquarum dulciũ, inunctione & alimen-

Siceio-  
ris.



ris humectantibus, vino diluto, non nimis  
 veteri. Quod si à crassioribus humoribus cō  
 cipere mulier impediatur, si quidē rodentes  
 fuerint, mulierem probè purgare couenit  
 hiera picra, aut sero lactis: & victu exquisi-  
 tiori, cibisque boni succi vtendum. Pituito-  
 sos verò humores laboribus plurimis, sudo-  
 ribus, vomitu, vel per inferna purgatiōe ab-  
 sumere oportet, aliāq; omnia quæ in cap. de  
 Suppressis mensibus commemorata sunt. Iā  
 verò flatus quoque vteri conceptionem im-  
 pediunt. quibus primò cibi parcitate mede-  
 bimur: dein iis quæ flatus discutiunt, vt est  
 euminum, ruta, anethum, apii semen, & simi-  
 lia, quæ sæpe iam commemorata sunt: eaque  
 partim potanda, partim extrinsecus adhibē-  
 da sunt. Clausum vterum aperiemus inie-  
 ctis clysteribus odoriferis, fomentisque &  
 infussionib⁹ ex fœnogræco, semine lini, mal-  
 ua, & id genus aliis. Postea ad validiora per-  
 gemus, vt artemisiā, calamintham, pule-  
 gium, & maioranam. Quibus os vteri nimiū  
 hiat, iis victus aridus, fomenta sicciora, me-  
 dicamenta adstringentia, qualia in curatio-  
 ne humidioris intemperiei dicta sunt, con-  
 ueniunt. Peruersiones vteri mollientibus fo-  
 mentis dirigemus: id enim fomenta maxi-  
 mē possunt. Sed & mollientes pessuli vtiliter  
 supponētur. Castorium etiam ē posca bibi-  
 tum, vtero auerso conferre solet. Quæ hic

Curatio  
humorū.Curatio  
flatuum.Curatio  
clausi vte-  
ri.Curatio  
aperti v-  
teri.Curatio  
peruer-  
sionis.



desideratur, ex aliis petendum capitibus erit. nos enim hinc capita tantum rerum perstringere volumus.

## DE DIFFICILI PARTU.

## CAP. LII.

Causæ.

Difficilis partus, aut vicio parientis, aut foetus, aut secundarum, aut extrinsecus aduenientium accidit. Parturiētis quidem, si crassa obcæsaque sit, aut animo pusillo & dolorum inexperta, aut vterus totus exiguus, aut inflammationem vteri, aut alterius partis habeat, aut alio quouis morbo laboret: aut naturaliter imbecillis sit, vt foetum propellere nequeat: aut ante tempus pariat. Itē si os cervicis vteri obliquum fuerit, aut eidē caro aliqua ob vlcus quod præcessit adnata sit. At foetus vicio, si vel inusitatae magnitudinis existat, vel exiguus, & modicę grauitatis, vel magni capitis, vel monstrosus: verbi causa, biceps: vel mortuus, qui nihil opis parturienti præster, aut intumescat: vel viuus quidē, sed imbecillis, vt forās non possit progredi. vel si gemini vel plures fuerint, & repēte omnes simul colo vteri impingantur. vel si figuram naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura foetus prodeuntis est, prima quidem in caput, manibus super femoribus porrectis & extensis, & caput in neutrā partem declinās, sed rectā ad os vteri dirigēs. proxima huic, vbi in pedes manibus super utroq;

Natura-  
lis situs  
foetus  
pdeūtis.



femore extensis recta deferitur. Aliæ omnes præter has duas, à natura abhorrent. ut si caput in dextrâ aut sinistram vteri partem inclinat: vel si altera, aut vtraque manus exeritur, crurâque interius à se inuicem diducuntur: aut si foetus altero pede prodit, altero interius retento: aut si duplicatus alicui vteri parti innititur. Ob secundas, partes redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus sit propter tenuitatem abrumpatur. humore siquidem qui in utero collectus fuit, vacuato, infans præ siccitate ægrè elabitur. Ab externis etiâ causis difficultas oritur parienti. aut frigore, quod uterum desat, & meatus angustiores reddit: aut calore immodico, qui vires dissolvit. Cause externæ ex parietis & Signa. assistentium sermonibus cognoscuntur. Debilitas quoque parientis, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitatis cognitionem veniemus. Foetus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur. qui si mortuus fuerit, à motu prorsus cessat, ventris frigiditas adest, atque dolor iuxta umbilicum grauis, spiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus. Magnitudo foetus ex parentum corporis constitutione, ac ventris parientis mole coniicitur. Crassities secundæ inde colligi potest, quod prædictorum signorum nullum adsit, & parturiens robusta, facilisque foetus motus



Curatio fit. Ceterū obcesam mulierē in lectulo pronā, hoc est in caput propendentē, & vultu in terrā deiecto figurare oportet, flectentē inclinātēque genua ad femora, quō vter⁹ ad abdomē tendēs, ē directo oris sit. Digitis verō pinguedinib⁹, verbi grāiā butyro, oleo, axūgia anatis, gallinē, & similiū delinire os oportet, & sensim dilatare. Timidā verō hortari conuenit, in expertem dolorū partus admonere expedit, vt validissimē spiritū cōprimat ac cōtineat, & ad ilia validiore conatu protrudat. Si autē ex adstrictione, fœtūsq; veluti coarctatione pariendi oriatur difficultas, laxatione opitulandū, infundēdo largiter oleū dulce & calidū, item decoctū fœnigræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiā oua, q̃ leniēdi facultate prædita sint. Deinde & pubē cū abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxāte medicamento fouere oportet. Proderit etiā infessionibus ex cōmemoratis rebus paratis vti. Insuper laxationes balneis aquarū dulciū moliri oportet, nisi febris, aut alia quædam occasio impedierit: mouerēq; parientem gestatione in sella, in aëre medio-criter calido. Quod si inflammatio, aut aliū quispiam morbus vterum infestauerit, huic etiam ex propriis capitibus succurrēdum, ac prospiciendū erit. Imbecilla cum iis quę reficiunt, & robur addūt cibis & potibus refocillāda. Vbi infans præmagnus fuerit, ea adhi-



bēda quæ dilātare & laxare os vteri possunt.  
 Si verò præter naturam figuratus fuerit, natu-  
 ralem reddere figuram decet, partim pellen-  
 do, partim adducendo, partim flectēdo, par-  
 tim in rectum agēdo. Et si manum pedēve  
 præmiserit, non attrahere membro præhen-  
 sum oportet (magis enim firmatur ac impin-  
 gitur, vel luxatur, vel abrumpitur) sed digitis  
 humero vel coxæ fœt<sup>9</sup> innixis, rurſ<sup>9</sup> id quod  
 prominet, in cōuenientem locum diducere.  
 Porro si cum oris vteri compressione totius  
 infantis indecora fuerit figura, sursum prius  
 ipsum ab vteri ore sublimē detrudere confi-  
 liū est: deinde prehensum iterum ad os diri-  
 gere. Si autem gemini aut terni, plurēsve fue-  
 rint, ac ceruicem vteri obsederint, reliquos  
 propellere ad fundū vteri oportet, & eū qui  
 magis paratus videbitur, prius educere. ve-  
 rùm si nō procedat, q̄ infans mortuus sit, aut  
 caput nimis magnū, vel aliam ob causam, ad  
 fœtus extractionem seu sectionem, quā Gre-  
 ci Embryoelciam appellāt, veniēdū est. Eam <sup>ἐμβρυο-</sup>  
 autem copiosissimē Aëtius lib. 16. cap. 23. & <sup>ελκία.</sup>  
 Paulus lib. 6. cap. 74. tradunt. Porro si fœtus  
 tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior  
 quā vt rumpi possit, dissecanda erit. Qui-  
 bus autem humor in tunicis contentus, ante  
 congruū tempus effluerit, ita vt loca exa-  
 ruerint, ouorū albuminibus cum maluæ aut  
 fœnigræci decocto excolato, aut ptisanæ cre-



Pulvis o- more tepido perfundemus. Medicamentū  
 primus verò quod in vniuersū omnes difficulter pa-  
 ad diffi- rientes iuuat, est hoc, quod R<sup>x</sup> cinamomi ele-  
 cultatem Et 3 ii. myrrhę, casię lignę vocatę añ 3 i. suc-  
 partus. cini albi 3 i s. misce, fiat pulvis, de quo in po-  
 Secundæ tu vini odoriferi detur drachma vna. Porro  
 eductio. foetu excusso frequenter accidit, vt secūda in  
 vtero firmiter adherescat: quod vbi euenit, tū  
 interdum os vteri apertum, interdū clausum  
 reperitur, secūdināque ipsa nonnunquā vte-  
 ri fundo adhuc cōiuncta, nonnunquā seiun-  
 cta est. Si itaq; os vteri diductū fuerit, & secū-  
 da quę inibi relicta est, alicui parti vteri orbi-  
 cularim ac pilæ modo cōuoluta inhæserit, fa-  
 cilē educitur. manu siquidem sinistra calida,  
 pinguique illita in fundū demissa, secūdam  
 sublabētem extrahere oportet. Si autē fundo  
 vteri sit cōnexa, demissa simili modo manu  
 calida, & pingui inuncta apprehensam secun-  
 dam trahemus; non tamen in rectū, vt vterus  
 procidat: neque violēter admodū, sed leniter  
 ac placide primū in obliquū diducemus, huc  
 atque illuc circumagētes: deinde paulò vali-  
 dius attrahemus. hoc enim pacto obsequun-  
 tur, & à connexu solūtur. Quod si vuluę os  
 clausum fuerit, perfusionib. vtemur, & sini-  
 stræ manus digitis leniter aperire & paulatī  
 dilatare conabimur. Quod si non successerit,  
 mulieris pubi fomenta, perfusiones, vnguen-  
 tāq; emollientia & relaxantia adhibere con-



uenit. Si robusta fuerit, eo tēpore etiā sternu-  
tamēta ex castorio, pipere, & similib. cōfecta  
narib. admouēda sunt. Hinc est quod Hippo-  
crates. 5. aph. 49. sic scriptū reliquerit: vt se-  
cūda prōcidat, sternutatoria apponito, & na-  
res apprehendito & os. Portiones deniq; ali-  
quæ earū quæ menses prouocant propinan-  
dæ. Quæ quidē omnia primo, aut altero die  
peragēda sunt. præterea suffitu vtendū, deco-  
ctis in olla artemisia, iride, sabina, pulegio,  
calamintha, & similibus, olla sellæ supposi-  
ta, cui mulier vestimētis vndiquaq; circūse-  
ptæ infideat. postea si os vteri apertū iueneri-  
m⁹, manu inserta, secūdā, vt diximus, extra-  
here conabimur. At si nō obediat, dilaceran-  
da nō est. haud multis enim postea dieb⁹ pu-  
trefacta, & in saniem soluta excidet. Quia ve-  
rò grauitate odoris & caput replet, & stoma-  
chum euertit, odoraamenta iugiter suffiēda  
sunt, quæ possint his malis aduersari, & secū-  
dam subducere. Ad quos vsus excellūt carda-  
momum, bdellium cum sabina, thus, styrax,  
ladanū, lignum aloēs, & huiusmodi iisdem  
etiam, ea quæ menses ducunt, propinanda.

## DE ISCHIADICIS. CAP. LIII.

Ischiadici, hoc est coxendicū dolore affe-  
cti, propriè dicuntur, quibus dolor circa iun-  
cturam (quam Græci *coxion*, Latini *coxā* vo-  
cant) accidit. Fit ob crassum pituitosūmq; hu-  
morem, qui in coxarū articulo cōcretus infi-

Ischiadi-  
ci.

Causa.



Signa.

det. Ideoq; hoc malum assidue cruditates, & immodicus rei venereę vsus, aliquādo etiam deambulationes cōcitatiores, & hēmorrhoides suppressæ, & vomēdi cōsuetudo intermissa, & purgationes mēstruæ, aut etiā alię familiares excretiones impeditę, & exercitiorum neglectus conciliant. Antecedit autē, & quasi auspiciatur hoc vitium aliquādo quidē vicinorū musculorū dolor, & maximē lumborū: aliquādo verò ab ipsa coxa initiū fit. iam verò quandoq; etiā contingit, vt coxæ dolore sublato, circa poplitem solum afflictio hęreat: aliis autē iuxta talū, quibusdā verò totū

Curatio.

crus æqualiter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur. Initiū igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione. Et si quidē humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnib<sup>9</sup> vena secāda in poplite aut talo interna, aut etiā cubito, Galeno lib. 10. de cōpo. med. secundū locos. cap. 2. teste: idq; in latere affecto. Sin à pituitoso atq; crasso humore malū oritur, à purgatione ei<sup>9</sup> humoris auspicianda curatio. In quē sanē vsū clysteres crebri exhibendi erūt, in hūc vel simile modū parati. R<sup>x</sup> centaurii minoris, saluiæ, verbasculi odorati, rutæ, iuæ arthriticæ hodie officinis diçte, añ m i. radicis acori ꝑ i. stœchadis ꝑ iii. sc. anisi, sc. fœniculi añ ꝑ ii s. agarici optimi ꝑ ii. polypodii ꝑ v. decoquantur in aquā iustę quātītatis, donec tertiā pars

clyster.



absumpta fuerit: dein R̄colaturę ꝑ xiii. hierę  
 picrę ꝑ s. eclegmatis indi 3 i s. oleorū liliorū  
 alborū ꝑ ii. rutacei ꝑ i. vitellos quorū numero  
 ii. salis 3 i s. misce, fiat enema. Auxiliatur etiā vomitus.  
 vomitus ischiadicis, atq; magis utiq; q̄ eua-  
 cuationes infernē per ventrē, vt qui reuellāt  
 deorsum repentē humorē. Faciēdi itaq; sunt  
 vomit⁹ in principio ab accepto cibo, postea  
 verò etiā per vomitoria medicamēta, initio  
 facto à mediocribus. In quib⁹ autē vehemēs  
 humorū coactio densatione, quę egrē dissol-  
 ui potest, à medicis intēpestiuē acribus phar-  
 macis vtentibus facta est, his cucurbitula q̄ cucurbi-  
 maxima cū scarificatione affixa auxiliatur. tæ.  
 Caterū medicamentis fluxū reprimenti- Adstrin-  
 bus in coxēdicū dolore nō vtemur. Quū in gentibus  
 profundo coxa sita sit, sanguis ex vicinis & medica-  
 ambiētibus venis ac musculis ad illā impel- mētis nō  
 litur. Mitigatoriis igitur in principio medi- vtendū.  
 camētis opus est in hoc dolore, quę neq; re-  
 frigerent multū, neque fortiter calefaciāt. vt  
 enim ea quę refrigerant, ad coxā impellūt:  
 sic quę vehemēter calefaciunt, aliā amplius  
 materiā ex adiacentibus partibus attrahūt.  
 Porro post venę sectionē, aut per purgantia  
 medicamēta vacuationē, ad acria medicamēta, non antē veniēdum est. Si enim quis prius  
 quā corpus euacuet, acria medicamēta ad  
 patientem particulam adhibeat, ægrē cu-  
 rabile malum reddet, vtpote multitudine

Acria  
 quando  
 adhiben-  
 da.



ibidem indissolubiliter cōdēsata. præter alia enim crassa & viscosa fit, & ob acrium medicamentorum caliditatem & siccitatē non dissimile quippiam assationi perpetitur. Patientē igitur locū primū ex oleo rutaceo irrigare oportet. postea verò efficaciora admoenda medicamenta, quæ scilicet sensim calefaciāt, & materias ex alto ad superficiem attrahere possint: qualia sunt, oleum vulpinum, de piperibus, costinum, vnguentum arragon, marciatō, salvia, ruta, folia lauri, sambuci, radix ebuli, pulegium, sabina, opopanax, bdelliū, ammoniacum, & similia: ex quib. fomenta, vnguenta, emplastra & cerata componi possunt. Quare primum spōgia in decocto iuniperi, aut saluæ, aut foliorū sambuci madefacta, loco patienti iterum atque iterū imposita, hoc vnguento subinde vtēdum erit, quod

**vnguentum.** R<sup>x</sup> vnguētū marciatōn 3 iiii. oleorum irini, liliacci añ ̄ s. succi rutæ, succi iuæ hodie nominatę añ 3 ii. mellis 3 i s. saluæ, pulegii, piperis añ 3 s. pyrethri, staphysagrię añ ̄ i. cerę quod satis est. fiat vnguētum. Proderit etiam huius

**Ceratum** cerati v<sup>l</sup>°, quod R<sup>x</sup> oleorū costini, vulpini añ ̄ i s. olei de piperib. ̄ s. opopanax, bdellii, styracis añ 3 iiii. radicis bryoniæ, nitri, foliorum sambuci añ 3 ii. aristolochiæ, (quam rotundā hodie nomināt) rutæ añ 3 i s. euphorbii ̄ i. gummi dissoluantur in acerrimo aceto, & cū cera & terebīthina resina quod satis



est. fiat ceratum. quod si malum adhuc remo-  
retur, clysteribus denuo utendum erit, & post-  
ea cucurbita quam maxima cum plurima fla-  
ma coxae affigenda, vulnuscule etiam altioribus  
per scarificationem impactis. Quod si vero ne-  
que sic malum finitur, ad purgationem, vomitum, &  
alia quae supra dicta sunt, redeundum est. His  
peractis, ad dropaces veteribus nominatos,  
& ad medicamentorum adurentium usum veniendum.  
inter quae non postremum locum obtinet, herbae  
hiberidis radix recens, aestate effossa, & dili-  
genter tusa, ac veteri axungia modica excepta,  
iuncturae coxae & universi cruri imposita, &  
alligata. Sic vero ad motam incubere finito,  
mulieribus quidem non infra duas horas, viris au-  
tem quatuor horarum spatio, si possibile sit id  
perferre. Excitat enim tumores cum ardore &  
rubore, veluti sinapismum facere solet. Post in  
balneum inducito aegrotante: in quo ubi modi-  
cum exudaverit, in solium ob fervorem mordaci-  
us desidere iubeto, idque fortiter perferre cogito  
(morsum enim cum ardore in principio infer-  
re consuevit) deinde educito. ferme enim sem-  
per, ut testatur Aetius, quavis ab aliis fuerint  
importati, sua sponte pedibus ingrediētes exi-  
bunt. A balneo ad oleum multum, paucum admodum  
vinum admisceto, & coquassata illinito: ac hu-  
more cum aspero pano deterso, crus ipsum cum  
levissimis lanis cooperito. Et sane consuevit  
hoc ipsum praesidium nullo alio inde auxilio

Aduren-  
tia medi-  
camenta

y



victus.

indigere. Quòd si tamē aliquādo vestigium  
mali relinquitur, vicens diebus interpositis  
rursus eodem præsidio utaris. interiectis autē  
diebus, ceratum suprà descriptū imponi po-  
test. inter adurentia medicamenta hoc etiam  
locum obtinet non extremū, quòd R<sup>x</sup> Mellis  
anacardini, fermēti añ 3 i. c. ātharidū abiectis  
alis 3 ii. aceti quod satis est, misce. & hoc quod  
R<sup>x</sup> euphorbii, nitri añ 3 ii. saponis, calcis vi-  
uæ añ 3 i. mellis anacardini quod satis est vt  
ad mellis crassitudinem omnia cōmixta re-  
deāt. Cæterū quod ad vīctus rationē attinet,  
cibus sit mediocriter tenuis, & cōcoctu faci-  
lis. exercitia perficiātur deambulationibus,  
cōtinuis flexionibus, saltationibus & cursu.  
Aliū etiā semper probē solutam habere ex-  
pedit. Quòd si verò vitium longiūs duraue-  
rit, vīctiōē in tribus aut quatuor locis adhi-  
bere oportet, vt docet Paulus lib. 6. cap. 76.

DE PODAGRA ET ARTHRI-  
TIDE. CAP. LIIII.Podagra  
arthritidis  
causæ.

Podagra & arthritis mala eiusdē sunt spe-  
ciei. Differunt itaq; nō toto genere, sed locis  
patiētibus. In vtroq; enim, articulorū est im-  
becillitas, & humor à natura alienus ad hos  
ipsos cōfluens. Quapropter si in pedibus cō-  
stiterit hęc fluxio, podagra appellatur: Si ve-  
rò reliquos artus occupauerit, Arthritis, id  
est articularis morb<sup>o</sup> nominatur. Generāt au-  
tem hoc malū cruditates, immodicus rei ve-



nereæ vsus, vehemens & cōcitatio deambu-  
 latio, stationes diutius productæ, equitatus  
 creber, familiares excretiones suppressæ, &  
 cōsuetorum exercitiorū intermissiones. mœ-  
 rores autē, curæ, vigiliæ, & reliquæ animi af-  
 fectiones hoc malū suscitāt. Nōnunq̃ etiam  
 colicus dolor perperā curatus causa est, cur  
 arthritis sequatur: quēadmodum testatur ea  
 quæ lib. vi. Epid. par. 4. aph. 3. scribit Hippo-  
 crates, inquit: cuidam intestinum colō, vbi  
 articulari morbo corripiebatur, dolore ferē  
 vacabat. Postq̃ verò ab eo sanatus est morbo  
 plus doluit. vt plurimū verò aptitudines ad  
 hoc malum à parentib. in filios ac posteros  
 transferuntur. Sed humor superās, qui iūctus  
 ris sese inserit, vel sanguine⁹, vel biliosus est,  
 vel pituitosus, vel melācholicus. interdū etiā  
 ex humorū cōmisione malū cōtrahitur. Hu-  
 morū autem discrimina iis deprehēdi notis  
 possunt. Sanguineus siquidem humor si mul-  
 tus fuerit, plenitudinem efficit, & tumorem  
 ingentem, non venarū modò, sed totius par-  
 tis patiētis circa cutem, eūmq; rubentē. Qui  
 hoc modo patiuntur, neq; refrigerantia neq;  
 calfactoria valde præfidia adhiberi sustinēt.  
 vrinæ eorū fuluæ sunt, & mediocri præditæ  
 crassitudine. venæ etiā in his copioso susce-  
 pto sanguine replentur, & in tumore attollū-  
 tur. Aetas verò apta iuuetutis. Edulia præcesse-  
 rūt boni succi, & copiosè nutriētia, neglecta.

Sigmā.

Sanguis  
nei deflu-  
xus.



- Biliofi.** exercitiorum. Tempus verò, in quo affliguntur, ver. Biliosum defluxū color subflauus, & subrubeus testatur. itē caloris sensus dolorisque lancinātis modo acris. item humor in cutem subito sine euidēti tumore erumpens. Refrigeratibus medicamētis sic afflicti gaudent, & iuantur. à calidis autē offenduntur. Febris in ipso accessionum statu accedit, validāque siti conficit, vrina sic patientiū subfulua, quandoque etiā acris, curæ autē ingentes, & irē, & vigiliæ, & fatigatiōes, & in summa victus ratio bilē procreans, præcedere solet. Aetas, temperamentum, & tempus, calida & sicca ad eum defluxum apta sunt. At si pituitosa fuerit fluxio, ad digitorum oppressionem cauius sit tumor, & sublaxus & moderatus, color dolētis membri albus. Aetas hoc modo magis afficitur senilis, tēperamentum humidum & frigidum, consimilis ambiētis status, & tempus hybernum. vrina tenuis est, & aquosa. præcedit otium, & victus ratio, quæ pituitosum humorē progignit. Si ex atra bile sit fluxus, quod rarò tamen contingit, color tumoris nigrior est. Aetas quæ magis hūc fluxum generat, est vigore inclināte, temperamentū frigidū & siccū, tēpus autumnī, regio frigida & sicca, aëris cōsimilis status, victusq; atram bilem gignens. Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, protinus sanguis mitti debet, nō solum semel, sed iterum
- Pituitosi.**
- Atræ bilis influētis.**
- curatio sanguinei.**



atq; iterum, detractiōe paulatim repetita. Si enim venæ sectione omiſſa, repellentibus medicamentis fueris uſus, magni mali autor eris. ex ignobilib. enim partib<sup>9</sup> ad principes, & vitæ neceſſarias ſanguis repulſus irruet. Secāda eſt autē vena in brachio inferna ē directo cruris influxione infeſtati. Quod ſi verò manus dextra dolore infeſtetur, venā in dextro crure ſecamus iuxta poplitem aut talos. Tum verò potiffimum ſanguinis miſſio tendanda erit, cum quempiam malum hoc primū inuadere cœpit. Qui enim ſæpius huiusmodi defluxione ſunt cōſlictati, plus noxæ q̃ auxilii ex ſanguinis detractiōe ſentiūt, præſertim ſi corpore ſint imbecillo ac frigido. Poſt miſſionem ſanguinis patienti parti-

Localia.

culæ remedia adhibere oportet, quæ neque valde refrigerant: hæc enim humores cogūt, ac cōdenſant: neq; immodicē calefaciūt. hæc ſiquidem caloris ratione ad partes patientes plus attrahūt. Quapropter aceto veteri cū roſaceo partem patientem rigare oportet, præſertim ſi in alto herere dolorū cauſa videat. Etenim acetum propria ſua tenuitate uſq; in altū progreſſum, expeditā roſaceo viam exhibet, quod natura ſua dolores lenire poteſt. Si in ſuperficie dolor cōſiſtat, per vini & olei uſum magnopere iuueris: æſtate quidē tepidorum, hyeme verò calidorū. Deinde etiā cataplaſmatis vtendū, quæ dolores lenire poſ-

y iii



sunt, ex farina foenigræci, hordei, fabarū, lupi-  
 norum, chamemelo, & similibus. Oportet  
 autē ea omnino semper esse calida; quod cō-  
 modē fieri potest, si assiduē permutētur, & la-  
 na forinsecus contegātur. Nō parū proderit  
 cataplas- & hoc, quod R<sup>x</sup> lactis caprini ꝯ vi. vitellos o-  
 mata. uorū numero ii. olei rosacei ꝯ i. croci 3 s. me-  
 dullæ panis quod satis est vt medicamētum  
 cataplasmat<sup>is</sup> formā accipiat. Hęc itaque te-  
 rantur donec vniantur: & vnita tādē impo-  
 nātur. Potest etiam fieri ceratum ex oleo ro-  
 saceo, aceto, resina, cera, galbano, ammoni-  
 co, thure, croco, & similibus. tale enim repul-  
 soriā vim propter crocum & acetum obti-  
 nebit: concoctoriā verò, discussoriā, & mo-  
 derate resiccantē, rursus ob crocū, & alio-  
 rum commixtionem. Cēterū cibos eis ex-  
 hibere oportet, qui extenuant, & minus nu-  
 triūt: quales sunt olera. carne autē, nisi sit vo-  
 luctiū montanarū, abstineāt, piscibus petro-  
 sis vtantur. vinū, si fieri potest, ex toto circū-  
 cidendum. nam hęc ferē vna ratio est, qua sa-  
 cur pauci nitas cōsequi potest. Quamcum ex milibus  
 hodie à vix vnus sequatur, nihil mirum paucos, ad-  
 podagra modū esse qui ab hoc morbo hodie liberē  
 liberētur. tur. In vicē vini vti oportet decocto cinamo-  
 mi, anisi, & similibus: aut potione ea quæ ho-  
 diernis tēporibus Hippocras corrupta voce  
 nominatur. cuius præparationem pete ex ca-  
 pite de Resolutione. A fructib. & venere ab-



stineant. Aluum etiam facile subeuntem habere oportet. Et si quidem officio suo sponte sua non fungatur, simpliciore aliquo clystere eluatur. Quod si verò ob bilis influxum dolores excitentur, tum his communis scopus, humoris affligentis est euacuatio: quæ tum per vomitum, tum per ventrem fieri debet. Per medicamenta itaque bilem ducentia confidenter purgandi sunt sic afflicti. dein usque ad vigorem apponenda medicamenta, quibus refrigerandi & adstringendi facultas inest: qualia sunt quæ ex semperuiuo, rosis viridibus, rumice acuto, solano, plantagine, & similibus iam sæpe commemoratis apparantur. In hoc influxus genere interdum ob doloris vehementiam iis, quæ stuporem inducere possunt, medicamentis utendum erit. In quem sanè usum conuenit adhibere medicamentum quod supra descriptum est, ex lacte caprimo, medulla panis, croco, & oui vitellis: cui feminis papaueris 3 iii. aut 3 iiii. aut opii 3 i. admixta sit. Profunt hac ratione cicutæ folia & hyoscyami adhibita. Sed animaduertendum erit, ut quum in feruentibus doloribus fuerimus, ad stupefacientium usum coacti, postea refoueamus partes per ea quæ calefacere possunt. Nisi enim hoc fecerimus, debiles & intemperatas redditas partes perpetuo fluori obnoxias reddemus, & quæ in actionibus facile offendantur, calorigifica verò sunt

Biliofi  
fluxus.

Stupefa-  
cientia.



victus.

Pituitosi  
fluxus.

origanum, satureia, sinapi, piper, & eiusmodi. Porro adiuuare etiam oportet sudorū exclusionem, corpus calefaciēdo & fricādo: ita tamen, ne patientes iocos contingamus. Præbenda quoq; in potu ea quæ urinā ciēt, talia enim bilem per lotiū euacuare consueuerūt. Soporem quoq; inducētia, quod fluores ab ipsis resiccētur: atque id maxime, si post corporis purgationē exhibeantur, cōferre solēt. Cibi iis dandi refrigerantes, nō tamē humectātes: humiditas enim auget fluxionem. Famem & inediam ne tōlerēt: nam bilē acriorem reddunt. Ex fructib. pomis adstringētib. & mespilis & aliis quæ refrigerant & simul fluxus cohibēt, vtantur. A vino prorsus abstineāt, vt priores. Qui ob pituitæ influxū laborāt, horum curationē à pituitæ euacuatione auspicanda. Euacuatur autem humor pituitosus per vomitus quidem, nihilominus tamen & per ventrem infernē. vtilior verò in hoc malo p̄ inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo magis, si iuxta omnes corporis articulos flux⁹ cōstiterit. familiarior enim pituitę via, & minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiorem ventrem violenter attracta non vacuetur, periculū inducit. Quapropter tutius est, vt ad infernam excretionē ducatur. Ante tamen purgantia medicamēta, ea quibus incidendi & extenuandi facultas



ineft, exhibēda, vt hac ratione ad purgationem craffi humores præparētur. Si euacuatio per purgationes fieri non poteft, tum inedia & fame vtendum eft ad plures dies. natura enim pituitofi eā bene tolerare poſſūt, iuxta hoc Hippocraticum, Corporibus carnes habentibus humidas, famē adhibere conuenit. fames enim corpora ficeat. Neque abſurdum erit, ſi clyſteribus, & medicamentis vrinam cientibus vacuentur. Cæterū extrinſecus medicamenta quæ dolores leniunt, & quæ diſcutere & moderatè reſiccare poſſūt, adhibenda, de quibus paulo ſuprà diximus. His vero in morbi principio aliqua quæ adſtringēdi potentia prædita ſunt, commiſcere oportet. Poſt principium autem, ſolis diſcutientibus vtēdum. Māſuetiſſimum verò, hoc eſt, Althææ nimirum folia cocta, tritum per ſe, tum cum polline, aut hordeacea farina impoſita. Radix etiam cocta in aqua mulſa, trita & impoſita confert. Et hoc vnguentum, quod Olei laurini, irini añ ʒ i. adipis ſuilli veteris, butyri añ ʒ iii. medullæ ceruinæ ʒ ii. reſinæ terebinthinæ ʒ v. galbani in aceto diſſoluti ʒ i. hyſſopi, radicis althææ, ſc. fœnigræci añ ʒ ii. ceræ quod ſatis eſt, fiat vnguentum. Porro quæ ratione nutrimentī præbentur edulia, natura ſicciora ſint, & minus nutriāt: vt eſt oryzæ ſuccus, & cuiusmodi. carnes tamē auium montanarum aſſæ haud in-

7. Aph.  
60.

vnguentū.

viſtus ratio.



**Atræ bi-  
lis fluxio  
nis.**

commodant. cappares ex aceto mulso miri-  
fice profunt. vinum præbeatur quàm mini-  
mum, tenue, fuluum, & vetus. Qui atræ bilis  
fluxionib<sup>9</sup> molestatur, ii venæ sectione, aut  
purgatione sunt euacuandi: venæ sectione,  
quando sanguis atra bile infectus est: purga-  
tione verò, quando ad atram vergunt bilem  
ægotantes. Si verò ambo hæc simul redun-  
darint, non vnum aliquid ex prædictis adhi-  
bere suffecerit, sed præsectâ venâ, deinde pur-  
gante medicamēto vtendum: quod ipsum &  
in aliis passionibus duplici euacuatione in-  
digentibus erit faciendum, vt lib. 2. Parado-  
xorum abunde monstrauius. In principio  
autem morbi, & in ipso vacuationis tempo-  
re, reprimentibus, & sensim simul calefacien-  
tibus vtendum est. Post euacuationem verò  
his quæ sensim calefacere, attenuare, & discu-  
tere possunt vtetur, de quibus suprà abūde  
est dictum. Ceterum quoniam tophi & du-  
ri tumores subinde in articulis creantur: mo-  
dò ob humoris, qui ad eos decubuit, crassi-  
tiem terrestremque duritiam: modò propter  
immodicum discutientium & resiccantium  
medicamentorū vsum, sine earū quæ molliē-  
di facultate pollent, mistura. Ad quos certè  
depellendos ea quæ in cap. de Lienis duritie  
dicta sunt, conferunt. Itē vetustissimus acer-  
rimusque caseus cum suillæ carnis præpin-  
guis & veteris decocto contritus, & superim-

**Topho-  
rum cura  
tio.**



positus. Ad hoc malum conducunt etiam ficus triti, & impositi. Item althæa bis cocta, auena, vrtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotani, buphthalmi marrubiūq; folia: ita ut singula prædicta cum pice & sulphure viuo permisceantur. Admiscendi etiam adipēs suillus, caprinus, vitulinus, & anserinus. Medullæ itē omnes, & alia quæ emolliēdi vi prædita sunt. Balneum sanè, ne silentio transca-  
 mus, post inflammationum remissionem omnibus podagricis cōmodissimum existit. An bal-  
neū con-  
ducatur  
 Dum lauant, spongiæ aceto & sale permixtis madefactæ, locis patientibus circumpo-  
 nendh, ut à fluxione immunes permaneant. podagri-  
cis.  
 Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aëre per omnia moderato oportet. In aqua tamen calida non diutius morandum. Consultissimum itaque, ut aqua calida perfundantur. vtile etiam, ut totū corpus linteis siccis perfricetur. Præterea  
 curati à podagra, hac se ratione à podagra Quomo-  
do quis  
à poda-  
gra se tu-  
catur.  
 deinceps tuebuntur. Si primū bis in anno, modò nihil sit quod idipsum prohibeat, sanguinem largè detraxerint, vere nimirum & autumnō. Dein si iisdē tēporibus, & crebrius etiam, medicamentis purgātibus vfi fuerint. Cibis etiā ut demāt, & à satietate sibi caueāt necesse erit. vtendum quoque cibis cōcoctu facilibus, & qui prompte in partes corpo-



- ris distribuuntur, & excrementis vacent, vino aut prorsus abstinendum, aut parcè utendum. Exercitiorum creber sit vsus, idque ante cibum. Labores enim, Hippocrate nostro teste, cibos præcedere debent. Et ut rē in paucis contraham, hoc perpetuò secum mulsit Hippocratis, ut breuissimum, ita saluberrimum præceptum: *ἀσκησις ὑγίης, ἀκορὴ τροφῆς, ἀσκήνη πόνων*: hoc est, Sanitatis studium est, non satiari cibis, & impigrū esse ad labores. Somnus etiam & venerea, ut idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorū partem attinet, sal minutim in oleo tritus, & articulis affricus, omnes qui se ab hoc malo vindicare volunt, magnificè iuvat: nisi præter modum sicca intemperie sint præditi. eoque illitu & mane & vespere per totū vitæ curriculum, utendū est.

## LIBRI TERTII FINIS.



LEONHARDI FVCHSII DE  
MEDENDIS FEBRIBVS  
Liber Quartus.

DE DIARIA. CAP. I.

Iaria febris, Græcis eph-  
mera dicitur, quòd ei<sup>9</sup> vni-  
ca sit accessio, vno magna  
ex parte die, ex ipsius saltè  
natura, circumscrip̃ta. Nec  
ab re adiectũ est, magna ex parte. sunt enim  
febres aliquę, vt sunt quę ex dẽsatione mea-  
tuum oriuntur, quę etĩ in tertium vsque diẽ  
extendantur, vt cap. secundo latius dicemus,  
nihilominus tamẽ diarię nominãtur. Quan-  
uis enim de substãtia ipsa talium febriũ dia-  
rię vocabulum non sit, tamẽ clarioris simul  
breuiorisq; doctrinę gratia, cum eadem his  
sit quę aliis diariis, nõ obstante quòd nomẽ  
non sit idem, diarias etiã appellare licebit:  
ne scilicet præt̃er tria prima febriũ genera,  
(quorum vnum est in quo spiritus plus iusto  
incalescit, alterũ in quo humor putrescit, &  
tertiũ in quo corpus & solidę eius partes fe-  
brilem calorem vt habitũ susceperũt) quar-  
tũ excogitare necesse sit, vt copiosius Galen.  
lib. 9. Ther. meth. cap. 1. docet. Fit cũ absq;  
vlla prorsus putredine spiritus præt̃er naturã  
incalescit atque succenditur. Id quod fit ob

ἐφήμερα.

Diaria fe-  
bris quę.

Tria pri-  
ma fe-  
briũ ge-  
nera.

causę.



Signa.

densitatem cutis, vigiliam, cruditatem, tristitiam, timorem, iram, curas animi vehementes, vstionem à sole, refrigerationem, laesitudinem, famem, ebrietatem, & inguinum tumores. Signa verò quibus deprehenduntur diariæ febres, duplicia sunt. quædã enim cõmunia omnium diariarum : & hæc numero sex sunt. Primum quidẽ pulsus. omnes enim diariæ, Galeno lib. 3. de Prædictione ex pulsibus autore, in magnitudinem, celeritatem, crebritatẽque pulsus, quantum in ipsis est, mutãt. Exquisitẽ autem seruant eam quæ secundam naturam est, æqualitatem, mollitiẽ, & ordinem. Alterum, vrina: prima siquidem statim die vrina cõcocta apparet, & benẽ colorata. Tertiũ, caloris qualitas: quẽ in omnibus suavis & mitis existit. Quartũ, declinatio: quæ in singulis cum sudore, rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore accidit. Quintũ, defectus malignorum symptomatum. Sextum, quia omnes à causa extrinseca (quam primitiuam vocant) oriuntur. Quẽ singula copiosius recẽset Galenus lib. 1. ad Glauconem, cap. 2. & lib. 1. de Diff. feb. cap. 7. necnõ lib. 2. de crisi bus cap. 13. Quẽdã etiã sunt signa quibus particulatim quæuis diaria dignoscitur, quæ traduntur à Galeno lib. 1. de Diff. feb. cap. 11. & lib. 2. de crisi bus cap. vlt. lib. 1. ad Glauc. cap. 2. Quare consultò iis omnibus omissis, ad curãdĩ generalẽ rationẽ



descēdamus: quę primū per victus rationem **victus.**  
 perficitur: cuius quidem in omnibus diariis  
 simpliciter appellatis communis intētio est,  
 vt cibi boni succi, & concocti faciles, ac di-  
 stributioni idonei præbeantur: vstis à sole  
 quidē & iratis, qui refrigerant & humectant:  
 refrigeratis, qui minus nutriūt, & moderatē  
 calefaciūt: vigiliis, aut tristitia, aut nimia cu-  
 ra confectis, qui humectant pariter ac som-  
 nū conciliant: defatigatis, qui maximē nu-  
 triūt. Cæterū in quibus corporis intempe-  
 ries calidior & siccior est, hos in primo sta-  
 tim accessionis insultu cibare oportet. nisi e-  
 nim quis hanc naturā statim cibet, ocysime  
 in ea diaria febris mutatur in acutā. Vinum  
 omnib<sup>9</sup> diariis simpliciter nominatis aquo-  
 sum, albū, & tenne conuenit. nam præter id  
 quod concoctionē iuuat, vrinas etiā & sudo-  
 res prouocat. Sed vigiliis, aut curis, aut tristi-  
 tia maceratis, vberius cōcedēdum: de fatiga-  
 tis, quantum conficere possunt. iratis tamen,  
 nisi omnino ab affectu quieuerint, vinū non  
 tutò datur: vt fufius Galen. lib. i. ad Glauco-  
 nē cap. 3. docet. Porro curare oportet omnes **curatio.**  
 diarias simpliciter dictas balneis, sic tamē vt  
 eos qui ob lāsitudinē aut inguinū tumorem  
 febricitant, prius dulci tepidōque ac multo  
 oleo suauiter perfricatos, ad dulciū aquarū  
 balneū ducamus. Si vero eos qui inguinū tu-  
 more febricitāt, in aëre balnei immorari ius



feris, haudquaquā nocebis. Reliquos omnes  
quā citissimē oportet ab aëre femouere.  
Qui ob vigilias, curas, tristitiam, atque iram  
febricitant, eos quidem plurimū lauare sub-  
inde non oportet, verū oleo magis nihil ad-  
strictionis habente affatim perfundēdi, par-  
cēq; fricati pro cōsuetudine lauādi sunt. A so-  
lis vstione febricitātes, statim initio refrige-  
ratiōe, & crebriorib<sup>9</sup> balneis aquę dulcis, so-  
lāq; exigui olei pfusione citra frictionē cu-  
rare oportet. Sint autē quę refrigerāt capiti  
admota, rosaceū quod salis expers sit, aliāq;  
cuiusmodi quę lib. i. cap. 3. dicta sunt. Hęc  
autem frigefacta deinceps lana excipienda  
sunt, ac suspēsa in sublime manu exprimēdo  
syncipiti instillanda, idque assidue donec  
febris inclinauerit: postea in balneum æger  
ducendus. Si quis ex frigore febriat, is quo-  
q; ad balneum in febris declinatione est du-  
cendus, caputque ante & post lotionem iri-  
no oleo aut nardino aut simili fouēdū. Qui  
ob famē febricitant, declināte accessione ad  
balneum ducendi sunt, plurimōq; oleo dul-  
ci ac tepēte perfusi molliter perfricandi, diu-  
tiūsque in solii calidi aqua continēdi. egres-  
sis vires reficiendæ, inde rursus ad balneum  
ducendi. vbi denuō egressi fuerint, seda-  
ta balnei perturbatione aqua calida propi-  
nanda, tum prisanæ cremor exhibendus, &  
interdum ex albo iure pisces saxatiles. Si ob



cruditatem febris diaria oritur, consideran-  
 dū erit an aluus lubrica sit, an adstricta. vbi  
 lubrica est, & ea tantum quæ corrupta fuere,  
 vacuata esse videntur, tum lauandum, tum  
 nutriendum in remissione febris: sed iis quæ  
 sunt circa ventriculum, prius consulētes. Sin  
 ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nūc  
 etiam in homine duret, vt virtus iam defessa  
 sit, fatius est omīssa lauatione cibare, sed con-  
 sulentes prius iis quæ circa ventrem sunt. Cō-  
 suletur autem laborantibus, si modò vacua-  
 tio amplius non duret, irrigatione ventricu-  
 li ex oleo & absinthio, & aliis quæ suprà lib.  
 3. cap. 1. de imbecillitate vētriculi dicta sunt.  
 Sint autem ea quæ ventriculo imponuntur, Tepida  
 abunde calentia: quippe quæ tepida sunt, o-  
 mnia ventriculi firmitudinem dissoluunt. Si li robur  
 verò omnino venter adstringitur, contra dissoluūt  
 eis hypochondriis, mox toto ventre, confi-  
 derandum, num cibus in gracile intestinum,  
 aut in colon descenderit. Si alimenta in ven-  
 triculo adhuc persistant, conetur æger pluri-  
 ma tepida aqua epota, immisso digito aut  
 penna, totum quod in festat, euomere. dein-  
 de fouendo hypochondria quiescere. At vbi  
 iam ad intestina alimentum descenderit, iu-  
 bendum vt decliui facie ac vētriculo recum-  
 bat: ventérque fouendus, ac somnus cōciliā-  
 dus. Post somnum ad educenda excrementa  
 glans supponēda, aut leui clyster e aluus mo-

z



uenda. Qui ex inguinum inflammatione febrem cōceperūt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed vlceri tantum ob quod inflammatio euenerit, intendentes declinante exacerbatione lauantur. Arcendi verò à vino omnes qui sic febricitant, tenuisque illis victus quousque liberentur, adhibendus. Haftenus quàm breuissimè potuimus febrium diariarum curationē prosecuti sumus: quam copiosius tradit Galen. lib. viii. Ther. meth. & in primo ad Glauconem.

DE DIARIA EX OBSTRUCTIONE MEATVVM. CAP. II.

Febris quæ ex stipatione meatuum oritur, eiusdem nature est cum diariis, Galen. lib. 9. Ther. meth. teste: desistit enim post primam accessionē, si quis eam rectè tractet: ideòq; inter verè diarias nō obstante quòd eius accessio interdum ultra vnū diem porrigatur, rectè cōnumeratur. Dicitur alio nomine synochus citra putredinem, aut diaria plurium dierum, vt ex loco Galeni iam citato sit euidentissimum. Accidit autem stipatio vel obstructio exilibus meatibus vel coniuētibus vel etiā corpore ipso immoderatiùs densato, id quod à frigore, aut qualitate vel balnei vel medicamenti acerbæ & adstringente, sole feruente, & aliis quæ cutim siccare possunt, euenit. Quia vero propter stipationem intra corpus fumida fuliginosaq; excrementa de-



tinentur plurima, forâs autem quod de iis ef-  
 fluit, exiguum est, fit vt febrē accendat. De-  
 prehenditur primū tactu: neque enim densi-  
 tas tactū exercitatum latere potest. Dein mo-  
 tu caloris, qui primo quidē insultu mitis ap-  
 paret: postea tamen vbi perdurauerit, acrior  
 euadit. Tertiò ex vrina, quæ neque crassitu-  
 dine, neq; colore à naturali multum est alic-  
 na. Quartò ex tumore corporis, qui manet,  
 nec collabitur. oculi etiā nō sunt concaui, sed  
 prominentiores, & humidiores quàm secun-  
 dum naturam. Quintò ex pulsu qui equalis,  
 maximus, celer, frequens, & vehemēs existit.  
 Qui ita laborât, si rectē curabuntur, iis san-  
 guinis missio est adhibenda. tantūque san-  
 guinis est detrahendū, quantū vires tolerant.  
 Pro certo quoq; habendum ( nisi iis qui hoc  
 per naturā sunt habitu, id adhibeatur præsi-  
 diū) fore vt vel suffocentur, vel certe syncope  
 omnino periclitentur. corpore vacuato, post  
 aut nutrimentum aut medicamentum, ex iis  
 quæ detergeāt, exhibebis. Quæ autem hoc in  
 febribus præstât, in alimentorū ratione sunt  
 ptisana & mulsa: in medicamentorum, oxy-  
 meli, & quæcūque incoquere in mulsa licet,  
 ceu calamintha, & hyssopum, & origanum,  
 & serpillum, & iris, & apium. Verū hæc  
 omnia iusto calidiora sunt, ideòq; febres ac-  
 cendūt, ita utiq; vt vinum. oxymeli verò so-  
 lum nec febres accendit, & strenuē deterget,

Signa.

Curatio.

Detergē-  
tia citra.



calefa- sic ut ea quæ glutinosa crassaque sunt, dissol-  
 tionem uat, & meatus obstructos liberet. Tercio die  
 mane si videris minimū esse quod de febre  
 relinquitur, ac neque putredinis humorū in  
 pulsu nota subsit, neque in vrina cruditatis:  
 suspecta verò hora, qua primo die febris oc-  
 cupauit, extra meridiem sit ac præterierit, au-  
 daçter hominem quàm ocysime lauabis, lō-  
 ge ante sextam horam. Abunde tamen sit, si  
 intra tertiam horam lauationem compleue-  
 ris. Ad eundem modum si decimam horam  
 suspectam habueris, vsq; ad septimam laues  
 licet, quum tres æquinoctiales horas, quatu-  
 orve inter balneum accessionisque tēpus in-  
 terponi, abunde sit satis. Vbi in balneo cor-  
 pus incaluerit, oleo prius dulci tepido vn-  
 ctum, ac moderatissimū frictum, mox deter-  
 geri extrinsecus abluique debet. Moderatif-  
 simum autem detergent erui farina, tū hor-  
 dei, tum fabarum. Post balneū præter aquā  
 quæ parū apii incoctum in se habuerit, nihil  
 his est offerendum. Licet quod inter balneum  
 & suspectas horas spatium erit, triū ferè ho-  
 rarum coniiciamus. Si verò circa vespērā aut  
 duabus horis citius accessio innadet, tum la-  
 uisse mane licebit, tum cibasse, sed tantū pri-  
 sanæ cremore. Deinde si suspectæ horæ nihil  
 afferant, & lauare rursus si velit licet, & ciba-  
 re. Sin aliquid eueniat, & cōferendum id est  
 cum accessione quæ primo die inciderat, &



tum urinae consideranda sunt, tum etiam pulsus. Quae omnia profecto mediocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio. Quare ipsum & lauabis 4 die, & cibabis, ad iam dictas considerationes spectans, sperabisque nihil quinto die superventurum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarum genere non erit.

DE SYNOCHO CVM PUTREDINE. CAP. III.

Synochus Graecis, febris est in qua una accessio ab initio ad finem perpetuo manens, in multos porrigitur dies. vel est, quae omni mutatione magna usque ad iudicium caret. Latini potest dici continens. Huius autem febris duplex ex natura. quaedam namque notae putredinis prorsus nullam habet, & haec ex diariarum febrium est genere, ut diximus cap. proximo, & synochus non putrida vocatur. de ea hic nobis sermo non erit. quaedam autem manifestam obtinet putredinis notam: haec est, de qua hic agitur, & dicitur synochus putrida. Febrium vero quae synochi seu continentes dicuntur, tres sunt differentiae. nam quaedam earum à principio usque ad finem aequali magnitudine perdurant, & dicuntur graece homotoni & acmaistici, hoc est in eodem vigore permanentes. quaedam semper augentur, & adiaciunt exiguum aliquid, Graeci anabaticos & epacmaísticos, id est incrementum suscipientes

σύννοχος.

Continens febris.

Differentiae tres synochorum.

ἁκμαστικοί.

ἰπακμαστικοί.



πύρρον-  
 ματικοί. nominat. quædā paulatim diminuuntur, pa-  
 racmasticos Græci vocāt, hoc est decreſcētes,  
 quemadmodū fuſius tradit Gal. lib. 9. Ther.  
 meth. & lib. 2. de Diff. feb. cap. 2. & lib. 2. de  
 cauſis. crifibus cap. 6. Putrida ſynochus fit ab iisdē  
 cauſis, à quibus non putrida, nempe à vèhe-  
 mēti ſtipatione quæ intra corpus febrilē ca-  
 lorē cohibet, & efficit vt in omnibus vafis, ac  
 potiſſimū maximis, æquabiliter humores pu-  
 treſcāt. quæcūq; enim calida & humida ſunt,  
 difficilēmq; trāſpirationem habēt, ea facilē  
 quoque putreſcunt. Hinc eſt qd hoc genus fe-  
 bris nec in gracilibus vel qui raro ſunt corpo-  
 ris habitu, nec in frigido corporis tempera-  
 mento, nec in frigida ætate excitetur: ſed æ-  
 tate & temperamento calidis: ac præcipuē ſi  
 & carnoſus, & bono ac multo ſanguine af-  
 fluēs, & deſo corpore æger ſit, aut etiam cali-  
 dis excrementis reſertus. Ex his itaque con-  
 ſtat, qd ſanguis qui in vniuerſis vafis, præſer-  
 tim maximis circa alas & inguina exiſtētib;  
 æquabiliter exuberans putreſcit, & ſynochi  
 putridæ cauſa exiſtat. Qui ita febricitant, iis  
 & pulſus maximus eſt, vehemens, celer, cre-  
 ber, & æqualis, haud ſecūs ac in ſynochō nō  
 putrida, & vehemēs. conſtitutio etiā arteriæ  
 nec durior quàm pro natura ē, nec mollior,  
 celeritatis tamen & frequentię eò peruenit,  
 quò febris ipſa magnitudinis. Atq; hæc qui-  
 dem (vt diximus) ambarū cōmunia. alteri ve-



rò de qua nunc agimus priuātum putredinis  
 insunt notæ, idq; tū in vrina, tū pulsu, tum ca-  
 loris nigrata qualitate. Curadi ratio vt in sy-  
 nocha non putrida, à sanguinis missione au-  
 spicāda. Et valida existente virtute, nulloque  
 alio insigniter repugnante, sanguis vsque ad  
 animi deliquiū auferendus. Maximū enim  
 hoc, Galen. lib. 9. Ther. meth. autore, vbi va-  
 lentes vires sunt, synochi febris remediū est.  
 Primū nāq; in cōtrarium statum agitur cor-  
 pus, celerrimē ex animi defectu refrigeratū.  
 Hoc verò nemo inuenire potest, neq; q̄ ipsis  
 egris, neq; quod naturæ quæ animātes guber-  
 nat, iucūdius vtiliusve sit. Postmodū in eius-  
 modi corporibus necessariò superuenit alui  
 deiectio, nō nunq̄ etiā bilis vomitio. quas res  
 statī à toto corpore sudores excipiūt. Quòd  
 si verò curare aliquando ægrotum cogēris,  
 cui nō solū antea secāda venæ remediū præ-  
 termisū est, sed nūc quoq; vel per medicorū  
 ignorantia, vel ipsius laborātis propinquo-  
 rūq; eius timiditatē, procedēte tēpore mitte-  
 re sanguinē prohiberis, ad frigidam exhibē-  
 dam accedes: sed diligenter antè discernens,  
 quantū ex ea nocumētū cōtingere possit. Nā  
 si id aut exiguū erit, aut nullū, offerenda po-  
 tui est quæ prorsus sit gelida, quātū bibere æ-  
 gro libet. Quinimo magis id audebis, si fri-  
 gidæ potioni insueuerit. Sin magnū timetur  
 incōmodum, ab hac quidem abstinendum,

Curatio.

Sanguinis mis-  
sio.Quā frigi-  
da adhi-  
benda.



Frigida  
quibus  
incōmo-  
dat.

atq; aliis auxiliis quib<sup>9</sup> obstructio eximatur,  
& abundantia vacuetur, & febris feruor de-  
ferbeat, vtendū. Quæ singula è suis locis tibi  
petēda erūt. Porro incōmoda quæ frigidam  
portionē intēpestiuē immodicēq; exhibitam  
sequuntur, hæc sunt. Primū, quia lentos cras-  
sōsq; humores, siue obstructiones, siue putre-  
dinem, siue phlegmonē, siue erysipelas, aut  
scirrhu, aut œdema creauerint, attenuari di-  
gerique prohibet. Quoties igitur ex iis fe-  
bris accēditur, ad eorum vacuationem frigi-  
da data non conducit. Ad præsens tamē non  
parum adfert leuamen, propterea quod iam  
accensam febrem extinguit: verū quū cau-  
sa eius adhuc permaneat, aliam denuò accē-  
di febrem est necesse, atque eā quæ præcessit  
nonnunquam difficiliorem: propterea quod  
densatum ex frigida corpus est. Alterū incō-  
modum est, quod multas laborantis imbecil-  
las particulas, siue ita se ex naturali intempe-  
rie habeat, siue ex vitio adscititio, lædit. Sic  
compertum est aliis gulam adeò vehemēter  
esse læsam, vt vix deglutirent: aliis ventricu-  
lum, vt vix concoquerent: aliis ipsum ventri-  
culi os, aut iecur, aut colon, aut pulmonem,  
aut septum trāsuersum, aut renes, aut vesica,  
aut tale quippiā aliud à frigido percussū,  
ad propriā actionem infirmum esse redditū.  
Nonnulli autem ex intēpestiua immodicāq;  
eius portione, non multo interposito tēpore,



nec postmodum, sed illico difficultate spirandi, & cōuulsione, & tremore correpti sunt, ac toto (vt semel dicam) neruoso genere læsi, vt itaque in pauca rē contrahamus, quibuscūq; in principe particula tumor aliq̃s phlegmonodes, aut cedematodes, aut scirrhus cōstitit, iis frigidā offerre non oportet: sed nec iis quibus obstructio putridūve humor nō cōcoctus incommodat. Quod si verò euidentes percipis absque iam dictis tumoribus cōcoctionis notas, neque pars aliqua tēperamento adeò frigido fuerit prædita, vt in hanc noxa procubat, audacter frigidam dabis. quippe solidarum animalis partium natura roborata, prætenuatis iā humoribus opponitur: ita vt qui viles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidē ad se trahat, inutiles vel per vētre, vel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigide assuetus eger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iā edoctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare. omnino nāque si quod frigidū adeò esset, vt ab hac offēderetur, per sanitatis id tempus euidenter offensam suam ostēdisset. Ex iis perspicuum fit, cōtinētium **Epilog<sup>o</sup>** februm maxima remedia esse hæc duo, san **curatio-** guinis detractionem, & potionē frigidā. **nis.** vērū illa nullo non tempore, modò vires sustineant: hæc quum & in pulsu, & vrinis cōditionis euidentes cernūtur notæ: febris autem



**Victus  
ratio.**

est maxima. victus ratio hæc potissimum sit. His quibus secta est vena, post duas à sectione horas ptisanæ cremorem exhibebis, quicquidque imperabis. vbi à somno excitati fuerint, rursus ptisanæ cremor præbendus. In hac victus ratione vsque ad tertium diem persistendum. Animaduertendum tamen in synochis febribus tum alendos esse egros, quo tempore sani consueverant, & vbi maius leuamentum sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si vires robustæ fuerint, & vigor morbi statim expectetur, tenuissimo victu, & eo qui iam dictus est, vtendum erit: sin contra vires imbecillæ fuerint, haud sine ingenti dispendio victus tenuis exhibetur. ergo in cibis offerendis virium robur diligenter perpendendum. Hæc de curatione febris continens putridæ sufficiant. plura si desideras, nemo desiderio tuo rectius satisfacit præter Galenū, qui libro 9. Therap. methodi hanc ex professo & copiosissime docuit.

DE CONTINUIS FEBRIBUS. CAP. IIII.

**cōtinua  
febris  
quid.**

Cōtinuæ febres sunt, quæ non desinunt ad infebricitationem, remissionem tamē in singulis accessionibus habēt. Differūt igitur à synochis, quod scilicet hæ nullam prorsus feruoris remissionem obtineant, vnicāque illis sit accessio, quæ ab initio ad finē vsq; perpetuò manet. Fiunt propter humores qui in-

**causa.**



tra vasa putrescunt: hâcque ratione ab inter-  
mittentibus differunt, in quibus humores eas  
excitâtes per singulas corporis partes disper-  
guntur. quò fit vt delationis impetu ipsæ per  
se ipsas expurgentur. Nullû certius indicium  
februm continuatum est, quàm quòd nulla  
illarum ad infebrecitationem perueniat, do-  
nec ex integro desierint. Atque à synochis fa-  
cile discernuntur per remissionem, quam in sin-  
gulis accessionibus obtinet. Sunt autem febrium  
continuarum tres differentie, quæ iuxta hu-  
moris in venis putrescentis diuersitatem pro-  
creantur. Si enim flaua bilis putrescat intra va-  
sa, tertiana continua, quæ alio nomine caussos  
Græcis, ardēs verò Latinis nominatur. Sin pi-  
tuita, quotidiana continua: veluti si atra bilis,  
quartana continua nascitur. vnde liquet, conti-  
nuas febres idem habere genus cū intermit-  
tentibus. cum tertiana quidē exquisita, exqui-  
sita ardēs: cū quotidiana verò, ea quæ quoti-  
die quidē facit accessionem, sed nunquā desi-  
nit ad infebrecitationem. cū quartana illa quæ  
quouis die inuadit, sine vlla intermissione.  
Porro quum continuæ febres ex putridarum  
sint genere, necesse erit vt qui illas curare vo-  
let, putredinem inhibeat. Ita duæ statim se in-  
ditationes exhibet, quarum altera à febre, al-  
tera verò à putredine sumit. Atq; à febre rur-  
sus duæ, scilicet vt portio febris quæ iâ accē-  
sa est, percuretur: quæ verò in generatiōe est,

Signa.

Differē-  
tiæ tres  
febriū cō-  
tinuarū.  
καυσος.

Curatio.



inhibeat. Aliq̃; duæ à putredine, vt & quod putredinis iam factū est, sanemus, & quod in generatione adhuc est, sistamus. Porro quod in generatiōe est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoque aliæ duæ indicationes nascentur, tum vt quod retētum est vacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur. Sanè prohibebitur iis præsiidiis, quæ obstructioni medentur. Huius rursus obstructionis quod iam occupauit, sanandum est: quod futurum est, propulsandum. At curabitur quidem obstructionis quod iā factū est, per ea quæ obstructa liberāt. propulsabitur quod futurum est, si affluxū obstruentium succorū cōpescamus. vnde satis liquet, quod vltimum in ipsa resolutiua methodo est inuētum, id primum omnium in curatione esse peragēdū. Quum itaq; particulatim rem expendentibus, quin que sint in febribus continuis à quibus indicationes colligūtur, febris nimirū, putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum destruentium copia, à postremo curādi ratio

Venæ se-  
ctio.

auspicanda erit. Copia itaque humorū requirēte vacuationem, principio, si valida fuerit virtus, tempus & ætas, atque alia consentiāt, sanguinem mittere oportet. vacuata multitudine, ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisque iis quæ obstructiones tollere possunt vtendū. verūm quoniam horum plerāq; calida sunt, metus



est, ne tum putredinem, tum febre augeat. Itaque iis quæ citra calorem liberare ab obstructionibus valeant, utemur. Qualia verò hæc sint, diximus suprà, capite nimirum secundo huius libri. ubi autem quæ obstruunt deterfa dissectaq; sunt, per aluum, urinas, & sudorem ea vacuare tētandum. Quum verò materiæ, quæ hæc efficiat, etiam calide sint, necesse est interea tum putredinem tum febre augeri. Quare quoad licet, id agendū, ut quæ minus calefaciat materia deligatur. aut si qua inueniri potest quæ nō calefaciat, quæadmodum in hoc casu balneum, utique ea petenda est. balneū verò id posse Galenus lib. tertio de tuenda valetudine iis verbis docet: Dulcium calefactarum aquarum, si tepidiores sint, vis humida & frigida est. Et paulò post: Balneū si probè adhibeas, duras tensasq; partes emollit, excrementū, putrēq; si quod intus ad cutē hæret, euocat. His itaq; peractis, & detersis iis quæ cuti impacta fuerūt, atq; adeò obstructione ac impedita perspiratione amota ad putredinis curationem veniendū est. Hoc itaq; tēpore etiam vires roborare, quò & putredinē superent, & succos concoquāt, studebimus. Putredinē etiā sanabimus, si id quod iam corruptū est, omni ratione vacuabimus: quod reliquum est, moderatis motibus & refrigerante perspiratu, ad exactam mediocritatem reducemus, ac vacuationem eorum



per urinam, deiectiones, vomitū, ac sudores  
molicimur. Vltimò ad febris curationē pro-  
grediendam, quæ quidem per refrigerantia  
fieri solet. omnis enim febris, quæ febris est,  
humectatio refrigeratioque remedia sunt.  
Quemadmodum autem horum quodq; re-  
ctè fieri debeat, partim antea dictum est, par-  
tim etiam in sequentibus commemorabitur.

## DE ARDENTE FEBRE. CAP. V.

καύσος  
causa.

Ardēs febris est, quæ Græcis (vt suprà quo-  
que dictū est) καύσος vocatur. Estq; ex gene-  
re continuarum. Fit, quando flaua bilis in ve-  
nis putrescit, atque ad eò cum tertiana inter-  
mittente, eo quòd ab eodē procreetur humo-  
re, communicat. Differt autem, q̄ in hac per  
totum corpus bilis defertur, in ardēte autem  
febre flauæ bilis humor in vasis vnà cum san-  
guine continetur. atque ob eā etiam causam  
in adurente febre singulæ accessiones ad infe-  
bricitationē non perueniunt. Quando verò  
in iis bilis etiā vehemētius agitur, & à na-  
tura inualecente compellitur, tunc rigor su-  
peruenit, & febris soluitur. Id quod Hippo-  
crates ī Aphorismis iis īnuere verbis voluit.

4. Aph.  
58.

Signa.

» A febre ardente habito, rigore superueniēte,  
fit solutio. Dignoscitur verò iis notis. Lingua  
eorū qui hac febre affliguntur, arida fit, cras-  
sa, aspera, & nigra: vētriculi erosio, sitis into-  
lerabilis, vigiliæ, nonnunquā etiam delirium  
eosdē infestat. Deiectiones etiā pallidæ sunt.



Quod ad curadi rationem attinet, prima fe- Curatio.  
bre ardente laboratium praesidia sunt, ut de-  
cumbat in frigido loco ad suauem auram ex-  
posito, a qua purus diffletur aer, culcitra etiam  
molli, quae frequenter sternenda est. Stragula  
tenuissima sint, & minimè sordida. quae assiduè  
mutentur, habeatque lectus insignem la-  
titudinē, ut ad diuersas subinde partes mem-  
bra calefacta transferri commodè queat. Tum  
aer ignauior flabello excitetur: pectus ac sto-  
machus foueantur palmulis cum rosaceo, aut  
oleo cotoneorum tritis. conueniunt & alia refri-  
gerantia medicamenta, ut sunt palmites, inty-  
bum, polygonum, plantago,amenta cucurbi-  
tae, lactuca, oxalis, folia vitis, & similia. Suda-  
riolum quoque tenue complicatum, oleoq;  
& aqua calentibus madefactum, stomacho &  
pectori applicetur: id enim febrium ardorem  
mirum in modum sedat. lana quoq; quantum  
manu capitur, aqua & oleo rosaceo calefa-  
ctis imbibita è sublimi in pectus expressa fer-  
uoris vehemētiā facile obtundit. Hec autē ca-  
lida esse oportet. nam tepida membrorum vigo-  
rem exoluunt. Nec frustra in ardentissimis fe-  
bribus etiam acetum admiscebis. Cibi offeren-  
di sunt, quibus refrigerandi & humectandi vis  
inest: qualis est lactuca, cucurbita, cremor pti-  
sanae, & similes. Potus sit decoctum cinanomi,  
aut omphacium. & si assueuerit eger, post ci-  
bum frigidam deglutiendam dato, quantum est,

Tepida  
membro-  
rum vigorem  
exoluunt.



cochleare vnū, aut duo: vel cū decocto hordei misceantur iuleb, vt vocant, violarū, rosarum, & iis similia. succo prætereà solarū rosarum stomachum recreabis: atq; alias refrigerationes machinaberis, virentibus vitis, rosarū, nymphææ, violarum foliis & floribus, solum sternendo, & aquam frigidam sæpius irrigando, riuulósque aquarū moliendo, quæ ex propinquo suauiter instrepant. Inter initia verò statim, si ætas, tempus, virtus, & alia eiusmodi permiserint, venam incidere oportet, vt ex capite præcedēte etiam satis liquet.

Venæ sectio.

Epithemata quo tempore adhibenda.

Epithema.

Epithemata verò & reliqua refrigerantia in principiis & incrementis accessionum non sunt admouenda: hoc enim tempore corporis affectus adhuc ambigit, & calor viscera obsidet: quapropter adhibita calorē in profundum repellendo, maioris nocumētī occasionem præstant. igneus enim calor intus repressus, vehemētiori rursus ardore excitatur: sed in vigore, calore iam per vniuersum corpus explicato. tum enim residuum caloris præter naturam circaviscera derelictū, promptē extinguetur. Hinc egri melius spirare incipiūt, & leuiori siti infestātur. Quidam etiam rorido efflāte vapore deliniti, somnū capessunt. Sint autem epithemata eiusmodi, quæ & succi rosarū, lactucę añ ꝑ iii s. succi intybi domestici ꝑ ii s. aceti optimi ꝑ i s. santalorū omniū añ ꝑ i. caphuræ gr. iiii. misce, fiat epithema.



Porro instante totius morbi vigore, & nullo  
 eorum quæ dicta sunt cap. 3 prohibente, dan  
 da syncera frigida. In curatione siquidem fe  
 brium ardentium, horum alterum fieri necessa  
 riū est, si perfectè morbus solui debet: aut bi  
 liosos humores excerni, aut eosdē extingui.  
 Excernuntur itaq; per venæ sectionē, sudores  
 vomitiones, & aluum. Extinguuntur autē fri  
 gidæ potu, quo ardētissimæ febres nō rarò ex  
 toto curantur. Ceterū balneū his solū vsui est,  
 qui citra tumore inflammationi aut erysipe  
 lati consimilem, ardenti febre laborāt, in vri  
 nisq; apparuerint coctionis signa. Aeger qui  
 lauacro frigido vri vult, sit iuuenis, carnosus,  
 tempus quoque æstiuum, ac constitutio anni  
 calida & sicca: nec eo vtatur nisi ī febris vigo  
 re: idq; maxime faciat, si frigidæ lotioni as  
 sueuerit. Moderatori verò existēte febre, ro  
 bustaq; virtute, simul cū coctionis notis, con  
 ferūt dulcis tēperatæq; aquæ balnea: hæc enī  
 refrigerant & humectāt, vt diximus. Ex vn  
 ctionibus chamæmelinū oleum etiam, si cō  
 tinens aēr frigidus sit, conuenit. Materiæ ex  
 qua remedia ardentium febrium cōponun  
 tur, copiam ex sequentibus petes capitibus.

DE EXQUISITA INTERMIT  
 TENTE. CAP. VI.

Tertiana quidē febris intermittēs exqui-  
 sita est, quæ ex flaua bile per sensiles corporis exqui  
 sita partes delata oritur, & sui ipsius naturā purā ta.

A

Aqua fri  
 gida quā  
 do dāda.

Balneū.



**Signa.**

atque sincerā seruat, & dignoscitur iis notis. In biliosioribus naturā corporibus consistit, & vigēti ætate, tempore æstiuo, calidis & siccis regionibus, similique; aëris cōstitutione, vita etiā laborib⁹, vigiliis, curis, ac foliis feruori addicta. Ad hæc in eo quoq; facile tertiana exquisita accenditur, qui cibis ac potionibus calidis & siccis antea vsus est. Hæc etiam statim ab initio inque singulis accessionibus rigorem vehemētem affert: qua vna ratione ab ardente febre, vt antea commemoratū est,

**Quarta -** differt. A quartana verò rigore in hoc distat, næ rigor quòd corpus pūgere, ac veluti vlcerare videatur: cum quartana refrigerationē habeat sistet à rigore ter- millimam ei quę hyberno tempore sentitur. Tertianam itaque febrem non contingit fieri sine rigore vehemēti, pungente ac vulnerante carnē. Quartana verò, neq; primo die statim cū rigore inuadit vehemēti. nam progrediente ipsa atque aucta, vnā etiā rigor augetur: sensusque egrotantiū non est quasi eorum qui punguntur, sed potius qui refrigerantur, & veluti ad ossa vsq; molestatur. Est quoque in tertianis pulsuum exactus ordo & æqualitas, qui tamen ad vehemētiam, magnitudinem, & frequentiam in accessionū incremento excitatur. Præterea & sitim in vigore inuehit, ac hominem exurit, vt abiectis vestibus æger denudetur, amplēque & frequenter spiret, exuffletq; veluti flāmam, frigidāmq;



potandā flagitet. calor equaliter subinde per totū corpus extenditur, nihilq; magis thorax quā extrema calent. Et si manū inieceris, occurrit primum plurimus ac mordax calor, & cū aliquo veluti vapore elatus. nō multo tamen postea à manu euincitur. Et iam bibendi tēpus adest ægrotādi. vbi verò potione fuerit recreatus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit, sudoris nuntia. Bilis etiam vomitio superuenit, aluiq; soluitur, & biliosum mingunt. præterea ad integritatē infebrecitationēve desinit, vbi accessiois tempus horarum nō plurium duodecim expedit. nam hoc tempus lōgissimum est in veris tertianis. Quæ singula fusiū explicat Galenus libro 2. de crisib. cap. 3. Tertianum autem exquisitā, vt quæ ex flaua bile cōmota inualeſcat quā maxime fieri potest, refrigerare ac humectare oportet. is enim humor inter omnes qui in corpore sunt, calidiōrque sicciōrque existet. Aeger itaque decumbat in loco frigido ad auram suauem, vt cap. 5. etiam dictum est, exposito. Solum etiam spargatur frequēter aqua frigida, aqua stillatitia rosarum, violarum, & similium. Humi etiam sternātur folia salicum, vitis, flores rosarum, violarū, nenupharis, ac eiusmodi. Cibus vtantur ægri, quibus humectādi & refrigerādi facultas inest. ex oleribus quidem atriplici blito, malue, lactuca, cucurbita, lapathio, inty-

Tertiana ex-  
quisita  
curatio.

A ii



bis, & similib<sup>9</sup>. Ex aliis verò ptisanę succo, & piscibus saxatilibus. Ex volatilibus, quę mol libus constant carnibus. Quę verò talia non sunt. eorum alis: testiculis quoq; gallorū, suil lisque pedib<sup>9</sup> & cerebro. Porcellorum etiam si dederis carnem liquefactā, nihil nocebis. Sed & oua ad sorbendum sunt offerēda, præsertim vitelli eorū: nā hi facilius quàm pars alba concoquuntur. Ex fructibus permittendum, vt illos degustēt qui nō omnino ad cōcoquendū difficiles sunt. Abstinedū autem à melle, sinapi, salitis, omnib<sup>9</sup>sq; acribus. A vino verò, antequàm morbus cōcoquatur, omnino arcendus eger. Interim bibat decoctū cinamomi, aut hordei, aut hoc quod R̄ zula pii violacei 3 iiii. decoctionis cinamomi lib. i. misce, fiat potio. Cæterum vbi cōcoqui cœperit morbus, dandum est ab initio vinū tenue, aquosum, & paucum: vbi verò iam prope est vt morbus soluatur, amplius est offerēdum. Quod ad somni rationē attinet, in accessione non est dormiendū, sed vigilādum potius, vt sanguinis, spiritus, & caloris naturalis ad interiora motio impediatur, atque adeò in contrariū & ad exteriora retrahatur. aliàs enim febres vix dissoluuntur, & ad consistēdi tempus tardissimè perueniūt, fluxionesque multiplicātur. Finita accessione somnus non improbatur. Exercitia & omnes vehēmentiores motiones cauendæ, ne cū Hero-

Potus.

In accessione nō dormiendū.



dico, cuius Hippocrates meminit, ægrotâtes interimamus. Animi perturbatiões, ira potissimum, timor, mœstitia, & similes, fugiendæ. Non solum verò prædicta victus ratione, sed medicamentis etiã refrigerare & humectare cõuenit. Quapropter hæc aut cõsimilis potio haurienda erit, quæ R̄ florũ violarũ, boraginis, rosarũ añ m i. florũ nymphææ m s. intybi hortẽsis vtriusq; (endiuiam & scariolã hodie vocãt) lactucę vtriusque añ m i s. passularum purgatarum § i. prunorũ damascenorum numero xi. seminum intyborũ, lactucæ, portulacę, cucurbitę añ 3 iii. radicũ cichorii 3 vi. Decoquantur singula in duabus libris aquę fontanæ, donec tertia pars cõsumpta fuerit. deinde colẽtur, & colatus humor saccharo dulcescat, & cũ oui candido clarificetur, atq; adiiciantur syrupi de intybo domestico latifolio, zulapii violacei añ § ii s. fiatq; potio. Aut si potio ægrotanti displicet, detur hoc eclegma, quod R̄ conseruę violarũ, boraginis, rosarũ, nymphææ, cichorii añ § s. diaprunorum non solutorũ 3 vii. diarhodõn abbatis § i. specierum diatria santalorũ 3 ii. cum zulapii violaceo quod satis est, fiat eclegma. Non negligenda præterea biliosi humoris, si res ita exigat, vacuatio: sed eum sanè qui ad stomachũ cõfluit, per vomitũ educere oportet. Quare rò ratione sit ciendus, in superiorib. libris est annotatum. Eũ autem qui ad inferiora repit,

Decoctũ  
alterans.

Eclegma.

Euacuatio.

A iii



Clyster.

alui deiectionibus elicere oportet: hoc quidem & sponte fieri solet in tertiana exquisita.

Alius itaq; mollientibus clysteribus exinanenda est: qualis est qui R<sup>x</sup> maluæ vtriusque, herbe violarum, mercurialis, intybi domestici, angustifolii, hoc est scariolæ, añ m i. seminum portulacæ, melonū añ 3 ii s. Decoquantur in aqua iustę quātītatis, quoad tertia pars absumpta fuerit. Colaturę adiciatur casię fistularis recens extractę § i. olei violacei § iii. salis cōmunis 3 i s. misce, fiat clyster. Per urinam quoq; & sudores diuertere oportet. Urina igitur potionibus, in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocāda. Et si coctio-

Absynthium.

nis notæ apparebunt, iam tutò absinthiū dabis: quòd alioquin summum est ventriculi remedium, vbi bilis hunc infestauerit, si præsertim ex ipsius coma quantū sufficiat accipiēs,

Sudorem prouocans.

melicrato intinxeris. Sudorem verò hoc vel consimili medicamento euocabis, quod R<sup>x</sup> radicū apii, asparagi, cichorii, añ § s. seminum oreoselini, fœniculi, rusci, smyrnii añ 3 ii. ciccerū nigrorū 3 iii. anethi m. s. Decoquantur singula in aqua fontana iustę magnitudinis, colētur subinde, & colatus humor saccharo dulcescat, & adiciantur oxymelitis compositi § ii. & fiat potio. Aut singula iam dicta redacta in puluerē exhibeantur, qualibet vice 3 i. aut 3 i s. cum oxymelitis § iii. Id ipsum verò in declinatione accessionis, aut die qua æ-



ger à febre liber est, faciendum erit. In hunc  
 vsum proderit inunctio ex oleo chamæmeli-  
 no & anethino, ac similibus. Balnea quoque **Balneum**  
 calida ex aqua potabili profunt, tū quia ali-  
 quid bilis educūt, tum etiam quia sua quali-  
 tate plurimū iuuant. Nā huiusmodi bal-  
 nea humectant, & potentia refrigerant. Ma-  
 rinæ autem aquæ, & salæ, nitrosæ, aquæ sul-  
 phuræ, plus quidem bilis educunt: sed mul-  
 tō minus, quā potabiles, profunt. Præstat  
 verò neque ipsas vtilis dicere, quandoquidē  
 plus qualitate nocent, quā euacuationibus  
 iuuent. Semper autem oportet contrarias **Cōtrariæ**  
 qualitates illis quæ præter naturam inualue- qualita-  
 runt opponere: quum hoc multo plus iuuet, tes illis  
 quā quomodolibet euacuare. Hæc igitur quæ præ-  
 in balneis intentio sit, vt corpus madeat & ter natu-  
 humectetur atque idcirco neque nitrum, ne- rā oppo-  
 que salem, neque sinapim inspergere oportet nenda.  
 at plurimum oleo calido perfusos ægros ad  
 aquam perducere, ac madefacere. Et si in ea  
 natate voluerint, quandiu potuerint permit-  
 tendum. Atqui balneis admodum delectan-  
 tur, si etiam bis in die lauari permiseris, non  
 aberrabis, vt Galenus perspicue libro 1. ad  
 Glaucon cap. 9. docet. Verū illud semper  
 in memoria habeto, vt id in tempore faciāt.  
 Si verò signa iam coctionis ostendantur, tūc  
 etiam si sæpius laueris, nihil deliqueris.

A iiii



## DE TERTIANA NOTHA. CAP. VII.

Causa  
Signa.

Victus.

Tertiana notha fit, quando bilis maxima ex parte pituitę miscetur. Hinc est quod non singula signa, vt in exquisita, purę bilis naturam præ se ferat. In ea etiã accessionis tēpus duodecim horas excedit: neq; etiã, vt exquisita, septenis circuitibus iudicatur. Tardiùs denique in hac ipsa spuria tertiana coctiõis notæ apparent, neq; tantus etiam in vigore calor. Accedit q̃ non finiatur, vt exquisita, sudoris copiã. Victus ratio nõ sit in vniuersum in hac febre, quæ refrigeret atque humectet: sed aliquid quoque assumat quod calefaciat & incīdat. præiacet enim crassior, neque adeò calida bilis. Plurimũ igitur ea laborantes iuuat ptisanæ cremor, adiecto piperis modico, vel hyssopi, vel origani. Sorbitiones etiam concoctu faciles dandæ sunt. Porro cum accessionis tempus longius sit, atque adeò integrum diem duret, non sanè quotidie, sed alternis tantũ diebus cibum exhibere oportet. hac enim ratione ne morbus augeatur cauebimus. Verũ curandum etiam vnicè, ne ægrotantis vires, quæ longiori tempore debent laborare, prosternantur. Quapropter difficile admodum est seruare utrũque, quoniam inedia quantum profunt ad morbi coctionem, tantum vel plus officiunt viribus: cibi verò quantum ægroti robur adaugent, tãtum coctiones impediunt. Quare in-



edia quidem, vbi valentiores fuerint vires,  
 & morbus concoctu difficilis fuerit, vtendū.  
 largiori verò cibo, vbi vires sint imbecillio-  
 res, neq; morbus concoctu contumax. Potus  
 fit decoctum cinamomi, aut hordei, in quod  
 (vt dictū est) aliquid hyssopi aut origani in-  
 iectum sit. Quies etiam conducit. Quod ad **Curatio.**  
 curandi rationem attinet, si sanguinem mit-  
 tere opus est, neque hoc omittendum, sed ab  
 initio statim adhibita etatis, temporis, regio-  
 nis, habitus corporis, & similium distinctio-  
 ne: tantumq; sanguinis detrahendum, quan-  
 tum præsens exigit status. Clysteres quoque **Venæ se-**  
 non admodum molles iuuant, qualis est qui **ctio.**  
**Clyster.**  
 R̄ maluæ, mercurialis, foliorum violarū, ori-  
 gani, hyssopi añ m i. cartami p. ii. coquantur  
 singula in aqua iustæ quantitatis. Colaturæ  
 adiciantur benedictæ laxatiuæ vocatæ, hie-  
 ræ picræ añ 3 iii. mellis rosacei 3 vi. oleorum  
 violacei, chamæmelini añ ̄ i s. salis cōmunis  
 3 ii. fiat clyster. Ceterum danda etiam deco-  
 cta, quibus ea insunt quæ citra plurimā cale-  
 factionē & exiccationem incidere & vrinari  
 ciere possunt. cuiusmodi est id, quod R̄ radi-  
 cum apii, fœniculi, cichorii añ ̄ i. intybi do. **Decoctū.**  
 mestici vtriusque, origani, hyssopi añ m i. la-  
 tuca m i s. seminum quatuor frigidorum  
 communium añ 3 i. seminum fœniculi, apii  
 añ 3 i s. Decoquatur in aquæ lib. 2. donec ter-  
 tia pars absumpta fuerit. Colatus humor dul-



**Purgatio**

cescat saccharo sufficenti, & oui albuminib<sup>9</sup> purificetur, ac subinde adiciatur syrupi acetosi simplicis, mellis rosacei colati, oxymelitis simplicis añ ʒ i s. & fiat potio. Post hæc ea quæ vëtre placidè subducunt sunt exhibenda, vt dilutum rhabbari, eclegma de psilio, indi appellatum: & alia eiusmodi, quæ bilē cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris sunt annotata. Post septimum diem iugiter decoctū comæ absynthii dandum est. Mu'tos quoque iuuat oxymeli

**Vomit**

se solo potum. Vomitus autem à cibo adeo iis quibus hæc febris perdurauerit utilis est, vt multi, Galeno libro i, Methodi medendi ad Glauconem teste, hoc vno p̄sidio statim fuerint curati. Hypochondria quoq; calidis fouēda sunt medicamētis, vt scilicet fla-

**Fomentū**

tus, qui ea distendunt, discutiantur. Cōuenit verò hoc potissimum fomentū, quod R̄x florum chamemeli, meliloti, anethi m i. absynthii m s. rosarum rub. p. i. seminum fœnigreci, lini añ 3 iiii. Bulliant singula in aqua sufficenti, donec tertia pars cōsumatur. Dein spō-

**Vnguentum.**

gia in hac madefacta, hypochondria foucantur. Poterit etiam ventriculus hoc aut simili vnguēto inūgi, quod R̄x olei mastichini, rosacei, chamæmelini añ 3 iiii. Pulueris gario-phyllosum 3 i s. ceræ quantum satis est, fiat

**Balneum**

vnguētū. Cæterum in tertianis non exquisitis, neque statim circa initia balneare expe-



dit, sed quum primum notæ coctionis appa-  
ruerint.

## DE QUARTANA. CAP. VIII.

Alterum genus febrium intermittētium  
est exquisita quartana, quæ ex solo atræbi-  
lis humore putrescente generatur. Hæc qui-  
dē non primo statim die cum rigore inuadit  
vehemēti, sed talis est qualis iis qui vehemē-  
ti gelu frigesūt. Progrediente autē ipsa atq;  
aucta, vnā etiam rigor augetur, inualescitq;  
quotidie vsq; ad totius morbi incrementum,  
sensūsq; eius non pūgentis stimulantisve cu-  
tem, sicut in tertiana, sed vehementem algo-  
rem inducentis, & tanquā ossa frangentis est.  
Pulsus ī ea satis tardi sunt ac rari, caloris mo-  
tus, incrementum & vigor tertianis febribus  
contraria sunt. In ea enim humor paulatim  
veluti lapis aliquis, aut testa, aut os, aut tale  
aliquod huiuscemodi corpus frigidū & sic-  
cum succenditur. Vbi verò aliqua ex eo flam-  
ma fuerit accensa, nihil fumidum, aut à se in-  
combustū in accessione relinquit. Atque id.  
circo in hoc humore longiores sunt cessa-  
tiones, quam in pituita, atque intermissio  
exquisite pura videtur: quoniam hic quic-  
quid atræ bilis fuerit accensum, exhauritur,  
atque dispergitur. Bilis præterea flauæ vom-  
itus quartanam non comitatur. vrinæ, tan-

Causa.

Signa.



quàm per crassiorē materiam excolatæ, sunt  
 tenues, albæ, & aquosæ. Adhæc in autumnō  
 potissimum incipit, erraticis superueniens fe-  
 bribus. Cæterum inspicienda & laborantis  
 natura seu temperamentum, victus ratio quæ  
 antecessit, regio, ætas, & alia eiusmodi. Si enī  
 frigida & sicca fuerint, tunc certius quarta-  
 nam futuram sperabimus, potissimum ubi co-  
 tempore quartanæ febres populariter vaga-  
 buntur. Porro quod ad curandi rationem at-  
 tinet, quartana laborātes initio moderatè &  
 leniter tractandi sunt, neque vllō forti medi-  
 camento, aut euacuatione irritandi: nisi fortè  
 sanguis vehementer exuperare videatur. tū  
 enim sanguis auferendus. Et si venā incisā, de-  
 fluēs sāguis niger ac crassior fuerit, audaciū  
 mittendus est. Quod si verò flauus aut tenuis  
 apparuerit, statim supprimendus. Venā verò  
 secare oportet lienarem vocatam, aut quæ est  
 in sinistro cubito, mediam. victum institue-  
 re conuenit optimum, cum nimirum qui mi-  
 nimè flatuosus sit. A suillis itaque carnibus ar-  
 cendi sunt egri, atq; ab omnibus eduliis quæ  
 viscida ac tenacia sunt, & tardum habēt exi-  
 tum, atq; ab omnibus quæ refrigerāt & exic-  
 cant corpus. vtendum vero est volatilibus  
 montanis, quæ boni succi sunt, & non in pa-  
 ludibus degūt. piscibus etiam qui molli car-  
 ne tenacitate carente præditi sunt. Salsa etiā  
 & sinapi in cibo, vt incidantur & extenuen-

Curatio.

Venæ se-  
ctio.Victus ra-  
tio.



tur humores, adhibenda sunt. Vino vtendum est albo ac tenui, & mediocriter calido. A frictionibus autem & deambulationibus, & aliis hominum consuetis studiis non sunt penitus prohibēdi. A balneis tamen si possunt, omnino abstineāt, frictionibus dūtaxat adhibitis. Et si breuis, nec admodum violenta quartanę accessio fuerit, nihil nocebit si diebus inter accessiōē mediis ad consueta exercitia se transferant. Cæterum clysteribus quoque vtendum, à principio quidem molli-  
Clyster.  
 libus, postmodū verò acrioribus. Molles ex præcedēte capitē petes. paulo acrior hic est, qui R̄ malug, chamæmeli, mercurialis, foliorum violarum añ m ð i. folliculorum senæ, polypodii añ 3 v. hæmionitidis m i s. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis. Colati humoris accipe lb i. & adice casie fistularis ℥ i. eclegmatis diasenæ ℥ s. olei communis ℥ iiii. mellis rosacei ℥ s. salis gemmæ nominati 3 i. fiat clyster certis etiam diebus dandum medicamen quod diatriōn pipereōn vocatur. Imò recte fecerint ægrotātes, si quotidie piper cū aqua biberint, Galeno lib. i. ad Glauconem autore. Hæc quidem in principio & augmento potissimum sunt facienda. si verò in vigore morbi ægrotus esse videatur, tunc tenuiorem victus rationem adhibere conuenit, quā antè vel postea. statim verò præci-  
 piendum, vt in longum tempus quiescat, ac



visceribus prouidendū vnguēdo, illinēdoq;  
 his quæ mollire ac laxare possūt: qualia sunt  
 quæ ex farina hordeacea, semine apii, iride,  
 cumino, ruta, & iis similibus cōponūtur. in-  
 ter cētera verò hypochondrium finistrū hoc  
 vnguētū vnguēto erit vnguendū, quod R̄ olei de cap-  
 paribus 3 iii. oleorum irini, amygdalarū dul-  
 cium añ 3 ii. Seminis apii, cumini, radicis iri-  
 dis añ 3 i, ceræ quod satis est, fiat vnguentū.  
 Posthæc vtendum medicamentis quæ ciendi  
 vrinā vim obtinent. in quem sanē vsum mul-  
 sa propinanda, in qua anethum, aut ruta, aut  
 apium decoctū sit. mox si coctionis notæ ap-  
 paruerint, purgandum medicamentis, quæ  
 atram bilem euacuant: idq; non semel tantū,  
 sed sæpius, si fuerit necessarium. Qualib⁹ au-  
 tem medicamētis purgantibus vtendum sit,  
 libro primo in cap. de melancholia expositū  
 est. Laudat tamen præter alia Aëtius, vinum  
 dulce infusum in colocynthidis cauitatem,  
 sic tamen vt illi admisceatur quidpiam apii,  
 aut dauci, iucunditatis gratiā. Vtendū quoq;  
 vomitus. vomitu à cibo. Et si nihil prohibuerit, ellebo-  
 rus albus est exhibendus, primum quidem  
 permixtus raphanis: vt in superioribus ostē-  
 sum est libris. qđ si nihil fecerit, ellebor⁹ ip-  
 se. Quod si quispiā ab elleboro abhorrerit,  
 hoc aut simili vti poterit, quod R̄ succi ra-  
 phani ʒ iiii. oxymelitis simplicis ʒ ii. misce,  
 ac tepidū bibendū exhibe. Qui verò nequeūt



euomere, hi per inferiora purgādi. A purgatione dandū medicamentum ē viperis, quod theriacam vocant: aut illi facultate simile. Quicūq; inter morbi initia, aut omnino ante vigore, aliquod ex iis medicamē exhibēt, quartanam quæ simplex erat, sæpius duplicē faciunt, aut omnino maiore difficiliorēque. Ex duplici autem triplicem, vel prorsus ambas maiores difficiliorēque reddunt.

Theriac.  
ca.

## DE QVOTIDIANA. CAP. IX.

Quotidiana febris intermittēs ex pituitæ putredine, per sentiētes corporis partes à natura detrusa, ortum habet. Dicitur amphimerina græcis, quod amborum diei scilicet & noctis particeps sit. singulis enim diebus accessiones facit, quæ ad infebricitationem ac integritatem non desinunt, occupantq; ferè decem & octo horarū spatium. His verò potissimum signis dignoscitur. Haudquaquam cū rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quàm rigor occupat. pulsus, quum primum accessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, parvus ac debilis. Neque vetò in augmento motus velocitas, magnitudo, atque vehementia quotidianis adsunt. calor non tam acris ac vehemens, vt in tertiana: neque enim adurit ægros, neq; multū & crebrò spirare cōpellit, ac veluti flāmā ex ore efflare, vel frigidā ex-

signa.



petere : sed humidus ac fumosus cum multo  
 vapore commixtus. A Egrè quoque accendi-  
 tur, ac longum consumit tempus, dum inua-  
 lescendo peruenit ad summum. Minimè de-  
 nique qui sic febricitāt, sitiūt: quòd non dū-  
 taxat lingua, imò totum corpus. in hac febre  
 humidissimum sit. Urinæ in quotidianis vel  
 albæ, tenues, & aquosæ: vel crassæ, aut turbu-  
 lentæ. Nullus omnino sudor in primis dieb<sup>9</sup>  
 erumpit, neq; vnquā exacta febriendi quies  
 attingitur. Vomitus etiam pituitosi iis acci-  
 dunt: & quæ per aluum excernuntur, frigi-  
 diora & humidiora, crudiora, aquosiora, &  
 pituitosiora sunt. Vniuersum quoque corpus  
 in hisce febribus plenum crudis humoribus  
 inuenitur. Cæterum quotidiana febris humi-  
 das pituitosāsve naturas maximè infestat.  
 Hyemis quoque tēpore, humida & frigida  
 constitutione, senili ætate, & puerili, his deni-  
 que qui ocio plurimo dediti sunt, crapulis,  
 ebrietatibus, balneis assiduis, post cibū præ-  
 fertim vtuntur, quotidiana febris facilè acci-  
 dit. Quæ singula indicia Galenus fusiùs lib.  
 1. ad Glauconem cap. 7. & lib. 2. de Diff. feb.  
 cap. 4. atq; lib. 2. de Crisib<sup>9</sup> cap. 5. prosequi-  
 tur. Victus ratio in hac febre in vniuersum  
 fit incisoria, ideòq; ad ea capita recurrendū  
 erit, in quibus qualis sit ista victus species, à  
 nobis in superioribus libris sæpe traditū est.  
 Primis quidē diebus aluus clysteribus mol-

**Victus  
ratio.**



liētibus eluēda est. Dein oxymelite vtēdū & aliis quæ urinā elicere possunt. Cōueniūt igitur decocta ex radice apii, oreoselini, iridis, fœniculi, & similibus antea sepiissime cōmemoratis, cū syrupis acido cōposito melle rosaceo, de duab⁹ radicib⁹, & aliis quib⁹ incidēdi & extenuādi facultas inest. Circa statū verò de vētriculo est habēda sollicitudo, p̄sertim de eius ore. Quare ante cibū hoc vēdū vngueto, quod R̄z olcorū mastichini, absinthini Vnguenti nardini añ 3 ii s. mastiches, gariophyllorum, ligni aloēs añ 3 s. cinamomi 3i. cū cera quod Vomitus satis est: fiat vnguentū, quo vētriculus inūgatur. Deinceps iubēdū est, vt egri à raphano & cibis assumptis vomāt. His etiā vtendū medicamētis, q̄ pituitā subducūt: qualia multa in p̄cedentibus libris cōmemorauimus. Hæc pro curatiōe febris quotidianæ, quæ rarò ad modum accidit, sufficiāt. Nam quæ hic desiderātur, in p̄cedentibus abūdē docuimus.

## DE HECTICA FEBRE. CAP. X.

Hectica febris appellatur, quando calor p̄ter naturam nō solum in spiritibus & humoribus, sed iam in partibus etiā solidis cōsistit. Hectica verò dicitur, vel quòd firma ac fixa sit, ac difficulter soluatur, quemadmodū habitus: vel quoniam habitū corporis cōprehendat. Sic enim vocare cōsueuerunt, solidas partes humidis distinguentes. Hecticæ autē febres duplici modo generantur, primū ma-

Hectica  
quid.  
Hectica  
cur dicta  
Habitus  
corporis.  
Causa.



gna quidem ex parte ex ardētibus febribus,  
 quæ tantum protrahuntur, vt longitudine tē  
 poris humorem in corpore cordis cōtentum  
 absumant: vel fieri potest, vt eius adhuc ma-  
 gna portio reſeruetur. illæ verò non tantum  
 heſticae ſunt, ſed etiā *μαρασμώδεις*, hoc eſt,  
 tabidæ. Quæ autem manente adhuc humidi-  
 tate generantur, vbi corpus cordis occupaue-  
 rint, hinc maxime accēduntur, haud ſecus q̃  
 lucernæ flāma ex ellychnio. Atque hæc vna  
 quidem febriū heſticarū generatio. reliqua  
 eſt quum ſtatim inuaſerint, ſimilem primū  
 ſui ortū diariis facientes, aut ex mœrore, aut  
 ira, aut laſſitudine nimia, vnà cū ſolis feruo-  
 re natæ. Haſce igitur febres non eſt admodū  
 difficile curare. At quæ ex ipsis in tabem mar-  
 corūve, qui Græcis dicitur *marasm⁹*, ex in-  
 ſcitia medicorū peruenerunt, vbi iam exqui-  
 ſitè cōſiſtunt, & non adhuc incipiūt, haſ non  
 modò curare difficile, imò etiam impoſſibi-  
 le. Earū enim natura calida & ſicca eſt, vt ta-  
 le aliquid patiatur cor, quale lucernæ funi-  
 culus, quū plurimum peruſtus fuerit. Nā qui  
 ita torrefactus eſt, frangitur & diſſoluitur, at-  
 que ex ariditate cōtinuitatē amittit, adeò vt  
 etiā ſi copioſum oleum ſuperinfundas, flāma  
 abundantior nō poſſit accēdi. ſemper enim  
 parua & imbecilla ī ipſa palpitāt, ac cōtinuè  
 ſit minor, donec ex toto extingnatur. Talis  
 quidē eſt febris, quæ omnino *μαρασμώδης*,  
 hoc eſt tabida exiſtit. Heſtica verò, q̃ in ma-

*μαρασ-  
μῶς.*



rasmū incidit, cognitu promptissima atq; fa-  
 cillima existit. nā priusquā pulsum atq; calo-  
 rem tactu perpēdas, videbis oculos immodi signa.  
 ce concauos, veluti quibusdā quasi scrobibus  
 recōditos, exhausta iam vniuersa in ipsis hu-  
 mida substātia, ita vt ossium quib<sup>9</sup> palpebrę  
 cohærēt eminētię conspiciātur. sordes quidē  
 in ipsis aridę apparēt, & quidā squalidus af-  
 fect<sup>9</sup>, qualis maximē uest his qui toto die sub  
 solis ardore iter longū per puluerem fecerūt.  
 Flos etiā ille vitalis perit, cutisq; in frōte ari-  
 da distēsaque est. palpebrę frequenter veluti  
 somnolentę conueniunt, verū passio eorū  
 somnus nō est, sed potius vigilandi impoten-  
 tia. Cōtabuere quoque carnes quę in tēpori-  
 bus sunt, vt collapsa videantur, & cōcaua lo-  
 ca. Quid enim aliud pręter ossa & cutem so-  
 lam habent? nam si denudatū ventrem inspe-  
 xeris, neq; intestinū, neq; visc<sup>9</sup> ullū superesse  
 tibi videbitur. Hypochondria sursum ad tho-  
 racē conuelluntur. Quod si eos tāgere libear,  
 cutis quidē apprimē arida est: quā si digitis  
 apprehendens extenderis, instar corii cuius-  
 dam consistit. pulsus tenuis, durus, debilis, &  
 frequēs. Caliditas quū primū man<sup>9</sup> admo-  
 uetur debilis est, paulō pōst acris & rodens  
 erūpit: & magis, quū amplius tangendo im-  
 moraberis. maxima quoque erit hęc & mini-  
 me anceps nota: adhibito cibo calor incēdi-  
 tur, pulsusq; magnitudine ac velocitate intē.



ditur. Tādiu autē hectica febris dicetur, quā  
 diu natua humiditas reseruāt. vbi verò am-  
 bigitur, ne nihil amplius humoris superfit,  
 Curatio. absoluta iam tabes est. Hecticas verò febres  
 priusquam ad tabem deueniāt, omni conatu  
 refrigeramus. Sūma itaq; curationis in refri-  
 gerando ac humectando collocatur, tam his  
 quæ extra admouētur, quā iis quæ intra su-  
 mūtur. Aër igitur inspiratus frigidus sit & hu-  
 midus. Etsi natura talis nō sit, arte paretur, vt  
 dictū est suprā cap. 6. de curatione tertianæ.  
 Cibis vtēdum iisdem viribus præditis: ptisa-  
 næ nimirum cremore, pane modico in aqua  
 frigida macerato: carnibus hœdi, phasianor-  
 um, volucrum montanarum, testiculis gal-  
 lorum, carnibus caponum, ouis forbilib<sup>9</sup>, ca-  
 seo recēti salis experte, piscib<sup>9</sup> petrosis lactu-  
 ca, intybis, cucurbita, spanachia, malua, & si-  
 milibus. Cerasis, prunis, malis punicis, melo-  
 nibus, ficubus, & eiusmodi lac etiam mirifice  
 iis proudest, modo alia febris ab humorū pu-  
 tredine orta non cōplicetur. Quæ verò ad hū-  
 ius exquisitam exhibitionē sunt necessaria,  
 vt alia multa huic instituto cōuenientia, tra-  
 dit Galenus lib. 7. The. meth. Potus sit aqua  
 frigida moderatē sumpta, aut decoctū cina-  
 momi, aut vinum aquosum, tenue. Cōuenit  
 deniq; hecticis sæpius die cibū accipere, vt ni-  
 mirū hac ratione caueant ne vna vice magnā  
 ciborū copiam ingerant. Motū immodicū, &  
 quicqd vires resolvere potest, deuitēt. Cæte-



rum medicamēta purgantia illis qui hectica febre laborāt non sunt propinanda. Sed si alius plus æquo adstricta fuerit, leuib. ac alteratib. clysteribus, adiecta casia fistulari, hanc abluere oportet. Intra corp<sup>9</sup> exhibēda medicamēta refrigerātia ac humectātia: qualia inter cōposita hodie vsitata sunt, syrupi violaceus, de nymphæa, de intybo domestico, acetosus, & similes. Itē cōfectiones diarrhodōn abbatris, diatragacāthē frigide diapapaueris, similēsq;. Ex simplicibus succi lactucæ, portulacæ, intybi & papaueris. Inter ea verò q̄ extrinsecus admouētur, balnea huic morbo obnoxiiis quouis tēpore idonea sūt. balnea quidē aquarū dulcium, ad quæ sanè ægrotus in lectulo, aut sindone deportetur. Aquā verò tēperatissimā esse oportet: in qua etiam moderatē cōmorādū, ne scilicet quippiā ē propria humiditate hauriatur. tantū abest vt in ea sudare debeat. Sunt qui in aqua decoquendas herbas aliquot esse putent: violas nēpē, maluas, lactucas, flores nymphææ, & iis similes. Nōnulli itē pedes vitulinos, & capita agnina, quoad ossa carnib<sup>9</sup> separētur. Cauendum etiā, ne perfundatur caput. Vbi itaq; satis iā in balneo cōmoratus fuerit, mox hinc educus, in frigidā semel tot<sup>9</sup> tingatur, ne vel breuissimo quidē spatio illic moratus. Hectica siquidē febricitātes, qui ad balneū accedunt, Galeno li. i. o. The. meth. teste, nisi in frigidā

Balnea.

B iii



Linimen  
tum.Epithe-  
mata.

sint dimissi, nihil iuuatur. Protinus autē ubi extractus fuerit, alter paratā habens sindonē ipsi iniiciat, ac deinde aliā. tū in lectulo collocatus, primū spōgiis detergeatur, deinde mollibus linteis. nec cōmittēt qui eū detergebūt, vt violētius eū cōtrectēt, sed quoad fieri potest blādissimē. Quid multa: eā sanē curā, si fieri potest, omnino in balnei vsu adhibeāt, quā Galen. loco iā citato requirit. Post hāc quidē oleis frigidis, & aliis humectādi facultate prāditis inūgēdus erit. Inter cētera verō hoc cōuenit, quod R̄x oleorū violacei ℥ s. de cucurbita 3 iii. butyri recētis salis experti, pinguedinis porcine 3 i s. misce, fiat linimētū, vt vocāt. vel adiiciātur muscositatis tragacāthæ 3 ii, medullę cruris vitulini 3 iii. ceræ quod satis est, & fiat vnguentū. valet etiā oleū nymphae, de papauere, & rosaceū, quod Galeno lib. 3. de simp. med. facul. cap. 16. arētia corpora mirificē humectare potest. Vbi vnctus fuerit, tū vestib<sup>o</sup> amict<sup>o</sup> rursus super lectulo, aut sindone in locū ubi cibāt reducēt & nutriēt. Proderit etiā cor atq; iecur epithematis refrigerare & humectare: qualia sunt hęc quæ R̄x aquæ stillatitiæ violarū nymphae lactuce añ ℥ iii. aceti optimi ℥ s. rosarū rub. santalorū omnium añ 3 i. specierū diamargaritōn 3 s. caphurę gr. iii. croci 3 s. misce, fiat epithema, qđ cordi adhibeatur frigidū. Aliud quod R̄x aq̄ stillatitiæ, intybi domestici, rosarū añ ℥ iii.



lacticae § ii. aceti § i. specierū diarhodōn ab-  
 batis 3 i s. rasuræ eboris 3 s. caphurę 3 s. misce  
 fiat epithema, quod iecori admoveatur. Con-  
 ferūt hecicis etiam medicamēta quæ odore  
 suo refrigerāt & humectāt, vt sūt flores nym-  
 phææ, caphura, violæ, rosæ, & similia. Plura  
 etiā ad iustitutū faciētia reperiet studiosus in  
 cap. de Phthisi seu tabe. Et certè in hecices  
 curatione vnicè studēdū, vt corpus nō solūm  
 per ea quę intra corpus sumūtur refrigerem<sup>9</sup>  
 & humectemus: verū etiā per ea quæ extrinse-  
 cūs admouētur, olei potissimū inunctionem.  
 Quātū enim hoc ipsum foris adhibitum ad Pollio  
 corporis ac viriū cōseruationē cōducat, cele. Romul<sup>9</sup>.  
 bri Pollionis Romuli exēplo docemur. Hūc  
 enim centesimū iā annū excedentē, Plinio li.  
 22. cap. 24. teste, quū Diuus Augustus hospes  
 interrogaret, quānam ratione maxime vigo-  
 rem illum animi corporisq; custodisset, ille  
 respondit: Intus mulso, foris oleo. Hęc quidē  
 ad rectē curandas febres sufficiunt. præclare  
 enim officio nostro defunctos nos esse puta-  
 mus, quòd methodum quā breuissimē po-  
 tuimus indicauerimus Remedia autem par-  
 cissimē attigimus, quòd ea nullo labore me-  
 dicinæ non prorsus rudes, ex superioribus li-  
 bris tribus, si plura desiderāt, petere possint.

LIBRI QUARTI ET VLTIMI  
 FINIS.

B iiii



HIPPOCRATIS COI DE ME-  
DICAMENTIS PURGATORIIS  
libellus, nunquam prius in lu-  
cem editus.

I V N I O P A V L O C R A S S O I N -  
T E R P R E T E .

*Cur medicamenta purgantia non teme-  
re exhibenda.* Cap. 1.

M E D I C A M E N T O R U M P U R -  
gantium opera non qualia censen-  
tur existunt, ab eodem enim medi-  
camento aliqui modò purgantur, modò non  
purgantur. interdum & alia, quàm quæ con-  
sueverit, educit interdum immodicè purgat,  
nonnunquam & quæ oportet præstat. Quare  
non potest quispiam hisce fretus medicamē-  
tis, ea temere propinare: siquidē & cibi nos  
alentes, medicamenta existimādi sunt: minus  
tamen quàm antedicta. homines nanq; hisce  
rectè vescentes, secunda valetudine fruuntur:  
minus rectè, laborant: intēperanter, ceu sine  
ris à medicamētis euacuantur. Igitur iam pa-  
tet, & cibos ipsos esse purgātia medicamēta.  
minus tamen, segniusque, quàm sincera me-  
dicamenta, ceterum his segniore, nobisque  
familiares, & quotidie in corpus intrantes, te-  
merè ac negligēter exhibiti, homines pertur-  
bant, in morbósque præcipitant: atque vt se-



mel dicam, qui incōsideratē cibos dederit, ni-  
hil commodi, nihil opis est allaturus.

*Quæ quibus medicamenta dāda. Cap. II.*

Igitur ab initio biliosis, medicamentū bi-  
lis purgatorium est propinandum: pituitosis  
quod pituitā: hydropicis, quod aquam: me-  
lancholicis, quod atram bilem educat. at si a-  
lia ab iis purgas quæ purgare conuenit, non  
purgas: quæ autem non conuenit, euacuabis.  
quare vtrunque peccaueris.

*Quæ præmittendæ interrogationes.*

*Cap. III.*

Itaque aliquē aut suprà, aut infrà purga-  
turus, eū prius interrogato, num aliās medi-  
camentū purgatorium acceperit? num aluus  
subducentibus medicamētis facilē soluatur,  
velociterque obediat: aut cōtrā, adstricta sit,  
ægrēque soluatur. Quod si facilem esse aluum,  
lubricāque responderit, mollioribus mino-  
ribusque medicamētis indigebit: sin aluus sic-  
ca præclusa que sit, valentiora medicamenta  
postulat. Idem præceptū & in vomitoriis me-  
dicamentis obseruādum est. verum si neuti-  
quam vomitoria subducētiāve medicamēta  
sumpsisse se affirmauerit, tum demū scire o-  
portet, quomodo sanitatis tempore se habue-  
rit: num subducētibus facilis aluus patuerit,  
num vomitoriis stomachus libenter morem  
gesserit: num à crāpula quāpiam in alui pro-



fluuiū inciderit. omnia hæc sciscitari debes,  
vt recte ipsi possis consulere. Fœda est enim  
calamitas, eum, cui purgatoriā medicinam  
dederis, interficere.

*Quibus morbis, quoue tempore exhibē-  
da medicine purgatorie. Cap. IIII.*

Vicunque sanè validis febribus cor-  
ripiuntur, his vsque ad febris remis-  
sionem purgatoria medicamēta ne  
dato, sin id nolis, saltem ne citra quartū deci-  
mū diem: calidæ enim carnes ipsorum, & vē-  
tres, medicamentū retrahunt, nihilque pur-  
gatur. Tūc planè febris magis exardet, color  
permutatur auriginosique fiunt. agitata nā-  
que bile, & nō detracta, neq; sorbere potest,  
neque bibere: sed auersatur omnia, & plerū-  
que moritur. Cæterum si medicamentū vin-  
cit, ante meridiem nulla fit purgatio, à meri-  
die fit immoderata deiectio, atque cōmori-  
tū. quòd si diem hunc superstes sit, simulque  
cum purgatione febris tollatur, conualescit.  
Quamobrè purgatoria medicamenta in ma-  
gnis febribus ne ore sumātū, præcipimus. at  
si ipsis opus fuerit, per clysteria iniicere, quo-  
ties volueris, expediet: id enim tutius erit.  
Hac itidem ratione, æstiuo tempore post ca-  
nis ortum quinquaginta dierum spacio me-  
dicinam purgantem ne propinato, sed cly-  
steriis vritor. idem nanque discrimen est.

Clyste-  
res.



*Defensio medicinae contra calumniatores.**Cap. V.*

Dicent autem aliqui, qui medicinam calumniātes artem esse negant, pridē multos non implorata mediciope ex morbis euasisse. Atqui ego istorum orationi fidem habeo, simul tam en fieri posse arbitror, ut quispiā nō vti medico, ex medicina fructū percipiat: haud ita tamē, ut quid in ipsa rectum, quid non rectum sit, agnoscat. nam forte quadam ita se ipsos curare possunt, ac si accitis medicis curati essent. Id verò præclarū indiciū est, medicinam nō solum artem, verumetiā eximiā esse artem: quādoquidem & ipsam funditus tollentes, per ipsam illā seruari videantur. Illud em̄ nouisse summa est necessitas, eos qui ex languoribus ad sanitatem restituti sunt, aliquid facientes aut nō facientes conualuisse. aut enim ieiunio, aut ciborū copā, aut largiore potu, aut siti, aut balneis, aut ab eis abstinentia, aut exercitationibus, aut ocio, aut somno, aut vigilia, aut omnibus his confusē vtētes, incolumes euasere. Atqui & ex auxiliū perceptione inuisse auxiliās, eos cognoscere necesse est: cōtrā ex noxa accepta, rē nocentē affuisse. nā quæ iuuandi, quæ lādēdi ingenio prædita sint, non cuiusq; est dinoscere. Itaq; si quid in ratiōe victus, per quā sanat<sup>9</sup> fuerit

Medicina eximia ars.



# HIPPOCR. LIBELLVS

ager, laudare aut vitio dare cognouerit, omnia hæc medicinæ esse comperiet. Et mehercule offensiones non deterius, quàm adiuumenta, artem hanc esse testantur, iuuantia siquidem, recte administrata iuuerunt: nocentia imperitè adhibita nocuerunt. At vbi rectum, non rectumque, vtrunque modum habent, quomodo id artē esse negandum est? Illud nanque ego arte carere existimo, in quo nihil rectum est, neque non rectum: vbi autem vtrunque inest, quomodo id non artis opus, sed artis imperitiæ putandum est?

## HIPPOCRATIS DE MEDICAMENTIS PURGATORIIS FINIS.



RERVM HOC IN LIBRO MEMO-  
RABILIVM PER CAPITA ET PA-  
GINAS INDEX.

LIBRI PRIMI.

De Alopecia & Ophi- asi Cap.1. Pag.1.	De resolutione. 17.24
De dolore capitis. 2.3	De morbo comitiali. 18. 26
De dolore capitis ex ca- lore. 3.	De incubo. 19.29.
De dolore capitis ex fri- gore. 4.5	De melancholia. 20.30
De dolore capitis ex sic- citate. 5.6	De convulsione. 21.34
De dolore capitis ex ple- nitudine. 6.7	De tremore. 22.37
De dolore capitis ex bi- liosio humoribus. 7.9	De destillatione. 23.37
De dolore capitis ex pi- tuitosis humorib <sup>9</sup> . 8.10.	De lippitudine, siue o- phthalmia. 24.39
De cephalæa. 9.12	De suffusione. 25.41
De hemicrania. 10.13	De aurium dolore. 26.42
De vertigine. 11.15	De parotidibus. 27.44
De phrenitide. 12.16	De sanguinis ex naribus eruptione. 28.45
De lethargo. 13.20	De dolore dentiū. 29.47
De caro. 14.21	De aphthis. 30.49
De catocha & catalepsi. 15.22.	De fœtore oris. 31.50.
De apoplexia. 16.22	LIBRI SECVNDI.
	De columellæ inflamma- tione. 1.52
	De angina. 2.52



# INDEX

De tussi.	3.55	De lienteria.	9.90
De asthmate.	4.57	De dysenteria.	10.92
De pleuritide.	5.59	De tenesmo.	11.94
De peripneumonia.	6.60	De coli doloribus.	12.96
De cruento sputo.	7.61	De ileo.	13.99
De empyemate.	8.65	De lumbricis.	14.101
De tabe.	9.66	De hæmorrhoidibus se-	
De cordis palpitacione.		dis.	15.104
10.67		De pccidentia ani.	16.106
De syncope.	11.70	De rimis ani.	17.107
De lactis defectu.	12.72	De imbecillitate iocino-	
De lactis redūdātia.	13.73	ris.	18.107
De lacte in grumos con-		De obstructione iocino-	
uerso.	14.74	ris.	19.110
De inflammatione mam-		De inflammatione ioci-	
marum.	15.75	noris.	20.112
		De ictero.	21.114
LIBRI TERTII.		De aqua iter cutē.	22.117
De imbecillitate ven-		De anasarca.	23.119
triculi.	1.76	De ascite.	24.121
De inflammatione ventri-		De tympanite.	25.122
culi.	2.78	De intemperie lienis.	
De appetitu canino.	3.79	26.122	
De bulimo.	4.81	De lienis inflammatione.	
De inflammatione ventri-		27.124	
culi.	5.82	De lienis obstructione.	
De singultu.	6.84	28.126	
De cholera.	7.85	De renib. cruentam vrinā	
De diarrhoea.	8.87	cxcernentibus.	29.127
		De inflammatione renū-	



# INDEX.

- 30.128  
De calculo renum. 31.130  
De renū vlceribus. 32.134  
De diabere. 33.136  
De vesicę calculo. 34.137  
De sanguinis ex vesica eruptione, & grumis eiusdem. 35.138  
De inflammatione vesicę. 36.140  
De stillicidio vrinæ. 37.141.  
De difficultate vrinæ. 38.142.  
De suppressione vrinæ. 39.143.  
De vlcerebus vesicę. 40.144.  
De his qui re venerea vti non possunt. 41.146  
De feminis profluvio. 42.147.  
De exulceratione pudendi. 43.148  
De ramice. 44.149  
De suppressis mensibus. 45.151  
De redundantibus mensibus. 46.154  
De vteri suffocatione. 47.155.  
De vteri procidentia. 48.157.  
De mola. 49.159  
De inflammatione vteri. 50.160  
De sterilitate remouenda. 51.161  
De difficili partu. 52.164  
De ischiadicis. 53.167  
De podagra & arthritide. 54.169.  
LIBRI QVARTI  
DE MEDENDIS  
FEBRIBVS.  
De diaria. 1.175  
De diaria ex obstructione meatuum. 2.177  
De synocho cum putredine. 3.179  
De cōmūi, febribus. 4.181  
De ardente febre. 5.183  
De exquisita tertiana intermittente. 6.185  
De tertiana notho. 7.188  
De quartana. 8.190  
De quotidiana. 9.192  
De hectica febre. 10.193  
FINIS.



